For Lord Cardross.
Octr. 1725.

℞ Fol. Sennæ, a stipit. liberat. ℥ij.
Sem. anisi
— fœnicul. āā — ℥ß.
Liquirit. — ℥ij.
Infund. per noctem in aq. font:
calent: ℥vi. In collat: dissolv:
Syr. de Rham. Cathart:
— Rosar. solutiv. — āā ℥ß.
M.
Præmittatur Elect: Lenitiv. vel
Diaprun. vel Diacathol. ℥ij
vel ℥ß. nocte præced.

℞ Tamarind. Unc. ß
Fol. Senn. Mund.
~~Sem. Anisi vel fœniculi~~
Rhabarb. opt. a. dr. ij.
Sem. Anisi vel fæniculi dr. j.
coq. in s. q. Aq. ad Unc. IV.
Colatur. per setaceum
exhibe [& add. Syr. de Rham & Ros. solut. ā ℥ij.]
Præmiss. Elect. Lenit. dr. ij
& IV. nocte præced.
Lord Cardross. April 26.
1726.
opt.

℞ sacr. cochl. iij. ves:
pere, in lecto.

℞ Rhabarb: opt.
Glycyrriz: — a ℥ij.
Uv. passul: enucleat. No. 60.
Anisi — ℥j.
Sacch. cand. — ℥vi.
Sp. vini — ℔ij.
Digere s. A. f. colat.
Dos. cochl: ij, iij, vel IV. mane.
In dolor. ventric. Tra Rhab. Batai.

℞ Rad. Gentian.
Calam. aromat.
Zedoar.
Galang.
Bac. Laur.
Pip. Long. — a ℥j.
Cariophyll.
Cinamom.
Rad. Angelic.
— Irid. Florent.
Lig. nephrit. — a ℥ß.
M. infunde in
Sp. vini — ℔j.
Si vis purg. add.
Diagrid. — ℥jß.
Dos. cochl. j. vel ij. vacuo stomacho.
In affect. stom. et appetitu laeso.

℞ Elix. prop. — ℥ij.
Sp. C. C. — ℥j.
Rd amard — ℥ij.
M.
Dos. ℥ß. vel ℥j.

Ad Dentes dealb. et poliend.
℞ Boli ℥ß
Alum. ust.
Panis cremat
pulv. Later.
Terra sigul. Rhinens. a ℥j.
mell. despum. q. s. ut fiat pasta
quotide mane utenda; frictio
fiat Lacinia Lanea.

vel Coch: minor.

℞ Massæ pilul. Rudij ℥ß.
Mercur. dulc. gr. IV.
M. f. pil. No. V.
~~NB. nimis debile.~~

si non sit copia Pilul: Rudij,
tum substituatur seq: Haustus.

℞ Tamarind —— unc. ß
Fol. sennæ mundat.
Rhabarb. opt. —— ā dr. ij
sem: anisi vel fœniculi ℨi.
Coq. in s. q. Aquæ ad unc. iv.
Colat. per setaceum Exhibe.
adde Syr. de Rham. Cathart.
—— Ros. solutiv. ā ℥ß.

Præmittatur Elect. Lenitiv.
vel Diacathol. ℨij.

Les Medailles sont ou

Medaillons, ou medailles:

Les Medaillons sont grands comme un ecus neuf ou davantage.

Les Medailles, se divisent en grand, moien et petit bronze.

Grand Bronze sont de la grandeur a peu pres d'une demie-ecus de France.

moien bronze sont grandes comme un Escalin d'angleterre a peu pres.

petit bronze, comme une piece de six sols d'angleterre, ou comme les medailles ordinaires d'argent et d'or.

Les Medailles Romaines se divisent en Consulaires et Imperiales.

Entre les consulaires on trouve quelques Rois Etrangers, comme Bocchus, le dernier Philippe de macedoine, Jugurtha, &c.; et plusieurs grands personnages Romains.

Les Imperiales sont ou Latines ou Grecques. Elles se partagent encore en haut et bas Empire. Le haut Empire commence à Pompée, et finit à Postume; et l'on appelle le bas empire tout ce qui suit Postume jusqu'à Heraclius, ou les belles suites finissent. Cependant on peut aller jusqu'aux derniers Empereurs Grecques que Bajazet dethrona tout-a-fait.

℞ Ol. succin.
Bals. sulph. terebinth. ā. p. æ.
M. et cum plumaceola appli=
cetur hæmorrhoid: cæcis. bpd
mr Rookeby in seipso.

℞ Ol. violar.
— Terebinth
Bals. sulph. - - - M. et
injice ano ad quantitat. ℥ß. v ℥vj.
v ℞ Ol. viol. vel. Ol. hyperic. *
vel Ol. sambuc. ℥ij. vel iij.
Bals. sulph. terebinth. ℥j. v ℥jß.
M. injice, vel applica cum
plumaceola.

* vel misce hæc cum ol. hyper. vel
Ol. sambuc. p. æ. vel minus.

Ptisana Catharctica. Bates.

℞ fol. senn. a stipit. liberat: Glycyrr: Coriand. ā ℈j. aq. font. calent. ℥vi y viij. macer. p hor: 3. f. colat. clara 5 aut 6. operatz.

Feb. 16. 1712.

℞ Rad. Ipecacuan. pulv. ℨß. sum. horâ vespert. in Cochl. ij. liq. possetici, ac in ejusdem operatione bibat eundem liq. ad ℔ v. vel vi.

Postquam se in lectum contulerit bibat haustz seq.

℞ Aq. ~~Lact.~~ Alexit. ℥ij. Cinam. hord. Absinth. comp. ā ℥ß. sal. Absinth. gr. v. Cochinel. pulv. ℈j. Syr. Limon. ℨvi. M f. haustus.

Repet. hic haustus cras primo mane, nocte crastinâ, ac postridie mane.

mr Hinde.

cum non haberi potest aq. absinth. comp. tum ℞ aq. Lact. alexit. unc. iij. aq. Cinam. hord. dr. vi. sal. absinth. ℈ß. fl. Camom. pulv. ℈ß. p ℈j. Cochinel. pulv. ℈j. syr. Limon. dr. vi. M

Pro potu.

℞ Aq. font. unc. XXVI.
succi Limon.
sacch. albi, ā unc. ij.
Cochinell. scr. j.
coq. ad despumationem, tum add.
aq. Ros. Damasc. unc. IV.
per sufficientiam depuretur.
Fuller.

vel

℞ succi Citri unc. ij.
Rob. Ribes. unc. iij.
Nitri puri scr. j.
Dec. hord. unc. LX.
M ad sitim.
Boerh. mr Erskine.

Jam:

[illegible] cornua suspensa de collo infant urinam cohi: dicunt. Schrod: Dale.
Pulvis Spodium (vulgo Powder of Post) infants excoriationibus convenit; ut et Cerussa. Dol.
Panca [illegible] pollutionibus convenit.
Cacumina Sabinae sive sylvestris et Savina, menses valide movent, fetus qz interimunt, expellant. Blanc. Dale. [illegible]

[illegible] Farinacea (Powder of post dicta) pulv. alcoribus humidis & fluidis [illegible] exsiccat: et mulieribus familiaris est in excoriationibus infants exsiccand.
[illegible] (wood-lice; Sows or Church Buggs) vivi impositi Phagedenam perimunt.
☿ vivo penna inclusa et circa collum ligato, ut sæpe faciunt milites, pediculos abigit.
[illegible] ut si sit annulus in digito, ex [illegible] annulus ad ignem approximetur, avolabit ☿ [illegible] quousque [illegible] penetraverit.
He that has seen such a thing has more reason to believe it, than he that has not seen it. Boy.
In rebus Physicis affigenda sunt potius pondera credulitati, quam addenda plumæ. Bagl. de Tarant. p. 4.

Omnia purg. ex [illegible] alvos durant, plus minus faciunt post communem usum ad q. incommodum prævenienda, purganti addo ☿ d. gr. iij ℞ 12. et desiderata habebis. præsertim pilulis additis ☿ dulcis ☿ d. in Medicos compositorum virtutibus specialibus. Walsh. p. 201, 202.

Ad foramen aliqd dilatandum, Spongia præpta, medulla sambuci compressa, rad. Gentianæ, in usu sunt: abstergit humoris lumentia, ut [illegible] ex arpta [illegible] per poros corii transit.

Chalybs condita, sicut caroy. [illegible] purgans & cathart: Epsom salt. & quomodo fit p. 140 [illegible]

Vomitoria Vinum Emetic. Dos. ℥ij. Tart. Emet: specialim in feb. intermitt: Dos: gr: x & xv. Hypopec: in vomendi conatu, stomachum enim roborat. Dos. ℥ß & ℈ij. Vitriol. alb. Dos. ℈j dissol. in ℥iv & vi [illegible] dilutans [illegible]. N.B. Vitriolum inter omnia vomitoria stomachum optime evacuat, et post evacuationem corroborat. Mayern. 62.

☿ vivus et ☿ dul: operantur velut et diversis: Glenc: [illegible] ℞: Spica [illegible] ad abigendos pediculos, [illegible] ut et [illegible]: sed hoc [illegible] vivo confecti virilitatem adimit. et [illegible] [illegible] abigit et virilitatem per [illegible] [illegible] domestam restituit. Schenk. 533.

I [illegible] it were, to be undone
I must not cannot, love the [illegible]
Love is the [illegible] & my fate.
Mrs Behn's poems p. 112.

In Hydrope. Diuretica fortissima sunt rad: Ebuli; Iris, Gratiola, Cucum. sylv: fol. Soldanellæ, infusa in Sp: vini tartarisato, medulla sambuci, crocus, crystallus mineralis, rad. Rusci, polypod. & acori veri, quæ infusa in vino albo, bonos producunt effectus. Sudorifica [illegible] bona, Antim: Diaph. à gr: 6 ad 20. in vehic. proprio, ut aq. C.B. Sal. armon. et tartar. separatim et alternatim, seu alter a tergo prioris, à gr: 4 ad 10. āā exhibita. Sp: vol. sal. Armon: à gtt: 6 ad xx. Aq. C.B. et Menth. à ℥ij ad vi. Sal. vol. tart. Urinæ, Viperæ C.C. [illegible] à gr: 6 ad xvi. [illegible] viper: ad gr: xxx. tegendo rationem acuitate [illegible] [illegible] illorum Medicorum. Aperitiva propria, Nitrum seu sal petræ purificatum à gr: x ad ℈j. Sal armon. gr: vi ad xxiv. Jallap: gr: x ad ℈j. Res. Jallap: gr: 4 ad 12. Resin: Scammon. gr: 4 ad 10. Cryst. tart. ℈j ad ℥iij. Tart. solub: à gr: 15 ad ℈j. Sp: [illegible]: et Sp: Nasturt. à gtt 15 ad ℈j. Extract. [illegible] ℈j ad ℈j. præter infinitos alios numero. [illegible] Vang. 29. Sp: Salis à gtt 4 ad 10. Panac. [illegible], gr: 6 ad 20. id. p. 75.

Potio purgans mihi exhibita Febr 17. 1700. à J. Mitchell. ℞ fol. orient: ℥iij sal. ☿ gr: xv. Sem. Anis. Lenic. āā ℥ß. Liquirit. ℥ij. infund. postea calide in aq. font: ℥iv. in colat. dissolve syr: de Rosar: ℥j Elect. & succo ros: ℥ß. [illegible] f. potio.

℞ Vini spiritu [illegible], sed cum parte, utiquas minus moras habuit in vere, ubi radij solares magis [illegible] pertinerunt, adeoq. mea sententia majorem inest [illegible] vinis suis partis rigidis, et tartareis, [illegible] dolores quo continentur, mihi spiritum habeat, distinguit. Zyp. B. 2. c. 3. art. 4.

Not. 2. Never use cold bath but with flannel shirt. 2. If it will not heal after it, it does not benefit.

Plura ad hæc excerpta [illegible]

[illegible] ex polline seu tritico [illegible] primo [illegible]
[illegible]. Similaginea, qui non ab omni furfure, sed à crassiore tantum [illegible]
vel locum. Contrà [illegible] qui omnem fur[illegible] adjuncta habet [illegible]
[illegible] deniq; omnium minimè nutrit. In ex hac [illegible]
adjunctos furfures non ita obstruat, sed alvum laxet et medio [illegible]
autem et Similaginea vi[illegible] sua obstructiones pariunt. [illegible] Part: [illegible] C. 5. Art. 3. §. 5.
[illegible] cocti seu elixi faciles [illegible] enim molliores [illegible] nutriunt.
quia succo nutritivo magis [illegible]
[illegible] bonitas penes [illegible] coloris, et saporis æstimanda [illegible]
non ad [illegible]. Sed ventriculo et vi[illegible] optima est. Aqua fontana [illegible] 19.
[illegible] commixtionem non bonis est, [illegible] enim est ut [illegible]
ad illos cibos [illegible]. ib. §. 22. [illegible]
[illegible] purgans à nutrire assumpta [illegible]
et non nutricem. ib. P. 2. C. 3. Art. 5. §. 3. [illegible]
Bolo panis masticati soli expositus in chelys converti[illegible]. ib. Art. 12. §. 3.
Ubi grati aliquid olfacimus, videmus, aut [illegible] aliquid appetimus, [illegible]
[illegible] saliva, quia nervi paris vagi, non tantum propagines ad ductus glandulas
salivales demittunt, verum etiam [illegible] ad nervos olfactorios [illegible]
unde facto in hos influxu [illegible] nervos paris vagi [illegible]
[illegible] fibrillarum contractione ductus salivales angustantur, et salivam
ejiciunt. ib. art. 12. §. 5. ✠ plura.

[illegible] in æstate nimia [illegible]
impedita [illegible] augent [illegible]
[illegible] ad ignem accedendo [illegible]
[illegible] vapores avolant. Hinc [illegible]
[illegible] sub umbra arboris; item [illegible] currens extra radios solares [illegible]
[illegible] dormien[illegible] gravati [illegible]
[illegible] et madentes et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ✠ Justit: [illegible] Sudor. ✠ pag. [illegible] ☉

[illegible]
[illegible] sint purgandi [illegible] quantum, et quibus. 4. quo tempore. 5. [illegible]
[illegible]
[illegible] suppriment [illegible]
[illegible]
[illegible] graviora [illegible] purgari [illegible]
purgat [illegible] præmitti [illegible]
in bolo et maximè in pilulis, ut interea dissolvatur. [illegible] ✠
[illegible] ✠ pag. [illegible]
[illegible] monstrum est arboribus, et [illegible] sanguine circulatus [illegible]
et si in plantam [illegible] semina sua habet [illegible]
[illegible] guttato à canibus [illegible] in rabiem agit, et hominibus [illegible]
[illegible] reliquo sanguine [illegible] mentes [illegible]
aliàs [illegible] manutenere
non possit. ✠ [illegible]

[illegible] non semper sunt salsa, sed [illegible] ✠ pag.
[illegible]
[illegible]
[illegible] in aqua aut liquore alio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] C. 2. art. 4

[illegible] ductus thoracicus [illegible] aorta, cor [illegible], ex opposito [illegible].
[illegible] thoracem immissa [illegible] ita à chylo continuo vertus ductus appellentur, omnia vasa intra distencantur ut natura [illegible] conformatio, et valvulae clarius in conspectu veniant; et si experimenta [illegible] mox à pastu instituantur, ac per horam continuentur, usque cani sanguis [illegible] [illegible], [illegible] autem ductus thoracicus aliquo tempore ab anguis [illegible] digito fuit liberatus: nam sicut tunc chylo transitus largus ad cor, sic sanguini [illegible] mediam horam à ductus relaxatione; ex secta vena effluenti, chylus ad oculos innatat. [illegible]

[illegible] temperamentorum, calidi et sicci; calidi et humidi, frigidi et sicci, frigidi et humidi. [illegible] Zyp. [illegible] 2. c. 3. [illegible] 10, 11, 12, 13, 14.

Viri foeminis [illegible] sunt calidiores [illegible] Zyp. p. 2. c. 3. art. 3. [illegible] 4. caloris enim [illegible] [illegible] est [illegible], [illegible] partes firmiores, actiones [illegible] [illegible], major ad [illegible] facilitas, minor abundantia cruditatis, [illegible] quae omnia [illegible] calore majori [illegible] judicant. [illegible] foemina, cujus [illegible] capere, quia [illegible] non tam calori, [illegible] malitiae et [illegible] [illegible] etiam facit quod [illegible] sang. [illegible] nam [illegible] non [illegible] quod [illegible] consumatur, adeoque [illegible] minore [illegible] calore [illegible] proportionaliter explicantur. major illarum iracundia et [illegible], nihil [illegible]; [illegible] enim ex superbia illarum et nimia de se [illegible] [illegible] venire, posterior ex animi infirmitate majore. [illegible] interim viragines quasdam esse maribus calidiores, et [illegible] jam [illegible] [illegible].

[illegible] in [illegible] abundantia [illegible] humiditates, adeoque incolorati et albi, [illegible] circa tempora, quia excrementa ibi [illegible]. [illegible] autem in illis [illegible] ex defectu materiae crinium [illegible] vapor [illegible], aut saltem quod [illegible] ob pororum constrictionem ad [illegible] non perveniat, quod quia [illegible] [illegible] [illegible], ideo ibi primò incipit calvities. (Etiam ob acrimoniam [illegible] et materiae crinium) [illegible] p. 2. c. 3. art. 3. [illegible] et [illegible].

[illegible] calor nativus [illegible], suffocari, dissipari, [illegible] explicat: Zyp. p. 2. c. 2. art. 1. [illegible] 16.

[illegible] an possit [illegible] lacteis et ductu thoracico comitari, et non solius ex faecibus tota [illegible] expoliat, merito dubitatur, cum chylus in ductu thoracico, [illegible] vasis lacteis, dulcis sit [illegible] lactis, et magna è contra lactis copia, et paucis bilis guttulis, imò unica inficiatur [illegible] amarescat — [illegible] bilis imprimis [illegible] succo pancreatico, qui in duodeno ipsi [illegible], chylum ex ventriculo delapsum fermentare, vel quod in ventriculo [illegible] dissolutioni [illegible], in intestinis [illegible]. Et verò bilem [illegible] farinaceis instituit [illegible] [illegible] ad [illegible] valet. Zyp. [illegible] bilis flavae [illegible] [illegible] p. 2. c. 3. art. 9. [illegible] [illegible] [illegible] coronariam [illegible] 60. [illegible] melancholico [illegible] [illegible]

⊙ [illegible] concurrit ad [illegible] bilem [illegible] [illegible] et etiam quia [illegible] magna pars [illegible] [illegible] sordibus ipsorum [illegible] [illegible] transpiratione [illegible]. Zyp. p. 2. c. 3. art. 17. et pag. praeced. ad ⊙

[illegible] foramina [illegible] lachrymalis et [illegible] lachrymalis fluunt lachrymae ad nasum, unde aliquis [illegible] acrimonia [illegible] excitant, [illegible] [illegible] per eadem foramina [illegible] partim intrant nares, [illegible] consequentia [illegible] Zyp. p. 2. c. 3. art. 19. et plura.

[illegible] solent tempore duodecim, octo, imò quatuor dierum, à sang. [illegible] [illegible] Zyp. p. 2. c. 3. art. 21. [illegible] urinam, sudorem, et chylus ipsi superfluus amnione contentus. ib. art. 22

[illegible] parvum [illegible] [illegible] partis sic ut [illegible] illam venire non possit, illicò [illegible] spiritus, quia [illegible] partis [illegible] ib. c. 4. art. 1. [illegible] 3. [illegible] [illegible] et motus [illegible] non enim [illegible] quia [illegible] influens non sufficit ad motus [illegible]; [illegible] in [illegible] qui dissipantur, et in venas [illegible] [illegible] 87. — [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] nervorum [illegible] in cerebro. 3. [illegible] partes [illegible], quae motus nervorum [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] partem [illegible] proprios et etiam [illegible] in nervos vicinos, [illegible] causa [illegible] [illegible] partes [illegible] intra venas et ventric. [illegible] ventric. [illegible] illo [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] continuatio [illegible] [illegible] [illegible] nervos [illegible] [illegible] motus peristalticus [illegible]

fallem ex verte fluat, praesertim in apoplexiâ et aliis morbis soporosis [illegible] c. 4. [illegible]
[illegible] ex cerebello, et [illegible] per vasa [illegible] ab anima non determinantur. P. 3. art. 3.
[illegible] in meningas [illegible] membranas et consequenter tamen [illegible] qui nec in [illegible] [illegible] sto:
machalis [illegible] [illegible] Cancri, [illegible] calcinati, Margaritae, Unguia, sp. vini, &c. ib. c. 7. art. 3.

aliqui à paullo rigeant et horrescant fit ex eo, quod pole nostri semper frigidi sunt, et
[illegible] nostrorum alimentorum frigore numerosi ventricis nervi irritantur, et sic fibrillarum
motu spirituales magis agitantur, et subito etiam vehementius in corporis [illegible] excurrunt. — [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] causa rigoris, ideo actu et potentiâ calida rigorem non faciunt. ib. c. 7. art. 4.
[illegible] velocitate circulationis sang. + Zyp. P. 3. c. 7. art. 6. [illegible]. 10. Keil, [illegible], &c.

Aer sang: singulis inspirationibus commixtus, eum refrigerat, quatenus [illegible] aere ignei
[illegible] partes [illegible] expirantur, quae sang. destruunt, quia [illegible] liberius moveri
possunt. Hinc colliges, cur in montibus excelsis et locis calidioribus aer respiratu [illegible]
[illegible] sit, et homines ex illo in animi deliquia incidant, sc. quia cum rariore [illegible]
dem aere sanguis non satis condensatur; nam partes igneae inspirati aerem [illegible]:
tem partes tam molles et flexiles, et poros tam variantes, non satis involat. —
E contra vero aerem frigidiorem inspiratum nocere, colliges, quia sang: [illegible]
reddit, eo quod igne suo [illegible] nimis depauperet, etiam, quia nimis violentius [illegible]
calorem obruit. [illegible] etiam suâ sang. coagulat, et obstruet. [illegible] part. 11.
[illegible]. 12.

Clariss. Sanctorius in Medicinâ suâ Staticâ ad trutinam rigorose dicit observasse in=
sensibilem transpirationem fere tam esse, ut ea quae [illegible] et [illegible] [illegible]:
ret mediatatem; immo quindecim dierum spatio non plus quam [illegible] excerni, [illegible]
[illegible] per insensibiles poros cutis. Mirabitur hoc nemo, qui [illegible] advertit expira=
re, quam inspirare, et qui expiramentum suum ad [illegible] in multam statim humiditatem
videt [illegible], [illegible], aut qui advertit quantum per [illegible] attactu [illegible] aut [illegible]
[illegible] evaporamento [illegible], ut [illegible] de caloris corporis partibus proportionali
omni momento expirantibus. ib. c. 7. art. 13. [illegible]. 3. — [illegible] generat. —
[illegible] [illegible] [illegible], et [illegible], ut ita dicam, humectali [illegible] [illegible] [illegible].
ib. art. 15. [illegible]. 3. — D. Van Horne, exactus anatomista, in quadam ad T. Bartholinum
Epistolâ, [illegible] ramos prope aortam cruralem divisionem ad utrumque [illegible]
[illegible] scripsit [illegible]. ib. [illegible]. 9.

Aqua nutrit, non enim simplex est elementum. Pisces in lagenâ contenti [illegible] aq. nutrien=
[illegible] augeri experientiâ compertum est, et aquam [illegible] plantas, fructusque, ex eo [illegible]
quod [illegible] ipsâ terrâ cui insertae sunt aliquando multo graviores deprehenduntur. — [illegible]
[illegible] vinum est [illegible] saporis non est adeo austeri aut dulcis, sed medii quoddam modo. Vin.
dulce multum solet nutrire, pectori est amicus, sed [illegible], [illegible]. Austerum pectori inimi=
cum est multumque astringit. Fragrans vinum mirifice [illegible] [illegible] tamen caput
gravat. [illegible] est album nonnihil calidius, multum tamen aperiunt et urinas movent.
Rubrum roborat stomachum aliasque partes, et laudabilem conficit sanguinem; [illegible]
[illegible] grossum generat sang:, magis nutrit et obstruit. [illegible] magis aperit, [illegible] —
vias [illegible], sed non ita nutrit. Vinum recens sive mustum minus calidum est, quam
antiquum, sed flatus generat, nisi [illegible] flaxet. Antiquum magis caput [illegible]. Rhenanum
ob summam suam tenuitatem, et [illegible] crudiatem humores [illegible] in fluxum con=
citat ac à massâ separat, atque hinc Arthritidem producit. — [illegible]
conservat, et sang: purificat. — [illegible] hydromel [illegible] facta crudior
est et obstruet: interiores; multa cocta et despumata deobstruit et grata est pectori.
— Sydra frigida est, grata quidem [illegible], sed flatulenta, et caput [illegible]. — [illegible]
nonnihil amplius, quam nimis [illegible] comedere, et aliquid voluptati et saporis gratitudini
[illegible], quam necessitati et [illegible] fami concedere; sic enim [illegible] ventriculi [illegible]
ut ad minores aliquando excessus non ita graviter afficiatur; sed [illegible] etiam concoquat.
[illegible]

Damnosius tamen est in cibo quam in potu excedere, siquidem ille fibras ventriculi diuturnâ expansione ita laxat, ut cibos postea non complectatur; praeterquam etiam quod cruditatem grossiorem post se relinquat, unde obstructiones, viciatae concoctiones &c. potus vero citius suas vias permeat et excernitur, ejusque damnis citius potest occurri. ¶ plura de quand. potu, aquae bonitate, &c. p. 1. harum excerpt. v. 1 Syp. P. 3. Art. 3. & 10.

[illegible] ang. motus incedendo celerè seu currendo frequentiore suo per cor transitu magis incalescens ad respirationem frequentiorem irritat ut refrigeretur aere inspirato. P. 3. Art. 5.

Contagium est velut morbi seminarium quoddam, debiliusque sub mole minimâ magnam vim et energiam, totamque suam essentiam continens; atque hujus defectu contingit, non omnem morbum esse contagiosum, non obstante quod vix ullus sit, quin aliqua sua habeat effluvia. — [illegible] Morbus ex semine in primâ conforma[tio]ne [illegible] ipsi communicatus vocatur haereditarius seu connatus; ut et communicatus foetui ex nutrimento, aut infanti ex lacte, commutritius nuncupatur. — Morbus invectus à veneno viperae vendicatur contagiosus (nam ad hunc requiritur ut alter similis + quod contagium aptum sit praeparari, ut in specie, &c.) + [illegible] non morbida [illegible], sed venenata potius, eo quod venenum illud viperae sit connaturale, et non morbificum. P. 4. c. 1. art. 9.

Morbi Pandemii, seu com[mun]es, sunt morbi ejusdem speciei, qui plures eodem tempore, et in eadem [illegible] + pluribus regionibus invadunt. Pandemius alius est Epidemius, seu popularis, qui est morbus ortus à causâ aliquâ com[mun]i nulli regioni propria plures uno tempore et loco invadens; ut pestis, angina, + pleuritis epidemica; alius est Endemius seu patrius, Morbus sc. ortus a causa aliquâ com[mun]i certae alicui regioni propria. + hic instantias, ut et in praxi Glene. de [illegible]. Morbi Sporadici seu Dispersi, a dispersione sic dicti, sunt morbi diversae speciei, qui plures eodem tempore & in eadem regione invadunt; ut pleuritis et ophthalmia &c. P. 4. c. 1. art. 10.

[illegible] acutissima finitur tertio aut ad summum quarto die, ut et etiam febris pestilens; febris ardens durat ad summum ad 7mum diem; febris continua non ardens durat ad summum ad 20mum diem. ibi art. 11.

De Morbo haereditario, et difficultatibus circa ejus doctrinam, + Art. 16. Morbi potissimum haereditarii hi sunt, Podagra, Nephritis, Apoplexia, Melancholia, Phthisis.

Morbi tempora sunt principium, incrementum, status, et Declinatio. In Declinatione morbi nemo moritur, tantum ex eo morbo cujus ita est declinatio; devicta enim aut expulsa tum est morbi causa: potest tamen in illo adhuc mori ex alio morbo conjuncto + super veniente, + deficit requisitorum ad vitam, ut in senibus. Paroxysmus est tempus exacerbationis in morbis per vices invadentibus, et in eo etiam sunt principium, incrementum, status, et Declinatio. Periodus seu circuitus est tempus exacerbationis et remissionis in aliquibus morbis, seu tempus quod est a initio unius paroxysmi usque ad initium proxime subsequentis; unde morbi dicuntur periodici seu servare suam periodum, qui regredi[un]tur statis temporibus. Typus est ipse ordo intensionis seu exacerbationum et remissionum in morbi forma, seu modus periodi. Ita morbus dicitur servare typum suum, cum paroxysmi eodem invadunt, declinant, &c. h.e. cum tempus intensiones et remissionis ordinate et aequali ordine sibi invicem succedunt. P. 4. c. 1. art. 17.

Causa morbi procatarctica et causa cuivis evidens, h.e. causa cui a quovis sanae mentis nata est statim morbus imputari. Causae morborum sunt Procatarctica, Antecedens, et Continens; + potest Externa et Interna, + Proxima et Remota. P. 4. c. 2. art. 1.

[illegible] humores praeternaturales recensentur flatus, nam ex humoribus proveniunt, maxime ex cibis et potibus, praesertim intestinali, quae dum ex bile et succo pancreatico fermentatur in intestinis, sicut in aliis liquoribus fermentatione accidit, resolvitur in vapores crassos et tenaces subinde qui instar aeris rarefacti agitantur, fluctuant, et partes quibus continentur expandunt, donec illorum coalescant ad se invicem, aut discedant, aut aliter excernantur. Eorum praecipua sedes sunt intestina, quia ibi habetur mâa [illegible] et causa eorum [illegible] et sua continuo, ideo vix unum intestina sunt sine flatibus. P. 4. c. 2. Art. 2. + [illegible] opt.

Gradationes Doloris species sunt 4. Gravativus, [illegible] parenchyma afficit. ab humore ipsu, vis, [illegible] aut corpore duro nervos comprimente: Tensivus, à flatibus aut humoribus mitioribus nervos à se invicem membranam [illegible] ostendit. expandentibus; Punctorius, ab humoribus acribus et corrosivis fibrillas nervorum partis a= mantis et [illegible] [illegible]; Pulsatorius, à nimio sang: impetu et affluxu partes in= flammantes. — Moritur aliquis homo mero ex nimis acerbo et diuturno dolore, hac ratione [illegible] quia motu et majore fibrillarum nervosarum motu pori cerebri multum aperiuntur, Spiritusque vehementius agitati, et in partes alias largiter influunt, quo fit ut non tantum plurimi deperdantur, verum etiam proportionatè in cor influentes, illud, quod diutius constrictum fuerant, [illegible] saltem ita lassent et fibras ita solvant, ut sang: debitè non protrudat, sed per= mittat grumescere. P. 4. c. 3. art. 2.

Signum Diagnosticum est quod aliquid praesens significat. Prognosticum, futurum. Com= memorativum, praeteritum. Signum Pathognomonicum, est quod inseparabile est à morbo, et illi morbo soli proprium. P. 5. c. 1. art. 1.

Signa Plethorae, Cacochymiae, et Solutae. [illegible] P. 5. c. 1. art. 3. et etiam in Walschm.

Crisis est subita morbi ad vitam vel mortem mutatio. — Magnus dolor capitis, rubor faciei, Splendores ante oculos, haemorrhag. narium prognosticant — ib. art. 7. et Walsch. & Instit. nostr.

Pulsus est valdè fallax, ut ad corporis et animi motus subitò mutabilis; solaque sollicitudo aegri dubitantis quomodo se habere Medico videatur pulsum immutat. — et quae habet contra pulsum Durus et [illegible] causas communiter assignatas. ib. art. 8. De aliis ad pulsum pertinentibus et seqq. et Instit. nostras.

De Urinis et de Sede P. 5. c. 1. art. 14, 15, 16, 17, 18, 19. ubi et Excerpta mea, et [illegible] practicas.

Venae quae secari solent sunt, in capite Jugularis, temporalis, frontalis, sublingualis. In Brachio Cephalica, mediana, Basilica. In manu Salvatella, Cephalica. In pede Ischiadica, Saphena. — In V. S. cavendum ne adjacens nervus vel tendo laedatur, ne convulsio, aliaque gravia accidentia, imo mors sequatur; et subjacens art. sic enim sequeretur aneurisma. Cave item ne vulnus ex= cludendo, sang. quid inde [illegible] labia [illegible], ne inflammatio ex sequatur, sed probè [illegible] est, et deinde ligandum. Item ne temerariè secetur vena in [illegible] Variolis, Petechiis, aliisque ma= lignis febribus, ne malignitas ad aegri interiora in venas inanitas irrepat, ac foras [illegible] [illegible]. Neque in febris statu ubi vires non impediendae, nec in [illegible] frigore si sint intermittentes; neque etiam in Gravidis, praesertim in graviditatis initio et fine, saltem in pede, ne fetus, laxius utero alligatus, propria sui vel uteri ad effluentis humoris copia — excutiatur ante tempus; in brachio gravidae V. S. minus habet periculi, solentque jam Domi= nae multae eam sub graviditate sua instituere, putantes hoc fetus [illegible] conferre, neque malus saepe successus illis videtur. &c. — Quo melius vena in conspectum veniat inji= ci ipsi solet ligatura [illegible] loci aperitionis, quâ sang. venosus ad cor rediens nonnihil in vena sistatur: fricari etiam vena solet, et manus claudere digitosque movere aegro injungitur; aut si in pede, ponitur in aq. tepente, quo sic sang: ab illa rarefactus magis affluat, injectâ interim superius ligatura. Ubi vena jugularis et sublingualis secatur, ligatura non nimis collum stringat, ne patiens suffocetur. Secetur vena obliquè (ex= ceptâ frontali) sic enim non ita subterfugit incisionem. Si sectâ venâ, foramine tamen mediocri, sang. non effluat, relaxanda nonnihil superius est vinculum, quod simul coarctat subjectam venae arteriam, et patiens tussiat ut motus sang. pulmonum contrac= tione accelerentur. Ne patiens incidat in Syncopen, frigidam ore teneat, aut si jam in= ciderit, ea vi aliqua in faciem ejus projiciatur, (et occludantur os et nares manu Chir= urgi; et inclinet caput et corpus, aut decumbat horizontaliter in latus aut dorsum.) [illegible] — Venas jugulares, omnes in toto corpore tutissimè secari possunt, quia patentes sunt, ac sine subjectis nervis, arteriis, et tendinibus. [illegible] [illegible] est primam V. S. aliquem proxima sua vita vice per aliis à primo morbo li= berandum. — V. S. refrigerat et calefacit; refrigerat in febr. qualibet accelerando motum sang. ad venam inanitam, sicut ut illa tam per venam quam per art. celerius in venis mo= veatur, et sic ejus particulae desinant tam celeriter et confusè inter se agitari, in quo tamen motu confuso et celeri maximè consistit calor febrilis, et [illegible] quem partes corporis potissimum alterantur. (in minore etiam sang. quantitate, minor proportionatè est calor.) Calefacit verò in plethora, in qua cordis ignicula sang. copiâ supprimitur, aut saltem sang. ob variorum per cor transitum, difficilius in corde rarefit et agitatur. — Quantum ad albentes illas fibras, quae in sang. aquâ [illegible] in conspectum veniunt, non sunt nisi particulae [illegible] [illegible] non satis discerp[illegible]

dissoluta, sed se mutuò apprehendentes & cohaerentes. — In excreto sang. deinde sanguinis concre[illegible]cat; si enim in febr. v.g. non concrescat, maximam ejus dissolutionem et corruptelam denotat. Extra febr: significat chylificationem et sanguific. in[illegible] sufficientem fieri, ac utriusque calorem esse debilem. 2º si sang. valdè fibrosus sit et crassus, multis concretionibus, signum est roboris, bonae chylific. sanguific: & nutritionis. sed non adeò magni ingenij, eo quod ex tali sang. non nisi grossiores minusque agiles sp. cudantur. 3º si multus seri sang. concreto supernatet, indicatur largior potus ingressus, vel imbecillis calor, vel insufficiens per urinas vel insensibilem transpirationem excretio. 4º si denique sang. concreto supernatet massa quaedam instar pellis concreta coloris albicantis nec variegati, non statim clamandum de sang. corruptelâ, uti solent imperiti, sed saepè reliquia est seu chylus, qui cum sang: in eum vertendus erat, circulabatur; idque tantò frequentius reperitur in corporibus cacochymicis frigidis, quantò tardius illa chylificant. Zypp. P. 6. c. 3. Art. 1. §§. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Plura vide in Instit. nostris, Sennerto, Nuck, &c. de V. sectione.

Sanguis qui fluens inibi educitur bonus solet esse, et quidem ex optimo, siquidem sc. per partes suas etiam aut tenuiora ejus vascula. P. 6. c. 3. Art. 3. §. 5.

Vomitus faciunt aliquae quae seria non sunt sed more perturbabundo, eo quod cum acido ventric. salivâ, aliisque ejus contentis non possunt bene commisceri, unde fluctuant in ventric. aliquali motu suo, et nauseâ quam pariunt, irritant sp. ad influxum copiosiorem ex cerebro in ventric. nervos et fibras, quas hi etiam vehementius et praeposterè contrahunt. Pariter ea, quae similiter degustant, vel ab aspectu rei ingratae, vomitus faciunt, qualia ad eam apprehensionem sp. quasi primo introrsum pulsi, postea vehementius tanto exeuntes ruunt in nervos ventric., vel quia in cerebro sp. coerciti, aut propter aliam rem ad influxum in fibras nervosas [illegible] impediti copiosius influant in alias partes, et consequenter in plexus nervosos abdominis, et exinde in intestinorum fibras (participant enim intestina ramos plures [illegible] mesenterij et aliorum) quibus ob minorem a sp. in superioribus pressionem [illegible] ductus deorsum. — Non evacuat vomit. tantum ex ventr. sed etiam ex intest. tenuioribus, ductu choledocho, et pancreatico, unde vomitorius multis convenit in affectibus ob humorum vitio in primis vijs. P. 6. c. 4. Art. 3. ubi plura de modo operationis vomit. &c. vide Instit. nostr. §. 137.

Purgantia partes tenuiores vasa lactea ingredientes, adeoque cum sang: circulantes, modo suo et acutie

* humores incidunt, attenuant, et detergunt, unde cum illis per ductum cholid: et pancr. [illegible] vero per art. mesentericas intestina subintrant; partes verò crassiores, quae lactea nequeunt intrare, ventric. et intestinorum tunicas, ad quas haerent, ac interdum illis arctè [illegible] variè torquent, abradunt, vellicant, irritant, ac debilitant, &c. — quare catharticae operationi ope sua motus, sc. humores in ventric. intest. et sang. dissolvendo, et ultimò fibras intest. motui peristaltico inservientes, orificiorum glandularum intestinorum, et ductus choledochi ad motum [illegible] humorum dissolutorum in sang. per hepar, pancreatem, &c. et in intestinis vorliganes ad excretionem irritando. Similiter agunt [illegible] moventia, sudorifera, diuretica, &c. — [illegible] purgans specialiter huic humori, vel huic parti, magis quam alio, [illegible] in hunc humorem, vel partem [illegible] figurae, magnitudinis, &c. variarum, magis in hunc humorem, vel partem agere, quam in alios. vide Cat. §§. 5, 6. Catharticum educit etiam bonos humores, tum partes sang. strictè dicti, et nutritivas. Multi etiam sp. ex massa sang. [illegible] intestina subintrant simulque cum aliis ejiciuntur (quod patet ex debilitate post purgationem fortiorem, et diarrhaeam). — Si aeger laboret peste, petechijs, variolis, &c. purgans [illegible] mox sudor et transpiratio, per quos non esset, [illegible] eo quod purgatio ab exterioribus ad interiora ducat, [illegible] variolas, &c. [illegible] [illegible] mo[illegible] [illegible], [illegible] et [illegible] intro mala [illegible] symptomatibus, et excretionis periculo illud in pancreas, hepar, ventric. &c. non sine magnis symptomatibus, et [illegible] existentibus, sponte vi nobis [illegible]. — Nimia massa sang. biliositate vel serositate [illegible] ut promptius a tenebris alvi fluxus accedunt. Humores tenuis in bronchijs pulmonum [illegible] eos ex illis aër in illis imprimis bronchiorum parietibus comprehendentibus et protrudentibus, commodissimè per [illegible] ad tempora morborum quibus purgandum est, si de [illegible] [illegible] morbis [illegible] ad [illegible] in declinatione, saepè etiam in initio, ut in multis morbis [illegible] morbificae. Quantum verò ad [illegible] [illegible] et [illegible] adhuc constant, [illegible] partem causae [illegible] intermissionis vel remissionis; quin juvat etiam in ipso [illegible] ad purgationem praestare tempus intermissionis [illegible] vel remissionis; quin [illegible] [illegible] [illegible] sit valdè [illegible], sic enim magis [illegible] vide Inst. nostras §. 141.

roxismo [illegible] vel catharticum [illegible] [illegible] vide Cat. [illegible] ad * bis. vide in Inst. nostras §. 141.

mola facilius [illegible]. Hypnotica sive somnifera, alia [illegible]

Quae somnum inducunt et dolorem leniunt aliqua, sunt leniora hypnotica sive somnifera, alia fortiora soporifera, narcotica, sive stupefacientia vocata, suntque [illegible] [illegible] frigidiorum [illegible] humiditate (ut aq.) vel crassitie (ut [illegible]) cerebri spiritus gravant, vel fibrillarum cerebri compa[illegible] [illegible] [illegible] aut vi alia sua viscositate sp. [illegible] et ad [illegible] con=

-ne obturant, v. sp. vias ad nervorum initia nonnihil oppilant (ut opium) sic enim non fit debitus influxus sp. in organa sensuum externorum, aut ipsa organa, praesertim eorum fibras suas, quae ad vigilias v dolorem a sp. tendi debent, ut super illis impressio motus ad sedem animae propagetur, non amplius sunt disposita, adeoque somnus induci debet, dolorque sedari. P. 6. c. 4. art. 12. v
Instit. nostr. §§. 100, 101, 102, 103, 104, 105.

Fere omnia Alexipharmaca sunt Antiscorbutica.

Dale. Blanc.

Abrotanum. [illegible] summitates. Hepat: [illegible] Dropsie.

Abrotan fem: Lavender Cotton. Wormes necat.
Mas: Southernwood, Wormes necat, urinam movet, Ulcera.

Absynthium marin. Roman wormwood } Herba, semen;
Seriphium Marsh wormwood } Wormes necant. Stomachica.
Vulgare. Common wormwood } Hepaticae, Antifebrilia.

Acacia vera. Ejus succus incrassat, est Emplasticus. astringit.

Acanthus Bearsbreech. Emollit, est pro Clisteres.

Acetosa Arvensis. Sheeps sorrel } Herba, Radix, semen, succ.
Pratensis. meadow sorrel } Sitim sedant, refrigerant, inflammationes sistunt, appetitum excitant,
Romana. Green sorrel } choleram reprimit. In febr: conveniunt. calidae & hepaticae sunt, putredini resistunt.
Trifolia. Acetosella. Wood-sorrel. Herba. paululum astringit.

S.2. Acorus [illegible] Common Flag. Ejus radix [illegible] pro [illegible] sedat.
S.3. Verus. sweet smelling Flag. Radix in usu. Stomach: Anticol: cephalic: Alexipharm: emenag: in obstr: hepat: et lienis, et attenuat, aperit.

Adianthum Album. Wall-Rue — } sunt pectoralia, hepatica, splenetica. Diuretica; antiscorb:
Aureum. Goldilocks — }
Nigrum. Black Maiden-hair

Paeonia [illegible] Peonie flower.

S. [illegible] aperientibus, diuret. [illegible] Apothecariis: [illegible]

Agnus Castus. Chasttree. tumores discutit. menses movet. Diuret. Venerem cohibet.

S. Agrimonia. Agrimony. [illegible] Hepat: Vulneraria: cachectica. phthisica antiscorb: hydrop: Herba.

[illegible] Stingon. Vulneraria. haemopt: [illegible] omnes.

Althaea. Vervain Mallow. Herba. Emollit, alvum laxat, anodyn. calorem: maturat.

S.2. [illegible] Ejus [illegible] Diuret: [illegible] venenosi ut solanum.

S.4 [illegible] pectoral. [illegible] Diuret:

S.4. [illegible] Radix. pectoral. [illegible] stomach: [illegible] flatulent: [illegible] pro ulcera.

[illegible] Common [illegible] pro calculis [illegible] Palle.

S. Alnus. Alder tree. Ejus cortex vomit [illegible] vomitus [illegible] hydropicos [illegible] astringit.

Aloe. Ejus succus Bilem purgat, Ulcera et vulnera sanat, vermes
f.h. Alsine. Chickweed. vulneraria et pro contusionibus externis.
c.h. Althaea, Marsh-mallow. herba, Radix. Diureticum anodyn. emollien: dolores Leoans, maturans, Discutiens, acrimoniam mitigat. pro calculo, asthmate, pleuritide. in Clyst.
Amara dulcis, Bitter-sweet, woody night shade. Hepat: Febris. hydrops:
f.s. Amaranthus, Flower-gentle. Ejus fl: adstringunt in Diarrhaea et Haemorrhagijs.
c.s.4 Ammi Creticum, Bishops-weed of Candy. Ejus sem: Antiseol: uterina, carminat: stomach.
Vulgare, Bishop-weed.
Amygdalus, Almond-tree. fructus anodyn: emollient: pro multis in febr.
Amoris poma, Love-apple.
c.h. Anagallis aqual: herba decoct. Water Purple, or Brooklime. antiscorb.
c.s. terrest: fem: fl. purp: Pimpernel. Sunt vulneraria, et
Mas fl. caeruleo — — — pro morsu canis. Non utuntur.
c.s.3. Anagyris, Bean trefoil, Bastard tree or colbagum. Menses et partus movet. Epileptic. pred. non in usu.
f.S.1. Anchusa, Alkanet. Radix adstringit in Diarrhaea et Haemorrhoid. Radix oleo soluta rubro colore tingit. Potroleo infusa et illita ad vuln. recognita et puncturas prodest.
Androsaemum, Tutsan. est vulnerarium. Parkwards.
c.s. Anemone, Wind-flower. menses movet, lac generat, vesical, tumores discutit, pro calculo, uterina dolorgit.
c.S.3 Anethum, Dill. Maturans lac generat, anodyn, discut: oleo in usu.
c.s.3. Herba, Rad: semen. Angelica, Angelica. sudorif: uterin: cardiac: optim. thorac: alexipharm. vulner: menses amovet, foetus expellit, suffoca: mulieri optimus, pro morbis malignis et peste.
c.S. Anisum, Anise. Ejus sem: Lac et semen generant stomach. thorac. Diuret. Carminat; Cephalicus.
c.S.2. Anonis, Rest-harrow. Diuret. nephrit: Hepat: Splenet: In usu sal fixus.
c.S.4. Anthora, Helmet-flower. Est Alexipharm:
c.S. Antirrhinum, Snap Dragon. Est Hystericum.
c.s. Aparine, Goosegrass. Vulner: et pro animalium morsu.
c.S.4 Apium hortense, herba, Rad: semen: Garden-smallage. Lithontript: Hepat: Splenet: Diuret:
c.S.4. Palustre. Water-smallage. Virtut: ut prior.
c.S. Aquilegia, Columbines. Semina pro ulceribus oris et faucium, calculo.
f.S. Argentina, Silverweed. herba, Radix pro Dysenter: et fluore albo. Vulnerari... est:
c.S. Aristolochia Birthwort. Radix uterina, Lochia et menses pellit. longa, rotunda.
c.S.3. Artemisia, Mugwort. herba Menses, Lochia pellit: uterina.
c.S.4. Arum, Cuckow Robin. thorac: asthmat. Antiscorb: anticol: Hepat. stomach, Diuret:
c.S.2. Arundo, Reed.
c.S.4. Asarum, Asarabacca. herba, Radix. Vomit, Diuret. foetus et menses pellit. Ejus rad: est optim: vomitor.
Asclepias, Swallow-wort.

t. Asparag. Sperage. Herba, Radix. Diuret. Aperit: Splenet: nutrit.

Asperula odorata, Woodroofe. ... Arthrit. et vulneraria. non usu.

c.s. Asphodelus Albg. White Asphodill } Horum radices Diuret. menses
Luteus, Yellow Asphodell } movent, pro scabie in usu

c.s. Asplenium, Spleenwort, or miltwaste. Aperit: Splenet: Diuret: Antihecticus.

t.s. Aster. Star-wort. pro Angina. non usu.

c.s. Atractylis. Distaff Thistle. pro Viperarum morsu.

f.h.3. Atriplex foetens. Stinking Arrack. menses et lochia pellit, Uterinum, foecundans.

c.h. Hortensis. Garden Arrack. Alvum laxat, Icteriis. nutrit.

f.s. Avellana, Filbert nut. nutrit

Avellana sylv: Hasel-tree.

c.s. Auricula muris. Mouse Ear. Herba. Vulner: pro Hæmorrag: et Dysenteria angina.

t.s. Ursi. Boars-Ear. Vulner: et pro Rupturis. non usu.

Judæi, Jews-Ear.

Avena. Oats. nutrit.

Aurantia. orange. fruits, lemon

c.s.3. Balsamita, Costmary: Herba. Cephal: Aperitiva, Diuret:

c.s.4. Barbarea, Winter cresses. Herba. Urinam, menses, et calculus movent.

c.s. Bardana major, Burdock. Semen. Radix. Stophril: Diuret: Vulner: Splenet: Arthrit.
Lappa, Asthmat: antiscorb:

c.s. Minor. pro Leprâ et Strumis. non utile.

c.s.3. Basilicum seu Ocimum, Basil. Herba. Cephal: pectoral: Diuret: Alexipharm:

t. Batata, Potatoes. Radix. Temperata Nutritiva.

c.h. Behen, Behen: or Lavender ꝑ Limonis.

Bellis major, Great Daisie. Herba. pro Hæmoptoe.

c.h. Minor, Lesser Daisie. Herba. Antinflam: Vulner: Ulcer: emlat:

f.s. Berberis, Barberry. fructus, cortex. sanguinem refriger: stomach: antifebril.

t Bola alba et rubra, Beets. Temperat: Nutritiva.

c.s. Betonica, Betony. Herba, flores. Cephal: pector: pro Hydrops, Colica, Hepatic.

c.s. Aquatica, Water Betony. folia. pro Ulcer: Asthmat: Hydrops: folia Vesicam ac purulenta corrigit.

c.s. Betula, Birch-tree. Succus. Diuret. Hydropic: Lithontript:

c.s. Bifolium, Two-blade. Vulner: pro Rupturis, et Diarrhæa.

f.s. Bistorta, Snakeweed. Radix. pro Hæmoptoe, Diarrhæa, hæmorrhag: Alberg:

Blattaria, Moth-Mullen. Obstructiones viscerum resierat.

t. h. Borrago. Borage. flores. pro Melancholia. idem ac Buglosse. in febr: phth. ꝑ post.

c.s. Botrys, Oak of Jerusalem. pro Tussi et Asthmate.

t. Brassica, Colewort. Herba. Temperat: Nutritiva, Antiheet. Pectorale.

c.s. Bryonia, Briony. Radix. Splenet: hepat: Diuret: menses et fœtum movent.

t.h. Buglossum, Bugloss. flores. Cardiac: Antimelancholicum. in feb: phthis:

t.s. Bugula, Bugle. Herba. Vulner: pro Contusionibus et Rupturis. Hæmopt. phth.

c.h. Bulbocastanum, Earth-nutt. Radix. Nutritivum, Diuret: vermes creat.

Buphthalmum, Ox Eye.

f.s. Bursa pastoris, Shepherds purse. Herba. pro Hæmorag: Vulner: Diarrhæa, et Hæmorrhoid ulcera, et dysent: fluxu maliem. refrigerat, siccat, alvum constipat.

Buxus, Boxtree.

Bonus Henricus, English mercury.

Barba Capræ, Ulmaria, Regina prati. Ulmaria.

Blitum, Blite.

Brunella, v. Prunella, Self-heal. Consolida.

Bislingua. v. Hippoglossum, Double tongue, or Horse tongue.

c.s.3. Calamintha, Calaminth. Herba. Stomach: Hepat: Uterin. cephal:

c.s.1. Calendula, Marygold. Flores. Alexipharm. Flor. Card: Hep: Variolas expellunt, ℞ Bals.

c.s.1. Cannabis, Hemp. Arthrit: vermes necat.

c.s.2. Cardamine, Cuckow-flower. Antiscorb:

c.s.2. Cardiaca, Motherwort. Herba. Diuret: Uterin: Vermes necat. menses movet.

Carduus, the Common Thistle.

c.s.2. Benedictus, Blessed Thistle. Herba. Cephal: Cardiac: Alexipharm: sudorif: in feb: malig: et intermitt: vermes necat.

c.s.2. Mariæ, Ladies Thistle. pro Diarrhæa, Hæmorag. et Gargaris.

c.s.2. [illegible], Carline Thistle. Diuret: Diaphor: Alexipharm:

Ca[illegible], Corn-beam-tree.

c.s.3. Carum, Caraway. Semina. Carminat: Stomach: Uterin: Diuret:

c.s.2. Caryophyllata, Avens. Vulner: Alexiphar: Hepat: Splenet:

Ca[illegible]ophyllus, Gilliflower. in Conser. Cardiac. in feb: pestilent. et [illegible].

Castanea, Chesnut-tree. Semina. pro Diarrhæa et Dysenteria.

c.s.4. Catapuntia, Spurge. Herba. pro Hydrope: Ictero, Arthrit: Lepra, Fistulis.

c.s.2. Caucalis, Hedge Parsly. Diuret: Hepat: Uterin: Stomach. non utit.

Centaurium Majus, Great Centaury. non utit.

c.s.2. Minus, Lesser Centaury. Stomach: Hepat: Vulner: [illegible]: Icteric:

c.s.4. Cepa, Onion. Radix. Diuret. Uterin: Vermes necat.

Cepa Ascalonica, Scallions or Eschallots.

Cera[illegible] hort: et sylv: Garden and wild Cherries.

t.s.1. Cerefolium v. Chærophyllum, Chervill. Diuret: pector: Anticol: Vermes necat.

t.s.2. Chamæcistus, Dwarf Cistus or little Sun-flower. pro Hæmopt: Diarrhæa. Dysent: Vulner: non utit.

c.s.2. Chamædrys, Germander. Diuret: Sudorif: Antiscorb: Vulner: Arthrit: feb: intermitt:

c.s.2. Chamæmelum, Camomile. Herba. Flores. pro Colica, Flatibus, Uterio, Renibus, Doloribus. menses movet. in feb: intermitt:

f.s.1. Chamæmorus, Cloud berries. Similem Sedat, astringent. Antiscorb. non utit.

c.s.3. Chamæpitys, Ground pine. Herba. Vulner: Sudorif: Arthrit: Uter: Alexiphar:

f.h.2. Chamæmalus, Crab Aple. pro Siti et Inflammationibus. non utit.

c.s.3. Chelidonium majus, Great Celandine. Radix: Diuret: Hepat: Icter: Ophthalm:
c.s.3. minus, pilewort; Herba pro Scorb: Icter: Strumis, Hæmorrhoid:
f.s.2. Chondrilla, Gum-succory. ψ Cichorium.
f.s.2. Cichorium, succory. Herba: Hepat: Diuret: Vulner: refrigerans.
f.4. Cicuta, Hemlock. pro Inflammationibus et doloribus omnibus externis.
c.s.1. Cynara, Artichoak. Nutritiva et Venerea.
f.h.2. Citrullus, Citrulls. Cistus, Cistus. Ejus Sem: sunt refrigerantia. phthisi.
Citrus, Citron-Tree.
Clematis, Vinca pervinca, & Sutherland. Periwinkle; pro Dysent: Hæmopt: mensium et Lactis Fluxu.
c.s.3. Cochlearia Hort: et marina, Garden and Sea Scurvy-grass. pro Scorb: Hydrope, Ictero; Diuret: Hepat: Diaphor:
c.s.3. Colchicum, Meadow Saffron. ψ rad: Hermodactyli.
Consolida, Comfrey. Bruisegrout. Vulner: antihect: pro Diarrhœa, Hæmoptoe.
c.s.1. Media, seu prunella, self heal, or Bugle. Virtut: ex priore.
c.1.s.3. Saracenica, Saracens Consound. Virtut: habet prioris.
c.s.3. Coniza, Fleabane. pro Ictero, Chlorosi, Ulcere, Stranguria, pediculis.
c.3. Convolvulus, Bindweed. pro Hydrope et tumoribus induratis.
Coriandrum, Coriander. Ejus Sem: sunt Stomach: Carminat:
f.2. Coronopus, Buckthorne. Virtutes habet ut plantago.
fr.s.2. Cornus, Cornel-Tree. Fol: et Fructus astringunt.
c.1. Cotula fœtida, May-weed. pro Calculo, Hydrope, Ictero, Hysterica, Hepatica. ψ Chamæmelum fœtidum
Colonaria, Gnaphalium, Cudweed. pector: Vermif: pro pediculis.
f.1. Crassula, Orpine. Vulner: antidysent: et pro combustis.
c.s.2. Cratœogonum, Cow-wheat.
fr.s.1. Crista Galli, Cock's Comb. pro Tussi et oculorum panno.
c.2. Crithmum, Sampire. Diuret: Nephrit: Icter: Hepat: menses movens.
c.2.s.1. Crocus, Saffron. Flores Hyster: menses mov: Cordial:
s. Cruciata, Crosswort. Vulner: pector: Alexipharm: præcipuè ad Herniam
fr.2. Cucumis hort: Sylv: Garden and wild Cucumbers.
fr.2. Cucurbita, Gourd. Ejus Sem: inter Sem: frigida
f.2. Cypressus, Cypress-Tree. pro Dysent: Hæmopt: rupturis, polypo.

Cyanus Maj: Great Blew-Bottle } pro contusionib et Hæmorrhagijs.
Min: Corn flower

e.3. Cyclamen, Arthanita, Sowbread. Ejus rad: menses pellit, et pro strumis.

Cyperus, Ejus rad: Stomach: anticol: Cardiac:

f.2. Cynoglossum, Hounds-tongue. pro combustis, Inflam: Catarrhis, Hæmopt: Gonorrhœa.

Cydonia Malus, Quince-tree. Ejus fructus astringunt.

Cynorrhodon, Wild Rose. vide fructus.

Cicer, Chick-pease or Cicers.
Carthamus, Bastard-Saffron.
Cnicus, id. ac Carthamus.
Corylus. vide Avellana
C. Sylv: vide Avellana Sylv:
Cuminum, Cummin.
Costus hortensis, vide Balsamita.

c.S.2. Daucus, Carrots Diuret: nephrit:

Dentaria, Toothwort, or Coralwort. Diuret: nephrit: Vulner.

Dictamnus, Dittany. Cephal: Diuret: Uter: Carminat: Alexipharm:

Digitalis, Fox-Glove. Hepat: Splen: pector: pro Strumis et pleuritide.

f.1.S.2. Dipsacus, Venus Bason, or Teasle. Vulner: et pro Ulceribus.

c.S.3. Doronicum, Leopards Bane. Radix Cardiac: Uter: Alexiphar: contra Vertig: Epilep:

c.S.3. Dracunculus, Great Dragons.

Dens Leonis, Dandelyon:

c.s.3. Ebulus, Dwarf Elder. Diuret. Hydrop: Arthrit: pro Strumis.
t. Echiū, Vipers Bugloss. Lac general.
Elatine. Fluellen. v. Veronica.
c.s.3. Elleborus albus. Ejg rad: sternutat: pro Mania et Melancholia.
c.s.3. Niger. Black hellebor. Melancholiam purg.
f.2. Endivia, Endive. Hepat: Diuret: frigida.
c.3. Enula Campana, Elicampain. pectoral: scorbut:
f.1. Epimediū, Barren wort. Mammas detumescit et Sterilitatem causat.
f.3. Equisetū, Horse tail. Vulner: pro Hæmopt: et Hæmorrhag:
Erica, Heath. Diuret: attenuans, aper: astring:
Eryngiū, Eringo, or Sea-Holly. Rad: nutritiv: et Vener:
Erysimū, Hedge-Mustard, or Bank-cresses.
Esula maj: Great Spurge. Min: Lesser Spurge. Caustic: et purgantes.
Eupatoriū canabinū, Hemp like Agrimony. also Agrimony.
Euphrasia, Eye bright. pro suffusione.

Eruca, Garden Rocket.

Faba, Beans, or field-Beans.
Fænugræc, Fenugreek.
Fæniculum, Fennel.
Ferula Galbanifera, Fennel-Giant.
Filipendula, Dropwort.
Filix fæmina, Female Fern, or Brakes.
mas, Male Fern.
Florida, Flowering Fern, or Osmund Royal.
Flammula, Spearwort.
Fragraria, Strawberry.
Fraxinus, Ash-Tree.
Fumaria Bulbosa, Bulbous Fumitory.
Vulgaris, Common Fumitory.

Ficus, Fig-Tree.
Fraxinella, Bastard Dittany, or Fraxinel.

Galega, Goat's Rue: Alexipharm: Sudorif: Vermif: Stomach:

c.s.2. Gallium, Ladies Bed-Straw. Vulner: et pro Hemorrhagiis:

c.2. Genista, Broom. Diuret: Hepat: Splen: Feber: Hydrop: et pro Strumis.

c.s.2. Spinosa, Whins. Diuret: nephrit: Hepat: Febr:

c.2. Gentiana, Gentiane. Rad: Stomach: antifebril: Vermif:

c.2. Gentianella, Bastard Gentiane. Virtutes ut Gentiana.

Geranium Columbinum, Doves-foot. pro Hemorrhag: Ruptur: Vulner:

f.s.1. Robertianum, Herb Robert. Virtutes ut prior.

Moschatum, musked Cranesbill. Virtutes ut prior.

c.h.1. Glycyrrhiza, Liquorish. Pectoral: Diuret:

Gnaphalium, Cottonweed.

t. Gramen, Rad: fig: aperient: Diuret: Vermif:

c.s.2 Gratiola, Hedge Hyssop. Hydropic: Hydragog: Vomitiv:

Grossularia, Goosberry. D. Sutherland. contra gravid: picam; appetitum ed: dunt, profluvia ventris sistunt, Gonorr: et Fluo: albos mulierum curant; externè contra Inflam: et Erysipelatem:

Gramen caninum, Couch-grass, or Dogs-grass. D. Sutherland.

c.S.2. Hedera arb: Ivy. pro Ulceribus et combustis.
c.S.1. terrestris, Ground Ivy. Vulner: pector: Icter:
Helleborine, Bastard Hellebor. Virtute habet cum Elleboro albo.
f.1. Hepatica, Liverwort. Est Hepat: Diuret: refrig: anti-scorb: Icter:
Nobilis. Golden Liverwort.
c.S.3. Herba Doria, Dorias woundwort. Vulner: et menses sistens.
f. Herba Paris, Herb True-love. Vulner: pro Ulcer: et Tumoribus.
t. Herba paralysis, Cowslip. pro paralysi, Cephal: Arthrit.
f. Herniaria, Rupturewort. Vulner: Icter: Hepat: pro Gonorr: Dysent:
praecipue Rupturis. v. Cucurta.
f. Hieracium, Hawkweed. pro Inflammationibus. v. Authorl.
c. Hipposelinum, Horse-Parsley. Diuret: Vulner: Emenagog: Alex: ...
c.S.2. Hippoglossum, Horse-Tongue. Diuret: Vulner: Emenagog: v. Bislingua.
f.S.1. Hordeum, Barley.
c.S.3. Horminum, Clary. pro fluore albo, et Venereo. v. Authorl.
f.S.1. Hyacinthus, Jacynth. pro Dysenteria. v. Authorl.
Hyoscyamus albus et niger, Henbane. Narcot: Arthrit: Vuln: pro Haemopt: et mammis tumidis.
c.S.2. Hypericum, St John's wort. Vulner: Nephrit: Vermif: Arthrit.
c.S.3. Hyssopus, Hyssop. Pectoralis.

Helenium, v. Enula Campana.
Heliotropion tricoccon, the Colouring or dying Turnsole.
Helleborus, v. Elleborus.

c. s. 3. Jacea, Knapweed. Vulner: Sudorif: Uterina. v Sutherl.

c. s. 2. Jacobæa, Ragwort, or St James-wort. Vulner: Arthrit: Nephrit: Uterina.

c. s. 2. Jasmine, Jasmine.

Ilex, Holme tree, or Ever-green-oake.

Illecebra, Wall-pepper. Strumas discutit. (major et minor; yellow prick-madam.)

c. 3. Imperatoria, Masterwort or pellitory. Alexiph: Diuret: Hydrop: Antiscorb: Sudorif:

Iris. Flower de Luce. pector: Hepat: Splen: Emenagog.

c. s. 3. Florent: Florentine Orry. præcipue pectoral: v Sutherl. et Dale.

Isatis, woad. Vulner: insignis, mensis et hæmor: sistit. siccat et astringit.

c. s. 1. Juglans, Walnut-tree.

c. s. 3. Juniperus, Juniper. Fructus stomach: Carminat:

f. s. 3. Junc. Common Rush. pro Diarrhæa.

– Odorat. Schœnanthus, Camels-hay. usq præcip: in obstr: mens: hep: Lien: inflamm. Ventr: Vomitu, singultu, Ren, Vesica, uteri dolore.

Iberis, Sciatica-cresses.

Intybus, v Endivia.

Kali. Glasswort. Diuret: Hepat: Splen: Hydrag: Hydrop:

f.h. Lactuca, Lettuce. pro Inflammationibus, et nimio Venere.
f.h. Agnina, Lamb Lettuce. Virtutes ut prior.
f.s. Lagopus, Hares foot. pro Diarrhœa, fluore albo, Hæmopt: Rupturis.
— c.s.4 Lamium album, white dead nettle, or white Archangel.
Rubrum, Red dead nettle, or red Archangel.
c.s. Lampsana, Dock Cress. Diuret: et pro Ulcer:
t.s. Lapathum, Common Dock. pro Dysent: Scabie, Scorb: calido.
t.s. Acutum, Sharp Dock. Virtutes ut prior.
t.s. Rubrum, Bloodwort. ut prior.
Unctuosum, vel Bonus Henricus.
c.s. Laserpitium, Laserwort. Ejus Gummi dicitur Asa fœtida.
Lathyrus, Everlasting Pease. Virtutes ut alia pisa. v. sutherl.
c.s.3. Lavendula, Lavender. Ceph: Arthr: Uter: paralyt: Letharg:
Laureola, Laurel bush, or Spurge Laurel. Cholagog. Vomitiv. v. mezereon.
c.s.3. Laurus, Bay tree. Carminat: Stomach: Uter: Diuret:
Alexandrina, Laurel of Alexandria. Vulner: Diuret.
Laurustinus, Wild Bay.
Lens, Lentiles.
f.h. Lens palustris, Duck's meal. pro Inflam: Febribus.
c.s.4. Lepidium, or Dittander, Pepperwort. Arthrit: Emenagog.
c.s. Leucoium, Wall-Gillyflower. v. sutherl.
c.s.3. Levisticum, Lovage. Hepat: Diuret: Stomach: Pector: febr: potions.
Ligusticum, Lovage.
f.s. Ligustrum, Privet. pro Inflammationibus omnibus.
c.h. Lilium album, white Lilly. Emollit, maturat.
c.s.3. Convallium, Lilly of the Valey. Cephal: paralyt. v. sutherl:
Rubrum, Red Lilly.
Lingua Cervina, Harts Tongue. Hepat: Splen: Scorbut:
c.h. Linaria, Toad-flax. Hepat: Diuret: Icter: Hydrop:
Linum, Flax.
Lithospermum, Gromill, or Gromwell. id. cum Milio solis
Lolium, Darnel.
c.s. Lunaria, Moonwort. pro Dysent: fluore albo, Ruptur: Vulner:
Lupinus, Lupine.
c.s. Lupulus, Hop. Vermif: Uter: Icter: Scorbut: Emenagog.
c.s. Luteola, Dyer's weed, or weld.
c.s. Lysimachia, Loosestrife. pro Hæmorrhag: et Diarrhœa.
v. sutherl. v. add. ad finem

c.S.3. Majorana, Marjoram Cephal: Stom: Uter: Arthr: Alexiph: Pneum:
t.h.1. Malva, Mallow Pect: maturans, Anticol: dolores omnes sedans.
t.h.1. Arborea, Tree-Mallow. Virtutes ut prior. ℞ Suthrl.
f.h.1. Malus, apple-Tree.
Armenica, Apricock.
Persica, Peach.
Cydonia, Quince.
f.4.S.1. Mandragora, Mandrake. pro Inflam: et Tumoribus.
c.2.S.3. Marrubium, Horehound. Hepat. Splen: Pect: Uter: Alexiph: Vulner:
c.S.3. Nigrum, Black Horehound. Diuret: Feter: Vermif: Vulner:
Matricaria, Feverfew. Hepat: Uter: Menses movet, Venenum provocat, Hydrops, Foet: pur. Vapores, Calculis, & ... Arthritis.
Melo. Pompion, Melon
Melopepo, Musk melon.
c.h.1. Melilotus, Melilot. Anodyn: Matur: Diuret:
c.S.3. Melissa, Baum. Ceph: Card: Stom: Uter: Alexiph: Carmin: Sudorif: Arthr:
c.S.3. Mentha, Mint, or Costmary. Stom: vomitus sistens, Hep: Uter: Anticol: et pro fluore albo.
c.S.3. Mentha Cataria, Cat-Mint. Stom: Uter: Carminat:
Aquatica, water-mint. Virtutes ut prior. ℞ Suthrl.
c.h.1. Mercurialis mas et foem: Mercury. Hydragog: Cholagog.
Mespilus, Medlar-Tree.
c.3.S.2. Meum, Spignell.
c.S.4. Mezereon, Mezereon. Cholag: Hydrag:
f.1.S.3. Millefolium, Yarow. pro Haemorag: Diarrhaea, Gonorh: Inflam: et fluore albo.
c.S.2. Morsus Diaboli, Devil's bitt. Virtutes ut Scabiosa.
Morus, Mulberry-Tree.
Myrtillus, Blackberry bush.
c.S.3. Myrrhis, Myrrhe. Alexiph: Carmin: Vulner: Uter:

Marum, Herb-Mastick.
Milium, Millet.

c.s.4. Napellus, Monks-head. Herba venenosus.
c.s.2. Narcissus, Daffodill. v Sutherl.
c.s.3. Nasturtiu, Garden Cress. Uter: splen: scorb: Diuret: nephrit:
c.s.3 Indicu, Indian Cress. virtutes ut prior.
c.s.3. aquaticu, water Cresses. ut prior. v Sutherl.
c.s.4. Nicotiana, Tobacco. purg: vomit: vulner: Arthrit: Odontalg.
c.s.3. Nigella, Fennel flower.
f.s.1. Nummularia, Mony wort, or Herb two-pence. pro Hæmorag: Diarh: flu: albo, vulner:
f.h.3. Nymphæa, water-Lilly.

Ocymu, wild Basil. (Basilicu)
Olea, Olive-Tree.
c.1.s.3. Ophioglossu, Adder's Tongue.
c.s.3. Origanu, wild marjoram. stom: carmin: alexiph: pect: Uter: Card:
Ornithogalon, Bethleem star.
c.s.1. Ornithopodiu, Birds foot. vulner: nephrit:
c.1.s.2. Orobus, Bitter-vetch.
Oriza, Ryce.
f.1.s.3. Oxyacanthus, Hawthorn. astring: pro Hæmorag: Diarrhæa.
Oxyacantha, the Ever-green-Thorn.
Ophrys, v Bifoliu.
Orchis morio mas, the male fools-stones.
morio fam. the female fools-stones. v Sutherl.

Pæonia M. a. Male Peony. *Rad: radix*

Fæm. Femal Peony.

c.s.3. Panax, All-heal. Valner:

c.2.s.1. Panax Coloni, Clown's All-heall. Virtu: ut prior.

f.4. Papaver Horten: Garden poppy. Narc: pect: Anodyn: pro Inflam:

Erraticu, Wild poppy. Virt: ut prior.

Spumeu, Spatling poppy. ut prior.

f.h.1. Parietaria, Pellitory of the wall. Hep: Splen: Diuret:

c.s.3. Paronychia, whitlow-grass. pro Strumis.

Pastinaca, garden parsnep.

Pentaphyllu, Aqual: Water Cinquefoil. in feb: intermitt. seu Hæm. *Intestin. altern.*

Vulgare, common Cinquefoil

c.s.2. Percepier, Parsley Break-stone. Diuret: Nephrit. (Alchimilla annua)

c.s.2. Perfoliata, Thorow-wax. Valner:

c.s.1. Periclymenu, Honey-suckle. Diuret: Splen: Pect: Valner:

c.s.4. Persicaria Urens, Arsmart. Nephrit: Tumores solvens.

f.s.3. Maculata, Spotted Arsmart. Valner:

Pes Leporinu, id. eh Lagopo.

c.s.4. Petasites, Butter-Burr. Diuret: Alexiph: Uter: Sudorif:

c.s.2. Petroselinu, Parsley. Diuret: Nephrit: Hep: Splen:

Phaseolus, Kidney-Beans.

Phylirea, Mock-privet. pro Inflam: Gargarism:

Picea, Pitch-tree. Virtutes ut Abies.

c.s.1. Pimpinella Sanguisorba, Burnet. pro Hæmorrag: Catarrho, Phthisi.

c.s.3. Saxifraga, Burnet Saxifrage. Diuret: Nephrit:

Pinus, Pine-tree. Virt: ut abies.

c.h.3. Pinguicula, Butterwort. Diuret: Cathart:

Pisu, Peale.

c.s.3. Plantago Angustif: Ribwort — } pro Hæmorrag: Dysenteria,

Aqual: water Plantane. } Diabete, Ulceribus.

Latifo: common Plantane. }

c.1.s. Platanu, Plane-tree. pro Inflam: et Combustis.

c.s.2. Polygala, Milkwort. Cholagog.

c.s.2. Polygonatu, sigil: solom: Solomon's seal: pro Inflam: Contus: Hæmorroid:
f.s.2. Polygonu, Centinodia, Knotgrass: pro Hæmorag: Gonorr: Diarh: fl: albo
Hæmoptoe; ut et Punta pellens.
Polypodiu, Polypody.
f.h.1. Populus, Poplar-Tree. pro Inflam: et Combustis.
c.s.4. Porru, Leeks. Diuret: Nephritic: fætu pellens.
f.h.3. Portulaca, Purslane. pro Sitib: Urina ardore ad: Hæmorag: Refrigerat
siccat, astringit, Lumbricos expellit. Bilis fervorem mitigat, in febr: putridis et ma: lig: in Scorbuto.
f.h.2. Potamogeiton, Pondweed. pro Inflam: Dysent:
c.s.1. Primula Veris, Primrose. Ceph: Arthr: pect:
Prunus sylv: Sloe-Bush:
Hort: plumtree.
Psyllu, Fleawort.
c.s.3. Ptarmica, sneezewort.
c.s.3. Pulegiu, Pennyroyal. Ceph: pect: Uter: Carmin:
c.s.1. Pulmonaria, Lungwort. pro Hæmopt: Phthisi.
Pyrethru. Pellitory of Spain. ad Dentalg: radices.
f.s.2. Pyrola, Winter-Green. Vulner.
Pyrus, pear-Tree.

f.1.S.3. Quercus, Oak-tree. pro Hæmopt: Gonorrh: Diarh: Fl. albo: Hæ.......
Inflam: colli

c.S.4. Ranunculus, Crowfoot. Causticus. Ext[illegible].
c.S.3. Raphanus Hort: Radish.
c.S.3. Sylv: Horse-Radish. pro Scorb: et calculo.
c.S.3. Rapistrum, Charlock, or wild-mustard. Virtutes ut sinapi.
c.S.3. Rapa, Turnep. pect: Diuret:
Rhabarbarum Monachorum, Monks Rhabarb.
Verum, Rhubarb. est Cholagog et pro Diarrhœa.
t. Rhodia Radix, Rose-Root.
f.S.2. Rhus, Sumach, or Buck-horn-tree: pro Diarh: Gonorh: Hæmoroid: Hæmopt: Fl: albo.
Ribes, Currans.
c.S.4. Ros Solis, Sun-dew. Stom: Cord: Causticus, Menses mov:
Rosa alba, White-Rose.
Damascena, Damask-Rose. Laxat.
Rubra, Red-Rose. Astring:
c.S.3. Rosmarinus, Rosemary. Ceph: Card: Uter: Hepat: et pro Catarrhis.
Rubia tinctorum, Madder. Hepat: Splen: Uter: Icter: Diuret:
Rubeola, Wild Madder.
Rubus Idæus, Rasp-berry, or Hind-berry.
Vulg: Bramble. pro Inflam: Diarh: Gonorh: Fl: albo. Astring.
c.S.[illegible] Ruscus, Butcher's-Broom. Icter: Hepat: Diuret: attenuat, mundificat, aperit.
usus præcipuus in obstr: Hepat: urinæ, menstr: &c
c.S.3. Ruta, Rue. Carmin: Alexiph: Diuret: pect: Hyster:

c. s. 3. Savina, Savine. Diuret: Uter: Vermif: Uter

f. s. 2. Salix, Willow. pro Hæmopt: Diarh:

c. s. 2. Salvia, Sage. Ceph: Stom: Card: pect: Alexiph: Carmin: Uter: Diuret:

c. s. 2. Sylv: Wild-sage. Diuret: Sudorif: vulner:

t. s. 2. Sambucus, Elder. cortex interior, fol. et gemmæ, fl: Bacca Diuret: Hydrop: Hep: Splen: et pro Hæmorrhog.

c. s. 2. Sanicula, Sanicle. vulner: ast: pro Hæmopt: Diarh: Ruptur: Gonorh: ulceribus Phthisi.

c. s. 2. Saponaria, Soapwort. Sudorif:

c. s. 3. Satureia, Savory. Stom: Splen: uter: pect: Carmin: Alexiph: Sudorif:

c. h. 1. Satyrion, Dog Stones. Vener:

c. s. 3. Saxifraga alba, Saxifrage. Diuret: Carmin:

c. s. 3. Scandix, Shepherds Needle. Diuret: Hep: Splen: (Venus-comb.)

c. s. 2. Scabiosa, Scabious. pect: Stom: Nephrit: Alexiph: Vulner:

c. s. 4. Schœnopraz, Cives. Virtutes ut Porri.

Scilla, Squill, or Sea-onyon.

c. s. 2. Scordium, water Germander. Sudorif: Alexiph: Uter: Diuret: Vulner:

c. h. 1. Scorzonera, Vipers-grass. Card: Alexiph: Uter:

c. s. 1. Secale, Rye. Suppurat.

c. 1. s. 3. Senna, Senny. purgat.

f. 3. Sedum majus, Sempervivum, Houseleek, or Sen-green. pro Inflam: et Combustis, et compositis eadem in Sed. mi- Item Se minus, Stone-crop, or wall-pepper. eadem habet virtutes, sed fortiores.

f. h. 1. Senecio, Groundsell. pro Inflam: Contus: et Combustis.

c. s. 3. Serpyllum, wild-thyme, or mother of thyme. Ceph: Stom: Splen: Carmin: Uter

Siceri. Siseri

t. s. 1. Sideritis, Iron-wort. pro Diarh: Ruptur: Inflam: Vulner:

Sinapi, Mustard.

Sisarum, Siser, Skirrets.

c. 2. h. 1. Sium, water-parsnep. Diuret: Nephrit: Venerem promovens.

f. 4. Solanum, Nightshade. Hypnot: Venenos: maniam producens.

c. s. 3. Soldanella, Sea Bindweed. Hydrop: Hydrag: Hep: Splen:

f. h. 2. Sonchus, Sow-thistle. pro Inflam: Stranguriæ, Urinæ ardore

t. s. 3. Sophia Chirurgorum, Flixweed. Vulner: pro Hæmorag: Diarh:

c. s. 1. Sorbus, Service-tree, or Roddan-tree. pro Diarrhœa.

f.s.1. Sparganium. Burrweed (Reed grass), pro morsu canis rabidi.
c.s.3. Spatula fœtida, Stinking Gladdon, or Gladwyn. Xyris.
c.s.1. Sphondylium, Cow parsnep. Ceph: Icter: Uter:
f.h.1. Spinachia, Spinnage. pro Calore, Inflam: Laxat.
Spina Cervina, Buckthorne.
c.s.2. Stœchas, French Lavender, or Stikadove.

T

c.s.2. Tamariscus, Tamarisk-Tree. Splenet:

c.2.s.3. Tanacetum, Tansie. Vermif: Uter: Diuret: Icter:

t.s.1. Tapsus Barbatus, Male-Mullein. pro Hæmopt: Hæmorrhoid-(Verbascum)

f.s.2. Taraxacum, Dandelion. Diuret: Hep: Splen: Antiscorb:

Taxus, Yew-Tree.

~~c.s.2.~~ Telephium, Orpine

c.s.2. Thalictrum, Meadow-Rue. pro Peste, Variolis, Morbillis, Feb: malig:

c.s.4. Thlaspi, Treacle-mustard. Virtutes ut Sinapi, sed potentiores.

c.s.3. Thymum, Thyme. Ceph: Pect: Stom: Hyst: Diuret: Arthrit:

t.s.1. Tilia, the Lime, Lin, or Linden-Tree.

c.s.1. Thuya, Tree of Life.

Tormentilla, Tormentil. Rad: pro Diarrh: Dysent: (opt.) Hæmorrhag: et omnibus humorum profluviis, ut fluore albo, fluxu menstr: &c.

f.s.2. Trachelium, Throatwort. pro Inflam: Catarrhes.

Tragacantha, Goat-Thorn.

t. Tragopogon, Goats-Beard. Vulner:

f.s.1. Tragopyrum, Buck-wheat.

Tribulus, Frogs-Lettuce, or Water-Caltrops.

Trichomanes, Polytrichum, Red Maiden-Hair. Pect: Hep: Splen:

f.s.1. Trifolium, Claver, or Trefoil. pro Inflam:

Trifolium paludos., Water-Trefoil. Antiscorb.

Triticum, Wheat.

Tulipa, Tulip.

f.h.1. Tussilago, Colts-foot. Pector: Asthmat:

c.s.2. Valeriana Hort. Garden Valerian, or Setwall.
c.s.2. Sylv: Wild Valerian. pro Convuls: Epilep: (Opl:)
t.s.1. Verbascu, Hygmaid Mullen. pro Inflam: Hæmor: Hæmop: Dysent. Ruptur:
Verbasculu, Cowslips, primrose.
t.s.2. Verbena, Vervain. Valner; Ceph: Hyster: Hep: Splen: Diuret:
f.s.2. Veronica, Speedwell, or Fluellen. pro Dysent: Diarrhæa.
t.s.1. Vicia, Common Vetch, or Tare.
c.s.3. Vincetoxicu, Swallow-wort. Alexiph: Sudorif: Carmin:
t.h.1. Viola martia, March-Violets pro Inflam: Anodyn:
t.s.h.2. Tricolor, Hearts-Ease or Pansies.
c.s.3. Matronalis, Queens-Gillyflower.
Violaria, vide Viola Lunaria, Honesty, or white Satin flower.
c.s.2. Virga aurea, Golden-Rod. (Dorias his wound-wort, Saracens Con: sound, Golden-Head-Flax) Valner: Diuret: Nephrit:
Vitex, vide Agnus Castus.
Vitis, The Vine.
Ulmaria, Meadow Sweet, or Queen of the meadow (Barba capræ, Regi: na prati:
Ulmus, Elm-tree. pro Inflam: cutis: in Decoct: et Cataplas: ad et Rubig.
Umbilicus Veneris, Navel-wort.
c.s.2. Urtica, nettle. pect: Diuret:
Urtica Romana, Roman nettle.
, Aculeata, Bastard-Hemp.

Xyris, vide Spatula fœtida.

Addenda

Larix, Larch-Tree.

Lathyris, vide Catapulia.

Laurus Alexandrina, vide Hypoglossum.

Lichen, vide Hepatica vulg:

Limonium, vide Behen rubrum, Sea Lavender.

Lotus Odora, Sweet-Trefoil. vide Sutherl. Anod: Diur: Vulner: Alexiph:

Lychnis, vide Sutherl.

Nott: Radices Herbæ Paridis putantur esse Rad: Hypopex: à D. Pitcairn.
Radices Vincetoxici ab eodem putantur esse Rad: Serpent: Virgin:

Enthema ex [illegible] ... [illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible] ... fallit
B. V. 405

Os è corde Cervi, Cordi convenit, illudque à malignitate tuetur, custodit partum, et prægnantibus mire conducit.

1.

obs. : maj. et 2das.

Praxis Medica D. de Glencar.

Lib. 1.

De Morbis Capitis.

Cap. 1mum.

De Dolore Capitis ex causâ Calidâ.

Duo sunt praecipua medicinae cardines, Ratio et observatio. Observa[tio] amen[?] fil[?] qd circa[?] ce[?] kent medicorum ra[tio]nia. Baglivi: p. 7.

Quaer: 1. An calidorum usus praecesserit. 2do. An dolor sit pungens. 3tio. An universalis vel particularis. 4to. an fixus vel remittens. 5to. An Idiopathicus vel Sympathicus. 6to. an adsit febris. 7o. An Urina rubicunda. 8o. An aliquantulum deliral.

Causa est obstructio et vellicatio salis, sine quibus nullus est dolor; nam cur totum caput non dolet, nisi quod in toto non sit obstructio sang: et mat. vellicantis.

Prog: In maniam, phrenitid: vel apoplex: sanguineam degenerare potest.

Cura sit 1. V.S: in brachio, vel potius in fronte, vel vena jugulari. 2o. purg: Laxante (quia hic sang: in subtilitate peccat) ex Elect: Lenit: chryst: ♀ri, sero lactis et Syr: cichorij. 3o. Lotione pedum, ut sal obtundatur, vel aq: calida ℔ lb, vel additis plantag: Lactuc: papav: acetos: &c. 4o. Oxyrrhodino ex aceto ros: campf: aq: Solani, et ovis, vel ex Sempervivo. 5o. Anodyno ex aq: pap: sach: Satur: camphor: Laud: et Syr: Diacod: 6o. Vesicat: vel cucurbitulis. vid Bagl. de vesicant.

7o. clyst. [illegible] ex nosolo [?] quadingnio in sale, vel ex sero lactis. 8o Lotione temporum [?] Hung.

Obs: 1o. Si dolor sit sympathicus, cura dependet a curatione morbi et curatione. Sic Vomitorium prodest cum stomachus, Hysterica cum Utero: Antiscorb: cum Scorbutus, sudorifica &c cum Lues Venerea, &c culpanda veniunt.

Obs. 2o. Si dolor sit periodicus, curam maximopere coincidere cum ea febris intermittentis, viz. Vomit: Dec: amaro. cum et sine sonna et denique cort: peruv:

Medicam: Maab[?] morum qualitas: et singulorum morborum causis[?] ... indicationes curati: vas deduxerunt. Recentiores vero utraque ab aquo et aceti hauseunt; sed utrique perperam. Bagl. 233. et seq: vel Excerpta ex eo

Cura. vid D. Willis: lib. ex alaro. vel mayern. p. 55. 56. Linteum imbutum aq: frigidâ toti capiti applicitum et renovatum. Deinde caput sic sh. vel lavatur caput quotidie frigida aqua. vel fiat suffitus [?] ex ... ex eod: ... in pruinas injecta, et tormenta ... digitis injecta ... et fumum continendum. Mayern.

Cap. 2dum.

De Dolore Capitis à Causâ frigidâ.

Causa est obstr: ab humore pituitoso et acri, unde dolor plerumque est gravativus.

Sp: Lavend: Sp: Lil: convall. aq: Reg. Hung: et sim. pro sternutatorio. ad cons nares Lotionem ... pot.

Quaer: 1o. An sit foemina (in quibus obstructiones saepius fiunt, quia fermentationes in iis sunt debiliores) 2o. An usus crassorum et frigidorum praecesserit. 3o. An facies pallore sit perfusa. 4o. An pulsus sit

sit parvus languidus. ob sang: viscositatem. 5º. An urina pallida et tenuis ob defectus salis in sang: et obstruct: renum.

Progn: In Paralysin, Apoplex: Catarrh: Epilepsi: degenerare potest.

Cura 1º. V: S: in pede ob sang: crassitiem. 2º. purg: ex pil: Cochiis, troch: Alhand: Diagred: et resina Jalap: praemisso Apozemate attenuante, vel cerevisia medicata (si valde crudi sunt humores, quia tales non facile purgantur) ex rad: Paeonie: Angel: Ireos aa ℥j. Herb: Rorismar: Majoran: Betton: fl: Stach: aa Mj. fol. Sen: ℥j (cui absque solummodo liber servetur) Sem: fanic: d: ℥j. 3º. Epithemat: ex sale decrepitato, vel ex Verbena, Ruta, Rorism: Majoran: Lavend: sacculo inclusis, vel ex Sp: urinae vel ✱ci, vel salin: aromat: cum stupa albumine ovi inuncta, praecipue si sit Cephalea, vel Hemicrania, vel Clavus. 4º. Sudorif: ex aq: Card: B. Cinamomi, Antim: diaph: Sp: ✱ci, Syr: Stach: vel ex potius ex lignis. praemisso tamen apozemate attenuante, ut in praecedenti Apoplexia. 5º. Vesicat: Cucurbit: Betone, et Succisa, ex rad: Ireos, calam: arom: Angel: Cariophyl: Bacc: Lauri, N: M: Rorism: Majoran: fl: Lavend: Betton: Tilia, cum guttis aliquot ol: Rorismar: vel Majoran: 6º. Masticatoriis ex pyrethro, zz, pip: longo, Staphisag: mastiche, et sim. 7º. Sternutatoriis et Errhinis ex folon: major: Lavend: fl: fol: convall: lat: bac: Hederae: aloe: Euphorb: Benzoin, etc. 8º. pulv: cephal: capiti inspersis. 9º. fumigatione ex vel majoran.

Cap. ℥iij.

De Comate, Caro, et Apoplexia, ou Morbo attonito.

Coma et Carus sunt morbi in quibus aeger difficulter excitatur a somno, ad interrogata aliquantulum respondet, sed mox iterum profunde dormit. Apoplexia vero est somnus altissimus cum omnimoda sensus et motus privatione, repentina lapsu respiratione et pulsu aliquantulum manente, semper cum stertore, aliquando cum febre raro cum spuma in ore.

Causa est omne illud quod sp: animalium fluxum impedire potest, quales sunt sanguis effusus, tumores, abscessus rupti, nullis praeviis indiciis sese manifestantes, quae cum praecautioni tempus non dent, maxima ex parte sunt incurabiles. Sola ergo obstruct: vel compressio Nervorum, vel a materia pituitosa (Apoplex: pituitosam) vel sang: ab itinerantibus extravasata nervorum originem includens) nimia Arteriarum distensio nervos vicinos comprimens (Apoplexiam sanguineam producens, curam admittere potest.

Quaer: 1º. An aeger crapula crassitiem generante, vel debile — 2º. An subito in plethoricis vasa distendentes sese induxerat. 2º. An subito in terram

ex fol. crispo: Hyp: orii, Betton: Major: aa Mj. pulv. cephal: sumatur bis quotidie. Sol: sufficiens manent et esse Nervi ... ...

Cura.

vel V. S. ... ex Alaro.

N.B. Hemicraniae ... ventriculi: ... ... Majerne. 63.

pulv. sternut: ex ... gr. j. et sacch. cand. gr. x. M divid. in x dos. Boer:

vel et b.: coma est vigil vel somnolentia.

... stertor ...

terram cadat? 3º. An sternat; et an pulsus et respiratio superstites sunt, vel quia nervi illi cordis in toto corpore magis sunt patuli, vel quia musculi in quos nervi tendunt, antagonistis carent. vel obt: 2os ão cap. 6.

Cura Apopl: pituitosæ fit 1º. Supposit: acri ex specie Hieræ, Colocynth: scammon: cum melle. 2º. Clyst: ex Elect: pro clyst: ℥i. sp: Hieræ ʒij. vin: Emet: ℥i. cum Dec: herb: cephalicarum in vino vel urina. 3º. Agarico. Colocynthid: et Hellebor: in fauces intrusis. 4º. Vesicat: et cum scarific: cucurbit: suctu et spongiarum et carnes. 5º. punctionibus sub unguibus, pilorum vulsionibus, clamoribus, vinculis dolorificis, frictionibus capitis. 6º. naribus Hem suffimigijs ex Castor: Galban: assa fœt: crinibus combustis, &c. 6º. vomit: ex vini Emet: ℥ij. R et Jalap: ℥ß. vel ex ☿ vitæ gr: 8. 7º. Calefactione capitis laminâ ferreâ ardente. 8º. Cauterisatione actuali verticis vel occipitis. 9º. Mixt: ex aq: Bolon: fl: paralys: Spirit: antiepil: antiparalyt: cinamomi, et Lavendulæ ex vini facta, Spiritu croci, castor: ✡ succ: C.C: Ether: Vin: et Syr: Stœch: 10º. Puro tarti: ex Sal: gr: 4. vel 5. in spiritu castor: dissolut: vel ex pulv: cinnam: Ceph: 11º. Sinapismis plantis pedum applicatis.

Extra paroxys: utatur Dec: lignorum, et cerevisia medicata ex cephalicis, ut cap. 2do.

In Apopl: sanguineâ ē contra sang: refrænando est 1º. V.S. arteriotomia: capitis targâ. 2º. Defensivo capiti applicato. 3º. Lap: prun: sach: Satur: Sal: Campho: bolo armeno, lap: hybern: terrâ sigil: sang: drac: &c. 4º. aperiantur dentes et indantur ori quædam grana majora salis, terantur vena, et applicentur cucurbitulæ.

V.S. et alcalia et volat: moderata in vehiculo liq: vel Bibl: 9, 10. non verò ea quæ in praxi præscribunt.

Sternutam: omnes ex Hellebor: Euphorb: et flor: bis cephalicis. Alio simplic: temporibus, vola: manus et plantis pedum illitis. Ham. 158

Bael: Cit. 271.

pulv: V. sci vel 3l.

R. bol: 377

Cap. 47.

De Lethargo.

Est somnus Comati similis, sed cum febre et delirio.

Quæris. An sonus levis, vel gravitas capitis cum corporis plus solito calore præcesserit? 2º. An respiratio non sit multum læsa, nec stertorosa, ut in Apoplex:? 3º. An pulsus sit inæqualis: 4º. An matula obliviscitur?

Causa. Cum ebrietatis depositiones non solum viscosæ ob partis subtilis evacuationem? sed etiam acres ob particularum salinarum et fixarum remanentiam maxima ex parte deveniant, ideirò non mirandum erit, à viscositate, nervorum obstructionem cum Sp: nervorum tubu:

tubulos ingredi nequeant) et ab acredine motu sang: posse procedere. Hujus in quamplurimis exempla habemus. qui quo magis bibunt, eo magis sunt calidi et febricitant, et tamen sunt somnolenti. Ex hoc fundamento facile erit explicare, quomodo materia aliqua purulenta, vel materia aliqua stagnatione, acredinem vel putredinem induens, et partium laesionem patiens, Lethargum generare possit. Sic Experientia testatur, Apoplex: à sang: in cerebro effuso saepissime in Lethargum ob laesionem partium ejusdem degenerare.

Cura 1º. V. S: ratione febris. 2º. suppositorium: aut Clyst: acri, aliisque externis et internis, ut in apoplexiâ. 3º. purg: ex pulv. cornachini opt.

Cap. 5tum.
De Paralysi.

Est sensus, aut motus, aut utriusque ablatio, seu in toto, seu in parte, per causam infra cerebellum subsistentem in omnibus vel aliquibus partibus, nervos à medullâ oblongata accipientibus, propter eorundem nervorum vel obstructionem internam, vel compressionem externam. [illegible interlinear note]

Quaer: 1º An diaeta frig: sanguinem incrassans praecesserit? 2º. An frigus post calorem vel sudorem? 3º An aetas sang: incrassationi contribuens? 4º. An pars sit frigida, marcida, flaccida, mollis, longior, decolor, pallida, insensilis, impotens ad motum, ob sp: et rarefactionis [illegible] sang: defectum in parte? 5º. An remaneat sensus absente motus ut fit ex musculo tumore schyrroso et affecto, unde movere nequit, quamvis sp: per nervos in eos influant, quod etiam fieri potest ab omni insigni humiditate fibras in longitudinem protrahente, ut et etiam à frigore rarescentiam humorum impediente, et sim: 6º. An remaneat motus absente sensu, ex nervorum flaciditas nequit tremores vividos ad cerebrum deferre, quamvis sp: in musculos usque satis sit liberos et ob eorundem sp: incrassationem, ut ubi sint quidem per nervos in musculos fluere, ibique aliquantulum rarescere, sed tamen per se soli intra nervos variis motibus satisfacere nequeunt.

Vide excerp: Bartl. 247.

Fit à tumore nervorum obstruente, et [illegible] Sydenham de [illegible] n.º 1. Hydrops nervorum [illegible]

[illegible margin note]

Cura

Cura. Nervulis impacta mea discutienda, 1° Clyst: ut Cap. 30. 2° Vomit: sed in leviori dosi qm in apopl: 3° purg: repetita ex Jalap: et Turpetho, pilulis etiam ex Ext: Agaric: resin: Jalap: Troch: Alhand: cum ol: Carvi. 4° V: S: in magna cacochymia aut plethora, immediate post ea sang: spiritus: sis agitando. 5° Inunctionibus ex Ung: nerv: de Arthan: Ther: Ven: ol: Lumbric: Succ: Major: Lavend: Junip: sp: C.C. 6° Spolu ex rad: Imperat: pyrethri, in aq: Regina Hung: p ♀ infusis. 7° Mixt: ut in apopl: 8° Sudorif: ex Theriac: ⊕ C.C. et Succ: 9° Apozem: ⊕ ut in apopl: 10° piperis et sem: Sinapeos cum aq: Vitae, et interne et externe, ut sudet aeger.

Nott. si paralysis sit à siccitate ob defectu Lymphae, curam d.re bandis humectantibus, oleosis, adipe anseris, catellorum, hominis, cum levibus aromaticis. Paralysis haec est cum tremore, et plerumq; in senectute. Thom. myst: p. 56. glene. sp: Lavend: comp. gtt XX. aliquoties in die cum potu ordinario in quorumvis membrorum tremoribus. Hamil. 211.

℞ sp: vini rectif. ℥ij. ol: Lauri ℥iij. Balf: peruv: ʒj. ol: Lini ... inungatur ... cum, et circumvol: vatur panno lineo. in ... apoth: ... Sylvat: p. 115.

Rysn: in Paralyticis expedit. ol: Ran. Antiepil: (p. 6. in marg.) exhibere purgantibus urbam declinante morbo. Expedit etiam, deinceps, post membra affecta ad ignem liberaliter et strenue perfricta, aquis frigidis immergere. Pitc. 181.

Cap. 6um.

De Catalepsi.

Causa sunt humores crassi ex plexu choroideo expulsi, qui circa gland: pinealem situat, eamq; reddunt immobilem: unde omnis motus et sensus aufertur, excepta respiratione et pulsu, cum nervi quidem angustissimi nervorum in hoc morbo sunt obstructi; unde patet, morbum hunc posse contingere in corpore aliàs sano, et temperato sanguine.

Hac causâ facile explicari possunt omnia phaenomena hujus morbi, ut 1° Rigiditas et immobilitas totius corporis, quae sp: influxum satis arguunt. Errant igitur qui in Catalepsi sp: volunt esse torpidos, coagulatos, et ad motum ineptos. 2° Firma remanentia membrorum ut Brachii, in positione illâ in qm ab adstante ponitur, sine sp: usq; satis copiosis, in corpore vivo fieri nequit; argumentum satis evidens, nullum esse in sp: vitium, nihilaq; hic deficere praeter eorundem determinationem. Si visus et auditus aliqdo aliquantulum remanent, fit qd Gland: non sit totaliter obsessa; sed durante paroxysmo, hujus rei nullum adstantibus indicium praebere possunt.

Nott:

Pitcairn.

Nott. Catalepsin ab Auth: aliquo Epilepsiæ speciem solam nunc fortiori, nunc debiliori conjunctam nuncupari. Sic rigiditatem vult esse effectus æqualis, sed solito copiosioris, sp: in musculos antagonistas influxus, ut sic anima in æquilibrio detineat.

Cura.

Cura fit Clyst: aliisque prædictis, et adhuc in Epilepsia dicendis in apopl.

Cap. 7mz.

De Epilepsia et Convulsione: morbo Caduco, Lunatico, morbo sacro, Comitiali, Herculeo. Pratt. l. c 21.

✠ Ob.: Epil. qd? ✠ Bartol. 109. 150. In infantum convulsionibus Empl. pro satura Coron: ✠ 24 mea p. 17, 43.

Epilepsia fortis, est repentina sensuum omnium abolitio, cum stertore alto et inordinato, atque cum vehementi totius corp: succussione.

Epilepsia verò mitis, est involuntaria concussio ab objecto quovis nervosas partes irritante, et mentem plus minusve feriente.

Pitc. Causa. In Epilepsia et Paralysi, post vomitus et potus et Vellicantia exhibeantur Anti-Epileptica. ✠ Rad. valer: silv. et Dictam. alb. ā ʒvi. Castor: Stoech. arab. ā ʒß. visc. quercin. ʒvi. Cinam. ʒß. summ. rorism. ʒß. fol. senn: ʒij. Jalap: Turpeth. ʒß. infund. omnia p X dies frigide in vin. alb. Gall. ℔ viij; colat. add. pulv. Cyan. hum. ung. hum. ā ʒij. Rec. Cuni in morbis infantiuo et succ. ... ʒv. sp. Cast. ʒij. Dos. ... ʒj adulto unc. iv.

Causa est nimia sang: ebullitio exorta ex fermento, è latibulo alicujus partis solidæ, elapso, unde sp: et multi et impetuosi ex arter: cerebri, necnon humores etiam viscidiusculi erumpunt (quos probat oris spuma et stertor, quia ob illos vix est locus in asp: art: aeris motui reciproco) qui qd ventriculos cerebri et vasa obturent, abolita memoria, et interea sp: illi nervos illostas cum impetu invadunt, musculosque annexos convellunt. Ubi sæpissimè fit ab humoribus intra substantiam cereb. aut cerebelli congestis aut quomodocunque corruptis, deinque digestione nãam, fermenti nimis potentis (qd pro temporis incerta intervalla ebullitionem concipit et ex causibus excit. inducentibus. Sæpissimè etiam sola vellicatio, à causa ✠ interna ✠ externa, hunc morbum producit, uti evidens est de Auris Epilepticis dictis, quas nunc abundè nunc ab alia corporis parte, à patiente versus caput, sub forma venti, percipiunt ascendere.

In casu [illegible] ferunt? 2°. An cadentes clamant? 3°. An stridentes dentes? 4°. An pollices convulsos manibus tenent? 5°. An alvi excrementa urinam, et semen excernunt? 6°. An stertor adest? 7°. An Aura Epileptica sensus ad caput ascendere? 8°. An vomitus maxime præcedat? 9°. An Respiratio sit suffocativa? 10°. An spuma circa os? 11°. An finito paroxysmo, rerum in eo actarum ignorant? 12°. An Temp: ...

[illegible] Bartholini cortic. ... [illegible]

[illegible] ... ā ʒj. [illegible]

[illegible] ... Dos. ʒj. ex ... [illegible]

7

Temperamentis acri praeditis? 13º. An mentes inordinatè qui supprimunt? fluunt? 14º. An est Idiopathica, absque ulla aegri providentia invadens, vel Sympathica?

Convulsio est Epilep: partis, cum contractione involuntaria unius vel pluris musculorum, in qua cerebrum nihil aut parum afficitur, adeoque nec cessant sensus, nec plurima alia Epilepsiae symptomata recensita adsunt.

Causa. Secundum Veteres, inanitiones Repletiones et Inanitiones Convulsionum omnium censentur esse causae: sic quaecunque corpus, corporisve partes nimium replent, ut Voracitas, Ebrietas, Passio Iliaca, Ulcera, Vulnera, Inflammationes, omniaque partes sensiles vellicantia, in causa sunt quod sang: vel Liquoris Nervei major copia in unum quam in oppositum musculum praeter voluntatem animae fluere possit, ut sic fiat Inflatio et Contractio istius musc: solito major et involuntaria, vel Convulsio. E contra, quaecunque corpus inaniunt, aut liquores corpori alendo necessarios evacuant, ut fluxus sang: copiosus, Purg: nimiae Vigiliae, &c. in causa esse possunt, quod sang: aut Sp: copia solito minor, in unum quam in alium musc: derivetur unde iterum fiet contractio, seu Convulsio.

Cura in Paroxysmo. Eadem sunt remedia quae Apoplecticis ad sensus revocandis tradidimus. Extra Paroxysmum nec Vomitio, nec Purg: nec V.S. in Convulsione ab Inanitione usurpanda: adeo ut huic speciei remedia specifica dicta solummodo sunt propria in ipso exordio: Cum è contra in Convulsione à Repletione, ultima solummodo locum postulent.

In utraque igitur (praedictis observatis) dari possunt Pulv. de Guttetâ, Cinnabaris, Castor. cranii hum: rad: Valerian: sylvestr. ung: Alcis, sal vol: C.C. Succ: vel &c, vel in mixturis, ut in Apoplexia. 2º. Pulv: stercor: Pavonis, Graculorum (vel Gras) Lumbric: 3º. Cinnab: Antim: ℈ij. sal succin: gr. 30. pro 1 X dos: 4º. Decoc: Cantharidum in occipite. Cort. Rutae Sylvestris. Trall. l.1.c.15. &c

[margin:] Seitz, et multa cum aq. [illegible] et [illegible] conve[illegible] cum aq. anti[illegible] vel cum aq. hirudi[illegible] Vatai ex [illegible] sine Spir.

Convul.

Junioribus, i.e. non nimis pro[illegible] [illegible] ex[illegible] hibe et infun[illegible] cum Lumbr. terrest. Pitiil.

Causa

Quisquis Infantes ex rad: paeon. mar. et Hyosc. roszat. [illegible] est commu[illegible] stantes causant Epilep: cum [illegible] porealinutis, et circulationem cum sang: subeunt.

[illegible]

Epist. 121. bis [illegible]

Cura
vel Revers. [illegible]

[illegible] Rei [illegible] Comi[illegible] de Abourn et D. de Whitehill.

pulv. [illegible] [illegible] ex [illegible] [illegible] aquam [illegible] Dimidies [illegible] arsentei [illegible] aq: ceraso[illegible] [illegible] Bl.

[marginal note: ...ralz etiam Perlor- ... in futura ... ali, p Paulum ... Occipitium ... Aseg... Ung. alei ... compaon: dif. ... Ras. cran. hum. ... coq. ... Syr: paon: comp. ... ... x. frigid... Hamil. 148. experts in adultis et infantibus ... voldmega ... plantâ ... succ. ... miniantur.]

Ex rad. Valer: Sevill: paon: et Lignis, si vis, sudorif: et in mensibus obstructis, Hystericis. 9o. Elect: ex Coral: Poterii: ʒj. con. Anthos, Bolon: Salv: cinnab: anim: aliisque praedictis speci- ficis, sed specialim secundum primi status. 6o. Ung: ut in Apoplexia 7o. semicupiis. 8o. sudorificis. 9o. salivatio per ☿ ivj. 10. Dec: seminis 24 Herb: paralys: aut primula veris, fol. et flor: Miiij. incidantur et infundantur per 24 horas in cerev: ... potet patiens ... pro potu ordinario, et ut vero vel per 14 dies vel longius. ... Whitehill. ☿ 24 ipsius opt.

Causa

De Vertigine.

Est affectus in quo res non motae moveri videntur, non la- men semper in circulo, sed saepe etiam ad latera, et motu subito collapsus, et visu tenebricoso.

Causa continens est per aliqualis principiorum nervorum ob- structio, per sp: nimia crassities, unde non facile possunt intrare tubulos ventriculorum cerebri, ideoque reflectantur, et in gyro vertun- tur. Si sit a terrore, fit quod homo lapsus tanquam praesentem concipiat.

Causae Antecedentes sunt Foeditas, Ira. cibi flatulenti, voraci- tas, evacuationis solitarum privatio, circumrotatio sui, gravitas capitis, dieta viscosa, et aliae variae vapores per corpus vagantes et versus cerebrum per vasa et alias vias ascendentes.

Per recentiorum tota causa Vertig: quaerenda est in nervo opti- co. aut oculo, aut alio quopiam intra oculum condito, sive canali sive liquore, adeo ut quamvis per unum per alterum suum loco moveri possint, ut imagines ab objecto vero venientes in diversas fundi partes incidant, sive non eandem fundi ocularis par- tem retinae partes incidant, sive non eandem fundi ocularis ... tem attingant, in causa esse possunt, quod objecta vera quiescentia circumacta habeantur. Sic causae antece- dentes, oculis motis spectatum, vero circumacta habeatur. Sic causae ante- dentes recentiores, ut et prolapsio in Uter: nervo optico vicinis, ... fieri possunt ut retina et nervo optico suo loco dimoveatur ut radios ab objectis in eandem fundi ocularis partem non accipiat, sed in aliam atque aliam; unde fit, ut dum imagines loca mutant in retina, objecta tanquam loca mutantia perpetuo menti nostrae offerantur. Sic ordinarie ex despectu ex alto fit Vertigo, eo quod timor lapsus ... in nervis, non solummodo oculi

ocul; sed et etiam in varijs alijs partibus corporis excitat, ut incert: et miro requiri fiat mutuum motus. et dein titubatio, et tunc iter motus. unde rursus major titubatio, et tandem collapsus.

Cura. sive sit sympathica, sive idiopathica, sive vasa sang: sint distenta (nisi inedia antea morbo dederit) sit 1o. V. S. 2o. Vomitoris. potissime ex vrabrie: affect: est. 3o. Cornu ? purg: nisi admodum pareat, pulv: stom: ordinario. 4o. pulv: rad: Doronici, et Con: cerv: āā ℥i ß aliquot dies. 5o. Tabellis ex aromat: ex oleo Cinam: rad. Doron: 6o. Elect: ex praedictis, et pulv: stere: pavonis vel felis domestici, ex syr: fl: paeon: et ZZ. 7o. Apoz: ex lignis sudorif: ex cephalicis. 8o. Camphora aliisque topicis in Apopl: et Epilep: 9o. Jove et Marte, vel in substantia, vel infuso, vel in forma syrupi, qualem dat Willis ex vitrioli Martis ℥ij. aq: cras: nig: ℥iv. sacch: lib ß, cujus dedit cochleatim mane et post meridiem horis medicis. 10o. purg: ex pulv: Cornachini, Bagl. Pit. 4. p. 71.

Cura

vel specifica, ut et pulv: rad: zedoar:

Cap. 9um.
De Phrenitide, Hydrophobia, Mania, et Melancholia.

Mania est delirium interpolatum, quod dilucida habeat intervalla, sine febre, ex furore, audacia, et iracundia.

Mania quid sit.

Causa, Dr Cartesij, est nimis potens ferment: in sang: crasso et terrestri excitatum, ex parte aliqua solida, ob passionem augm. vigilias nimias, evacuationes solitas suppressas, et sim. Aliis de causis corpus vehementer movet, et humores qui ob crassitiem extra motum sp: non fuissent, jam tumultuario impulsu (vigilias! et inaequali pressione gl: pinealis, delirium producunt; et quia haec omnia ex violentia sunt, fit furor ex audacia; sed quia mixtura sang: hic non turbatur, abest febris: unde potius est morbus spiritus quam mentis; inaequalitas enim haec sp: glandulae tollit aequilibrium, unde nervorum humores fiunt confusi, et inordinati, et incerta in ipsdem sp: fiunt repercussiones et fluctuationes. Sunt qui vero sit hanc sp: inaequalitatem a moleculis sang: in vasis minus cohaerentibus, et uniformem sang: rarescentiam impedientibus proced:

Causa.

Pitcairn.

procedere: sed conceptu difficile est quomodo molleculis ta:les poterint à passione aliqua, vel aliis praedictis, excitari; adde quod existimamus, fermento ex parte aliqua exbruto, debere potius ascribi.

Drelincurtius.

Sunt qui phaenomenon absentis febris explicatu tam difficile existimant, ut ejus causam in sang: serosis et acrem inter arteriolas et poros Durae matris (ubi nullas agnoscunt venas reducentes, ut generetis febris) coercitis refundunt.

Cura.

Cura fit 1ò. V.S. ad imminentem lypothimiam ut pori collabantur, et ut residuus sang: non tantam vim habeat in poros arteriarum cerebri. 2°. Vomit: forti ex V. Emet: ℥iß et ☿ii vitri gr: VI. vel VII. 3°. Clyst: Lenit: 4°. purg: laxante (ne motus sang: augeatur) ex conf: Hameh, fol: – sen: rad: hellеb: nig: polypod: tamarind: cum cinam: vel ZZ. 5°. pulv: helleb: nig: ʒß helleb: alb: gr: 4. 6°. Emuls: ex sem: frig: Laud: et syr: Diacod: 7°. sal: prunell: ʒß sacch: Sat: Camph: ana gr: i.ʒ. cum aq: frig: saepissime. 8°. Ung: popul: cum opio, pro fronte temporibus, imo et regione aliquando cordis. 9°. pasta ex luto cerulo cum aceto pro axillis. 10°. Cucurb: humeris et occipiti. 11°. Balneis ex aq: frig: vel aliquantulum calida, praeut tempestas tollit ex quo ordinario sequitur morbi solutio, vel per febrem criticam, vel per diuresim, vel diaphoresim, sine dubio ob constipationem pororum, uti nobiles videmus frigus susceptum, per natationem in aq. frig:, et inde subsequentem maximum sudorem, curatos. 12°. [illegible] in aq: [illegible]

Specificus in mania.

Melanch:

Melancholia differt à maniâ, solummodo, quod timor et tristitia suppleat locum audaciae et iracundiae, ob sp: magis crassos, vel minus vividos.

Eundemque diabolus superat, quo melancholicum superat. Clyst: Sat:

Cura

Omnia moderate acida, et moderata, atque calida in 2° gradu.

Cura fit 1ò. V.S. in hemoroid: vel in pede, eaque satis parca, nisi suppressiones mensium et sim. in culpa sint. 2°. Vomit: 3°. purg: ut suprà, praemisso tamen apoz: vel decoc: medic: (quia aliter difficulter purgantur) ex rad: aper: polypod: cort: cappar: tamarisc: agrim: fumar: scolop: borag: buglos: mart: solub: crist: tart: vin: alb: quibus si placet, adde senn: rad: helleb: nig: et aliquando hyster: si opus fuerit. 4°. sero lactis chalyb: rad: aper: blanditisque diuret: impraegnato, quibus plus proficies quam multis compositis quibusque fortioribus. Hamil. 191.

Polyp querc: et rad: helleb: nig: species.

usus chalybis ad [illegible] 8, vel 12. [illegible]

Hoffman Melancholici facilius moventur mollibus lenitivis, quam catharticis.

compositis medelis. 5º. pomo helleb: [crato] rad: helleb: nig: circumcirca transfixo, uno vel altero interposito caryophyllo, et sub cineribus assato. [e commixtione repetita in aq: bagliv: ... 6º. 7º. Pil: melanogogis ... tartaro vitriolato. vide Affect: Hypochond:] [vel pil: ...] Si Melancholia sit à pecuniæ jacturâ, et sim. qd anima non bene distinguat inter impressiones olim factas, et nunc impressas, et qd conjungat cogitationem felicitatis et divitiarum, hujus cura sit præcipuè amovere ægri ab illis cogitationibus. [Melancholia ex animi passionibus orta curatur exercitio, equitatione, etc.]

Phrenitis est delirium cum febre acuta et continua. (vide Ettm: 150)

Phrenitis. [vel ... ad Delirium.]

Causa. Causa est vel inflammatio cerebri orta ex crassioribus particulis ex poris vasorum nimis apertis (ob nimium motum sang:) extrusis, et in poris cerebri hærentibus; unde vel ob repercussionem inordinatam et irregularem sp: vel ob locum solummodo concessum materiæ subtilis transitioni, sensorij cõis tollitur æquilibrium, et membra involuntariè moventur. Vel 2º. depositio partium salinarum (ab Authoribus translatio Bilis nuncupata) et earundem in poris cerebri habitatio.

Quær: Quær: 1º. An victus tenuis et plethora præcesserint, sang: ad nimium motum disponentes? 2º. An facies ignea, oculi truces, et lingua sicca (ob motum et spirituositatem sang:) 3º. An pulsus sit celer et frequens, seu an febris adsit acuta, aliter ac in Mania et Melancholia, ob sang: nimiam tenuitatem et rarescentiam, vel ob ejusdem, per alios, mixturæ turbationem? 4º. An deliret, vel ineptè loquitur, ob vestigia menti perpetuò objecta per prædictum sp: inordinatum motum? 5º. An nec alvus nec urina respondent, ob partis tenuis et humidæ nimiam dissolutionem, vel ob salis in cerebro depositionem?

Cura. [vel ... ...] Cura fit 1º. V.S. larga [præsertim in fronte]. 2º. Clyst: laxante et anodyno, ex decoc: Hord: malv: sem: et fl: papav: violar: et sim: 3º. Oxyrhodino, ut in Cap. 1. 4º. sp: nitri et salis prun: in omni potu (ut salis acrimonia obtundetur) 5º. fomentatione sup. pectore pro urina reddenda, ex parietal: petrosel: sem: apij, cum aq: cõi et scorp: lumb: etc. 6º. Julapijs refrigerantibus et acidis. 7º. Epithemis refrigerantibus pro fronte et cerebro, ut aceto rosaceo, etc. 8º. Columbis vivis in medio sectis et capiti applicatis. 9º. Laud=

[Varices, ... alvi fluor, ... dolor ... ... mal.. vel ... hæmorrhoid... Bon. vel ...]

9° Laucano. 10°. In declinatione morbi, purg: laxant. 11°. Immersione in aq:

Hydroph: Hydrophobia est aversatio mentis à morsu canis rabidi inducta, iisdem symptomatis ut in ipso cane comitata, ut ex aq: vini cerevisiæ omniq liquore abhorrentia, imò et aliqdo ab eorum sonitu.

Causa. Causa est rabies canis à fermento nimis potenti in sang: ejq inducta, unde sang: incalescens os reddit spumosum, cujq ope mediante morsu et circulatione sang: iidem effectq in aliis ut in ipso cane producuntur, temporis saltem progressu, ut intra 30 p 40 dies et aliqdo longiq. Visos etiam accidisse post morsu canis, ut vocat Borellq. cent. 2. obs. 54. et cent. 3. obs. 38.

Venenum canis coagulat sang: ut sequitur plurimos morbos malignos. Misc. Cur. Vol. 3. p. 340 et 109. Sal. vol. vip. Succ. aq. theriac. Ruta pulv. et spec. arcent. Ag. gr. 15. 16. Cura Ettmuller P. 3. c. 23. et 3°. et post finem hujq libri.

Cura. Cura in principio p immediate à morsu, fit 1°. p Extirpatione partis, et ejq cauterizatione actuali vel scarificatione, p lotione ex vino, sapone, theriaca, et sim. 2°. Sudorificis ex theriac: spiritu vini, pulv. sal. viperarum, Bez: miner: et sim. gr. x. omni hora. n. et sal. C.C. sal. vol. succ. Bez. orient: 3°. Clyst: si faeces sint indurati. 4°. Alexipharmacis. 5°. Cum morbq est pertinax, immersione et saepius repetita immersione subitanea in aq: frigida p aliqd tempq. Quaedam calida à morsu canis ... et incisionem ... [illegible]

... 900.

Cap: 10m.

De Somnambulatione

Cum sit partialis vigilia, fit à liberiore sp: in ... p ... nervos ingressu, ob eorum conformationem naturalem, magis quam ... Non enim ab intemperie sp. procedere videtur, ex sic totum corpq esset vigilans.

... temporis ... interdum

Cura. Cum non sit morbq, sit argumentis moralibq aut objurgationibq et castigationibq, 1°. ... in loco tuto, ne ... quarum postea meminisse ... recordentur. 2°. sit ... 3°. Appropriatis ad constitutionem naturalem patientis.

Cap: 11m.

De Incubo (pro quo vide Suffocationem Uterinam) et Hydrocephalo (pro quo vide Hydropem) et spiritu, et Blanc: ...

(Causam et curam omnium humorum)

Cap: 12m.

De Catarrho calido et frigido, Coriza, Odontalgia, Dentium corrosione, nigredine, vacillatione, et Gingivarum Sarcomate, Epulis, Ulcere et Hæmorrhagia, it: Ozæna &c.

Catarrhq quid: Cum Catarrhq nihil aliud sit nisi seri circulantis depositio et stagnatio, ex quo hæc in omnibq fere corporis partibq fieri possit

possit, necnon varia sortiatur nomina, vel ratione partis occupatæ, vel ratione seri ipsius indolis, cui postea videbimus in Rhumatismo, Arthritide, Scorbuto, multisque aliis affectibus et hactenus vidimus in Apopl: Paralys: Cephalal: frig: etc.) idcirco hic loci de stillicidio et destillatione Catarrho, insolito effluxu seri ex gland: circa caput et fauces, eiusdemque in iisdem habitatione variis. Seri naturam symptomatis sese manifestans. Sic

Luax: In Catarrho calido, Ad faciei adsit rubedo, capitis dolor pungens, vigiliæ tussicula sicca, humoris tenuis et acris per nares et fauces effluxus, pulsus celer, et crebro, oculi pruritus, narium titillatio et excoriatio, sternutatio, oris salsedo, gingivarum erosio, faucium ardor, sitis, urina rubicunda.

In Coryza eadem adsunt symptomata, sed pauciora, cum nares solummodo effluxu humoris acris et gravitate circa sorundo radices, in hoc affectu sunt infectæ.

In Odontalgia etiam nunc plura, nunc pauciora prædictorum apparent.

In Dentium et Gingivarum corrosionibus quædam prædictorum apparent, sed quod forte saepius sunt effectus, vel Scorbuti, vel Catarrhi Scrorei idcirco exacta notitia huius morbi ab his petenda est.

Causa est obstructio seri in partibus prædictis, sine qua nequit fieri Catarrhus; eius enim essentia consistit in eo situ. ... Causæ quæcumque nimiam seri talis copiam in corpore accumulant, diuresim vel diaphoresim impediunt, vel sang: nimis exquetaciunt cui copia vini, etc. aborum præter morem constringunt aut ventriculi cocti... inervant, etc. non parum contribuunt. Imo fieri potest ut chylus non bene comminutus, eiusque nimium in vasis cumulationes, corpusque non satis homogeneum ex sang: componentes, facile rursus ab eo separentur in partibus ubi motus a corde deangustit, præcipue circa caput seu cerebrum, ex non solum fit vicinis minus instruitur, sed etiam gland: numerosis. Nullam hic mentionem facimus humorum ex cerebro in partes subiectas descendentium, vel per os cribriforme, vel alias vias incognitas, ex sinceriores partes sua habeant vasa hisce finibus inservientia.

Cura Catarrhi calidi fit per ... 2º purg: ex succo rad: Iridos vulg: ℥i ex syr: de Rham: ℥i vel manna ℥i vel infus: senn: vel Elect: Lenit:

Sem: Cydoniorum in Dec: vel pulv: | Ʒj. ℥ Succ: Liquir: Sambuc: Balf: ℥ Misc. pil: famosis doloris.

cum tamarindis et passulis. 3o. amygdalato cum ex Laud: et Ra opij. 4o. Balsam: Lucatelli ex sem: Hyosc: 5o. Lohoch ex syr: Diacod: papav: spec. Diatrag: frig: mussilag: sem: psyll: papav: alb: gum: Arab: pulv: amyl: sach: penid: cons: fl: Nymphaeae, aculo distill: aliisque in Phthysi incipiente, ut serum circulans aliquantulum incrassetur, et acrimonia temperetur, ne in nervos irruens pariat tremorem, Epilepsiam, spasmos, Convulsiones, et sim: 6o. Lotione brachiorum et crurum. 7o. sudorif: ex opiatis, saltem in principio morbi.

Cura Coryzae

Cura Coryzae fit praedictis, ut et etiam 1o. Vapore ex decocto malv: alth: et sim: ex lacte. 2o. aceto in lamina ignita. 3o. Butyro insulso, vel Ung: ex pomato, ☿ d: ☿ vivo, sach: sat: et Camphor: naribus intruso.

Cura Odontalgiae

Cura Odontalgiae calidae fit 1o. V. S. 2o. Purg: ut supra, vel ex pil: antivenereis Cenitor longum (?) 3o. Vesicat: 4o. Caustico aure inusto. 5o. Calapl: ex theriac: ex mica panis, et campor: et opij aa gr: 8. 6o. Opio ex sem: Hyosc: et spec: vitrioli ex colonid: denti excavato immobilis Cul- nervi solvatur tensio ut et 7o. Cera uno cumillo sub: tala, ut impedia- 3 a ... ingrediatur. 8o. empl: gum: ... amat ... Laudan: Mastich ... Ceph: ... ... Aloe ... ad linum ...

Cura Dentium

Cura affectionum dentium ... Caveoines, et sim. fit 1o. Aq: salitâ. 2o. pulv: ex lap: pumicis, ossis sepiae, corall: alb: et tart: vitriolato. 3o. Cineribus Nicotianae. 4o. pulv: ex terra porcellan: ... vel Pharm: ... p. 2. ... ʒß alum: ust: gr: XIJ. tart: vitriol: ℈ij.

Cura Gingivae

Cura affectionum Gingivarum fit 1o. Internis Antiscorb: imprimis radicalis. 2o. Gargar: Dec: salv: rorism: major: fl: ros: rub: lig: Guaj: Sassafras: 4o cujus colaturae ℔ij addantur mel: rosac: ʒiß alum: ust: ʒß sal: prun: ℈ij, et Ung: Egypt: (si gingivae et palatum putrida sunt) ʒj vel ʒij. 3o. Mixt: ex mel: rosac: ʒß Egypt: ʒij alum: ust: ℈j, sp: vitriol: gt. 4. ex qua fricentur gingivae putridae. 4o. pulv: ex gallis, Nucib: Cupress: Myrt: Alcos, rad: Ireos, Bistort: Tormentil: fl: Balust: Corallin: calic: glandularum, et sim. Gargar: ex Dec: lig: Guaj: sassaf: mel: ros: sp: vitrioli, et aluminis.

Cura Haemorragiae Gingivarum fit ex pilulupi ex bolo et sim. vel ex album: ovi. ... interno non ...

Causa Catarrhi frigidi

Causa Catarrhi frigidi est laxitatio vel obstructio, vel ... Causa se manifestans ex gravedine ... Somnolentia, oculis humidis, inappetentia, lassitudine (praecipue in Articulis) umore aliquo in Parotidibus.

Max-

Cura corizae
Margin: Sp: vini ʒj gum ... Laud ʒij infunde ... 2 dies ... vasculo ... dentis ... | ... Ʒß alum ... Engl: m. ... 206 ... pro dentif: ... Boerh.

maxilli, collo, &c; aliqdo etiam Asthmate, Diarrhœa mucosa, pituitosa et flatulenta, præcipue si constitu^u pituitosa praecesserit.

Cura fit 1º. Vomit: 2º. Purg: ut in Catar: calido. 3º. Vesicat: 4º. Suffitu ex Succ: benz: styrac: Balsam: tolut: roris m: et sim: 5º. Empl: pro sutura coron: vel inspersione pulv: in verticem ex betton: rorismar: ruta, et sim: cephalicis, cum moscho si non sit fæmina. 6º. Odoramentis ex iisdem. 7º. sudorif: sed vix ante præviam aliqm attenuationem humorum (ut in morbis capitis) difficiliter enim in sudorem deducuntur qui gravi catarrho tabo-rant. Advertendum etiam est sudorif: semper debere esse an-teponenda purgantia.

Cura Odontalgiæ frigidæ fit præd: prædicta, et: Garyoph: origani, Buxi, et sim: denti impositis, ul et rad: pyreth: pip: long: aliisque vesicantibus, ut Spir: &c ut in Catarrho calido. et: caryophyl: cum paucis opii ling vel cottone involutis.

Ozæna nihil aliud est qm Coriza confirmata, seu eius maximus gradus, cum defluxione admodum acri in nares et fauces, cum ossium nasi et palati corrosione; ossiculorum putridorum cum saniei excretione fœtida, frequenti sternutatione, vocis alteratione, nasi subsidentiâ, et ulcere aliqdo fistulosa, aliqdo crustosa.

Causa sunt humores acres et corrosivi ex art: proximis, et forte etiam nervis, in palato et nares decumbentes, vel est effectus Luis venereæ, vel suffitus ♀alis vel ♄alis.

Cura fit ut in Coriza, ut et Dec: ex lignis, vel saliva^{tione} p[illegible]

Cap: 13tium.

De Ophthalmia.

Est inflammatio vel Corneæ vel Conjunctivæ vel musculorum, vel Glandul oculi, unde aliqdo oritur Exophthalm: oculi proptosis et procidentia.

Causa est obstr: vel hæsitatio sive seri sive sang: in prædictorum vasculis, unde humores stagnantes fiunt acriores, aut saltem ex iis præcipitantur salia-partes vellicantia, unde calor, rubor, pruritus, dolor, non tam ob sang: vel humores, qui satis laudabiles esse possunt, qm ob obstructionem.

Nott. 1º. Ophthalmiam à variolis procedere, præcipue si serum maa sit acris et corrosiva; semp enim coniunctam habent quandam viscositatem, quæ stagnationem in arteriolis minimis efficit

efficit

4º. [illegible] cochl: j. syr: vi[illegible] cochl: ij. pli: [illegible] ℥iv. M. f. [illegible]

Cura Cat: frig:

et Horariis [illegible] Cura [illegible] corr.

Odont: frig:

Ozæna.

Causa.

Cura.

Causa.

efficit, ob quam etiam causam dolores illi dorsi, frontis, tempor, et pulsatorij sentiunt. Ob similem etiam viscositatem Strumosi sæpissime ophthal: pertinaci laborant. Nott. 2º. Perceptionem in Ophthalmico Muscarum in aere volitantium, aut simulachrorum aliorum, nullo modo esse effectum Ophthal: prædictæ. Externæ solum nuncupandæ, sed inflamationis retinæ, internæ dicendæ, de quâ in suffusione et Gutta serena disseremus.

Pilearum.

Cura.

Cura sit 1º. et S. nullus enim est morbus qui non suâ — eam sæpius postulat. 2º. Purg: ex pil: Coch: aut Agar: ℈ij cum Diagred. gr. 6. (si sat procedit) aut troch: alhand: gr. 4. (Pilulæ) et ℥ij d: (nunquam in ophthal: strumosa negligendi) gr. 6. vel 8. vel ex Dec: tamarind: et senn: cum syr: de Rhamno. 3º. Vesicat: et Cucurbit: scarificat: fonticulis; vix enim dici potest quantum auxilium in hoc affectu adferunt. 4º. succ: millipedum interne; vel cerev: millipedata cum Euphr: verben: faenic: eorumque sem: 5º. Topicis, ut aq: spor: Ranarum, plant: Nymph: Ros: cum vitriol: alb: et alb: ovi. 6º. Ung: com pro ophthal: vel ex butyri non saliti in aq: Euphr: lotis ℥IV. Tutiæ ppt. sang: drac: āā ℥ij. margar: ppt. vel ossis sepiæ sarcocoll: āā ℥ß. camph: ℈ß. laud: gr. 4. 7º. vino calido cum Tutia et camph: 8º. Dec: sem: psyll: cydon: in aquis prædictis, cum troch: albi Rhas: et opio, alijsque omnibus in Epiphora.

2 aq: ros: plantag: āā ℥iv. vitr: et instillentur oculis Cantho interno.

4 aq. plant. et Ros ℥ij. vin. empt. ℥ij Troch. alb. Rhas ℈ij vel ℥j. ut fiat collyrium. Cock.

Cap: 14um.

De Epiphorâ.

Est lachrymarum in genas nimium stillicidium, ob quarum lentorem et corrosionem Corneæ aufertur pelluciditas.

Causa. Cum sit species Catarrhi acris in glandulis oculi, Cura sit acrimoniam diluentibus et gland: constringentibus, ut 1º. Dec: Malv: Alth: fl: melilot: balaust: cort: granat: sem: fænugr: psyll: &c cum aq: com, et cum ijs in ophthal: recensitis, quibus addendum: sach: sat: camph: et sim: in ophthal: descripta.

Cap: 15um.

De Albugine, Pterygio, panno seu Ungue Oculorum.

Albugo est macula totam pupillam vel ejus partem occupans; Pter=

17.

Pterygium est membranula rarior vasis sanguineis disseminata; Pannus idem membranula densior, quae à cantho ad iridem sese extendit, et aliquando totum oculum tegit.

Causa. Sunt partes quaedam aeris in oculis intercepte et obstructe, modo ad inflammationem producendam necessario, unde ob nimiam sang: in vasis quantitatem, vel vasa ipsa in majorem longitudinem producuntur, et carnem luxuriantem (ut fit in vulneribus humidis) generant, aut ad minimum nunc sang: rubicundum vehunt, prius vero solummodo humores, uti videmus sepissime in variolis nimis cito aeri expositis accidere; accidentalis enim depositio humorum, nulla cognita praeexistente intemperie (eodem modo quo catarrhi partes in aliis partibus fiunt hos morbos producit. In hisce omnibus oculi lumine offenduntur, quia fibrae, ut in aliis partibus inflammatis, plus solito tenduntur, usque ad facilem ruptionem.

Cura. Cura fit 1°. Ur[...], praecipue [...] ... blacci et cucurbit. et purg: ut in ophthal: 2°. Cicatrix seu membranula paulatim abradatur liquore ordinario (ex vitriol. et sach: candi ana ʒij in alb: ovi assati, dissolutis immediate post exemptum, [...] fil[...] liquor et post dissolutionem [...] ferventi guttatim instillato. 3°. Aq: [...] saphirina Rot: emulsori facta ex aq: calcis (vel si vis aq: ros. et fenic:) ℔ss, ✱ci ʒj, infusis in vase cupreo, donec color fuerit caeruleus, bis filtretur, et in oculum, prout patiens fert, instilletur. 4°. Inflatione Zibothi accidenti: pulv: per canam in oculum. 5°. pulv: (si inflammatio non magna sit) ex ossis sepia, sach: cand. [...]: croc: metall: Glycyrrh: ana gr: x. vitr: alb. ℈j, aloes gr: 6. Inlinenda pannis lineis [...] lis madefactis in aq: aliqua frig: et pauco vitrioli, vel in vino clareto et eodem, legatur oculus, ut in hisce datur quantum possit, Inflammatio à tali pulv: expectanda. 6°. Ibi etiam maxime prodest aq: Barbetti. Sunt qui Empl: moderate corrosivum [...] oculo per 14 vel 20 dies, et successu applicant. [...] omnia haec effectum [...] cilia [...], si post urtica [...] et [...] usurpetur. ut in Gutta Serena postea dicemus. pulv: a luminis oculo impositus prodest ad Pterygium & Pannum.

℞ Chirurg.

Cap:

Causa.

Cura.

℞ aq. fenic. aq. Euphras. ana ℥iv. [...] ℥j. Olei alb. ʒj. [...] igni calore coq. parum; colat. adde [...] et aut altera bis terve de die oculus irro: [...] si adsit inflam. Colat. adde Camph. gr: xv. [...]

℞ bol. Armen. (Vapo: [...]) ʒj. pulv: ossis sepiae ʒß sach. cand. alb. ʒj. M. f. pulv. subtiliss. ter de die oculo inflando. [...]

[...] Empl. viride vulgo [...] Salvator[...] Bar[...] dagani dictum, [...] quantitate [...] dies [...] ordinario. Empl. [...] oculo ap: plicatum et [...] caro luxurians a: [...] aut vulnus im: mundum est.

[...]

Cap. 16.

De Amaurosi, seu Guttâ Serenâ.

Cum Gutta Serena sit caecitas illa, quae nullam praebet in exteriori oculo vitii suspicionem, est obstruc: seu compressio Nervi optici, aliqdo etiam ejus nimia exsiccat., incurabilis maxima ex parte censenda, uti saepe fit post phrenitidem, inunctiones spiraldes nimias, Spiritus nimis ulis, et sim. Sunt tamen qui hanc obstruc: optici ridiculam existimant, et totam hanc caecitatem in Ophthal: internam refundunt, adeoque muscas, et sim. ante oculos apparentia huic morbo (et nullo modo Cataractae) pro signis Diagnosticis convenire volunt: Haec en: Spectra, Dr. dos. nihil aliud sunt, quam partes Retinae à vasis sanguineis nimis tensis et infarctis, occultatae et compressae, ita ut in multis ipsis locis nullus excitari possit sensus, nulla pingi imago. Utcunque sit, utera et sim. in corpore vel nimis citò occlusas vel refrigerantia repersim. in corpore vel nimis citò occlusas, vel refrigerantia repercussa, imò et Cachexia, Leucophlegmatia, Scorbutus et sim. maxime huic morbo maam praebent qmvis aliqdo sine ulla primam huic morbo maam praebent qmvis aliqdo sine ulla praexistente cognita intemperie, ut in aliis morbis diximus, accidere possit.

Cura. 1o. et 2. si intemperies adsit. ℞ pura: valida et reiterata ex pil: Cock: min: et Ext: Rudii, vel ex pil: Lucis, Extr: Agar: 3o. Errev: Oxydorcica Baldi. 4o. Diagr: troch: alhand: et sim. 5o. Aq: fenic: pulv: millip: Euphr: et fenic: ana p: aq: interne. 5o. Aq: fenic: et Euphr: vel potius eorum succus depuratis cum pauco fellis bubuli, et croci Metall: 6o. Vinum Emet: externe pro Errhino in quo millipedes infusi fuerunt, etiam maxime prodest, si sal Euphr: ei addatur. 7o. Hic non negligentur Cauter: setacea, et sim. Quibus omnibus non proficientibus, adhibeatur ☿ d: ascendendo à gr: X. ad XX. per dies aliquot, 5, 6, aut 7. cum conf: ros: ʒß, vel si diarrhoea metuatur cum ther: vel Diascor: ʒj, cum pauco Laud: Deinde post 2, aut 3 vices purgatio instituatur, et rursus ☿ d: iisdem vel majoribus dos: toties vicibus praescribatur, postea iterum pura. et toties, donec si morbus cedere videtur, vel agri vires ulteriores ☿ doses, aut salivationem non ferant, ad Dec: Guaj: fortissimum calidè mane exhibendum ut sudet, et minus forte pro potu ordinario, recurrendum est. vid. p. 16. marg. Cock.

Pitcairn.

Cura.

Aq: Borbotti, vel gutt. 2. in oculo. Vinum millepedes cum croc. metall. vel aq. Euphr. foenic. vel aut Cholid. maj. cum pauco vitri. et alb. ovi intigend. 8o. Ser. secund. capitis et applicatio ad ... Sical: copa allata cum ol. Carvorh. interne intuso, modo compressis exemplo, ... applicatus. ... [illegible]

℞ ☿ d. subl. bili gr. j. sacch. albiss. nuc. gr. XXX. f. sternutat. divid. in dos. X. Boerh.

Cap: 17mr.

De Suffusione et Cataractâ.

Suffusio est visûs obscuritas à corpusculis aqueo humore innatantibus. Cataracta verò est ejusdem ablatio ab iisdem corpusculis, in pelliculam tractu temporis firmissimam supra internam pupillæ superficiem, facessentibus.

Causæ sunt humores immobiles et acidi luminis non satis obedientes, in oculi humore præcipuè aqueo (non enim opus est ut sint per incrassati et coagulati, ut voluerunt aliquando Authores) ex Arterijs plusculum aperlis expulsi, alioquin non nocerent; semper enim sunt in sang: sanissimo.

Signa Pathognomonica et Diagnostica hujus morbi ab omnibus Authoribus referuntur in varia simulacra (ut pilos, arenam, muscas et sim: ante oculos volitantia, à prædictis corpusculis aqueo innatantibus, ut velint, occasionata: Datur tamen Neoterici qui prædicta signa nequaquam convenire ut in Cap: præced: [illegible] eo quod corpuscula in aqueo humore [illegible] [illegible] in Retina [illegible], imò nec ea quæ Corneæ exteriori adhærent; Cicatricis enim Corneæ nulla est imago; ea enim est convexitas Retinæ, ut ad objecta in ea pingenda (hoc est ad congregandos omnes radios in uno puncto à quovis objecti parte emissos) debeat objectum visibile removeri à Retinâ ultra distantiam Corneæ à fundo Oculi. [illegible] [illegible] me [illegible] Cataractas conjungant simulacra muscarum obvolitantia ante oculos, eas conjunctam esse Guttam serenam, ita ut quamvis Cataracta per Chirurgum dimoveatur, Gutta serena remaneat, ut in varijs accidisse affirmat. [illegible] non asserunt Authores corpuscula hæc esse ipsas res visas, sed solumodo in causa esse, ut [illegible] objectis debito situ venientes, ita in suos molu [illegible] priusquam Retinam attingunt, ac si revera lævia [illegible] [illegible] sita coram oculis essent. In [illegible] enim [illegible] humorem flavum Corneam obsidentem; sed tamen [illegible] humorem hunc esse causam quod omnia circumcirca flava [illegible]. Sic etiam non videmus vitra variè dissecta [illegible] [illegible], hoc tamen in causa erit quod objecta omnia [illegible] [illegible], divers [illegible] modo collocata taliter ac revera [illegible] appa=

per operationem admirandam in Suffusione. mayern. p. 84.

Causa.

[illegible] [illegible] partis [illegible] [illegible] humore vitreo in Cataractam et Suffusionem convertis [illegible] majorem et minorem partis aqueæ evaporationem.

Charr. 192. ait, omnes partes in primordijs generationis formari, adeoque tumores cisticos et Cataractas nihil aliud esse, quam explicationes, evolutiones, aut liberationes membranearum et pellicularum partes formantium; unde concludit Cataractam formari per pelliculam parvam à crystallino humore liberatam seu separatam, quæ quia in humore aqueo dextrorsum et sinistrorsum, per varios oculi motus, ducente fluctuat. per Stura.

+ [illegible] Adversaria ad Opticam et Boerh. de morbis ocul. p. 37 ad 41. [illegible] omnis Cataractis; [illegible] [illegible] [illegible]!

℞ ☿ d. sub. bil. gr. j. Sacch. albiss. pulv. gr. X. M. divid. in X dos. pro Sternut. Boerh.

apparent. Non tamen absolute necesse, quod praedicta simulacra ab ipsis retina partiali occultatione (et a vasis sanguiferis, ut in Cap: praeced:) excitari possunt; sicque difficultas non minima erit cui horum causarum haec adscribere.

vid. p. 10. morb: ocul.: Cura.

Cura est eadem ex ea Gutta Ser. ex R. ut et manu Chirurgi, si opus fuerit. Suffusioni singularem usum habet infus. Coc. moluccens, ut et sang. colum. binas calide adhibeto. ℞ aq. ophtalm. ℥x. aq. R. Hung. ʒij. sp. sal. armon. gtt. vij. M. Nuck. et alia etc.

Cap: 18vum.

De Aegilope et Fistula Lachrumali.

Aegilops. Anchilops. Aegilops est Tubercula seu Vomica in interiore oculi Cantho, versus digiti cito diffluens, et prompte cumulans, in Anchilopem (vulgo rupti) saepe degenerans, aliquando inflammatorius ex febre mili, et ob fluxum aliquem praecedentem ex naribus subito suppressum, et ob inflammationem non bene discussam, et ob materiae acris et corrosivi in illa parte depositionem, iisdem ut in ophthalmia et remediis est succurrendum, et postea detergentibus, ut in aliis ulceribus, viz. Bals: sulphur: myrrh: aloe, et sim.

Fist.: Lach. et charriens. Fistula Lachrymalis, est ulcus praedictum, sinum efformans, carunculam exedens, et os cariosum reddens, ex margine sinus calloso, et puris per nares et genas stillicidio. Quae Chirurgica tractanda venit; prius tamen tentanda curans callositatem sinus abradentibus, ut Alum: Vitriol: Ung: Aegypt: et sim. dein sarcoticis, ut myrrha, et sim.

Cap: 19num.

De Phlyctanis, Rhiade, Encanthilide, etc.

Phlyct: Phlyctenae fiunt a Lympha subtili glisconte intra poros Conjunctivae et supra Corneam stagnante, unde per areolas attollit

Cura. Conjunctivam et quasi bulliens reddit, Quae 1o. lens punctione, et 2o. sp: Vini Camphorat. et 3o. absorbentibus, ut Tuth: Lap: Calamm: et sim. in Alcohol redactis, curanda veniunt. (ist. pulv. subtiliss.)

Encanthis. Encanthis est Carunculae praedictae immodica excrescio, seu Cura. eminentiam abradentibus, humiditatem absorbentibus, et paulatim adstringentibus, curanda.

Rhyas. Rhyas est carunculae anguli et canthi maj: absumptio et imminutio, sarcoticis acrimoniam materiae dinuentibus curanda.

Sunt plurimi alii ab Auth: recensiti oculorum morbi. Sed ex nec illi, nec praedictorum maxima pars, ullo alio modo ratione causa

causâ, sed solis ratione partis affectae, aut varij ad summum causae istius progressus, inter se differant; quorum omnium frequenta habemus exempla; idcirco abulteriori talium tractatione supersedemus.

Cap: 20^mum

De Auris Dolore et Ulcere.

Est obstr: et hesitatio ob viscositatem, et salem conjunctum, vel accidentalis depositio seu praecipitatio, ut in alijs inflammationibus, vel cum vel sine intemperie, cum rubore et calore ad tempora et mala, ut et cum dolore maximo et febricula, ob fibrarum tensionem et brevitatem, saepissimè cum delirio.

Cura, fit 1º. & 5. 2º. instillatione Rx olei cum camph: 3º. cataplasmat: cum iisdem et emollientibus, ut malv: molle. sem: lini, foenugr: et sim: ex quibus etiam fieri potest panis [illegible] modum siccandus et applicandus. 4º. Catapl. ex pane et lacte. 5º. facta suppuratione deterget ulcus injectionibus ex agrimonia, rosis, et sim. cum melle, et quotidie instillatur mel rosac: vel [illegible] vel cum pauco ung: Aegypt: durante sordicale ulceris. opt. est ung. ex cerussa communi minio et ol. ovis. sap: Etmuller.

ulcus, et illud [illegible] ta myrr: aloes [illegible]

Rx ol. sem. papav. ʒiß amph. gr. V. opij gr. ij. tabes auri instillentur [illegible].

Cura doloris Rx lact: mulieb: ʒß croci gr: xij. Dec: tamarind. vel thering. ʒiij [illegible] salut: ℥j. [illegible] in calg auri [illegible].

Dec. Agrim: cum vini opt. Idoneum, et: C.C. destill. posse pis and [illegible]. [illegible] ℔ fr. vol. 3 p. 1 [illegible] + empl. de minio cum sapone + [illegible].

Cap. 21^mum

De Surditate, Tinnitu Aurium et Gravitate Auditûs.

Horum causae curabiles sunt, vel 1º. obstr: vel compressio totalis vel partialis nervi auditorij, vel obstructio pororum tympani à mâa viscosa, vel ob densatam vaporibus internis exitum, fit tinnitus. vel 2º. erosio partis à pure. vel 3º. nimia nervorum vel partium siccitas, ut in senibus, et nimio [illegible] tractatis, et sim. 4º. plethora nervos premens. Incurabiles verò causae sunt 1º. tympani ruptio, quae saepè fit à sonitu vehementiori, vel à maxima puris erosione. 2º. distractio ossiculorum ab iisdem vel sim. causis.

Causa.

Rx succi cepparum, sp: vini, aa ʒiß. ex mixturâ, topicè sinistr: illorum qet: [illegible] quaedam durum, et deinde [illegible] obturet.

Rx [illegible] opt. [illegible] gr. j. sacch. albiss. pulv. gr: x. M. f. dos. x. pro [illegible].

Cura affectuum à viscositate fit 1º. Purg: (ut in Cap. 2) 2º. suffumigio in aures per infundibulum, ex dec: herb: cephalicarum. 3º. [illegible] Rx castor: vel ol: cymini, vel Gariophy: vel Junip: [illegible] aa: [illegible] tuns: cum pauco ol: amygd: amar: nè nimis fortia. sint, omnis [illegible] sola omnia sunt suspicanda. 4º. Colone cum Zibetho vel moscho. 5º. [illegible] diaculis [illegible] panno raro involutis, ex galb: [illegible] vel cum [illegible] pyrethri et Euphorbij. viz. gr: j. vel ij. et gr: j Zibethi. 6º. operatur externè et internè et omnia in aliis Cap. 2. contra

Cura

Rx 4 [illegible] Whitehill ex Asarâ [illegible] gr: iij, 4, vel 5. [illegible] somni [illegible] [illegible] [illegible]. ac post purg: [illegible]

Panis ex furno statim extractus, cum sem. carv. [illegible] [illegible]: dec. coctus et in [illegible] vini im[illegible] [illegible]. pro [illegible]

Cura affectus à siccitate fit emolli[illegible] [illegible] gossipio quod excepit in auris tinnitucum vel sine dolore, [illegible] ol. C.C. destill. act. Hafn. vol. 3. p. 129.

Cap: 22us.

De Hæmorrhagia Narium

Causa est sang: impetuosus vel copiosus ob intemperantiam in potu et cibo sale volat: donatis, vel ob febrem vel ob vomitus, vel ob [illegible], et sim. est acris, à quibus omnibus fit vel anastomosis, vel diapedesi, vel diabrosis. Rexis fit à casu vel ictu.

Cura postquam symptomata lypothymiæ à nimia effusione considerata sunt. prostant pro ipso morbo, 1°. aceti rosac: et sim: refrigerantia, Dorso (ob Aortam et venam cavam) collo et temporibus (ob caroticas) cervici (ob vertebrales) testibus (ob spermaticas). 2°. Amygdalata vulg: internè (pro acredine et motu) ex sal: prun: laud: camph: et sal: Satur: 3°. Mixt: ex iisdem ex aq: sperm: Ranarum, syr: myrtill: lap: Hæmatit: sang: dracon: (laudan., sal: saturn:) 4°. potus ex vitello ex aq: sale prun: et alum: 5°. crepitus lupi in nares intrusus. 6a Mixt: vel muscus cranii humani, vel pannus lineus combustus ex aceto. 6a Mixt: styptica ex alum: usto, nitro, vitriol: crepitu Lupi, et alb: ovi. 7°. stercus porcinum pro naribus prohentes, ut et aranea viva panno involuta, ut et lap: hæmat: cois, et alii lapides eodem nomine insigniti. 8°. pulv: Bufonis vel collo suspensus, vel subaxillis detentus. (vel ii ad [illegible] [illegible]) (item Opium ex aceto naribus intrusum.)

Cap: 23us.

De Polypo Nasi, et Sarcomate. vid. chirurg.

Polypus est excrescentia in naso, aliquando subrubra, aliquando alba aliquando livida, aliquando dura, et tuberosa, aliquando mollis et extra nares pendula, aut in fauces (unde loquela incommoda) sua habens vascula sanguifera (quibus in aere austrino et diversis lunæ phasibus ampliatis) ut et pedicillos, quibus vi ossi [illegible], v. [illegible], v. parieti interiori [illegible] adhæret. quibus etiam solis differt à Sarcomate.

Causa est distortio pororum, vel prolongatio extremitatum arteriarum (ut sæpè fit à lapsu) ob quod, v. nutrimenti in totius poros pertransit, formando substantiam ab omnibus aliis corp: partibus valdè diversam, conveniens, vel caro fit luxurians. aliis partibus

Cela se sert de pain qu'on ne fait que tirer de four et trempé dans l'esprit de vin; cet remède est bon contre la surdité qui provient d'un cerumen epaissi dans le conduit d'oreille. Du Verney.

Causa
vel Hæmopt: [illegible] Obs:
2[illegible]

Cura.
Hæmorrhag: sistunt Bolus verg, Vitriol ustus, [illegible] (ardor hoc coal.) pulveris: crepitus lupi.
Epithema sedi majoris ex aceto et [illegible] verticaliter regioni [illegible]. [illegible] applicatur testiculo distal [illegible]. Buc. 405.
Aq: Rosia styptica. Roi [illegible] exhibita.
[illegible] rosa rub. sang: drac: terr: sig: [illegible] [illegible] ℥j [illegible] ℥ß [illegible] et [illegible] alb: ov: [illegible] in naribus [illegible] [illegible]. Alexis.
1° Lenius. ℞ alum: rup. dr. j. aq. stillat. plantag. ℥j. M. [illegible] [illegible] ingestis applicat. [illegible] cavo narium.
2° Fortius. ℞ sacch. sat. dr. j. aq. stillat. Ros. ℥j. M. in eosd. usus.
3° Fortissimum. ℞ [illegible] comm. dr. j. aq. stillat. Rosar. dr. vj. M. simili in usus. Boerh.
[illegible]

ad modum dissimilis.

Cura. fit vascula minimenta terentiasut et ipsam Poly= pi substantiam restringendo medt: 1° ℥x cort: granat. Juth: lap: hæmatit: gr: sumach, squamis æris, Litharg: cum pauco vitriol. 2°. fortioribus ex ☿ præcip: cum melle. ℞ ex butyro antim: quod cum candela per canalem versus polypum intrudant. ℞ aq. cum ☿ fuscum. cortex ℞ cort. granator. cum sabin: pulv: ℞ ♀ vitriol. ærug: alum: mellis, āā q. s. M. f. cum aceto Ung. molle. ruck.

Aq. Calcis, quâ sæpius lavabat Polypum, et absque ullo alio re= medio felicissime tollit. Ruck.

Cura. ℞ a veneris flor: poly: in calx tan. Chym. Cap. Cock. inhalando (snuffing up) assumpta. Est etiam vomitivum momentaneum. ℞ Boerh. chem: 309. ℞ Zymo. p. 44.

Cap: 24tum.

De Aphthis.

Quamvis plerumque aliorum morborum sint symtomata, à depositione et stagnatione humoris acris et erosi circa fauces et linguā, quæ exinde ulcusculis dolentibus, ardores et insomnia causantibus, obsessæ sunt, tamen ad minimum eorum cura externa hic tractari potest, cum paucissimis internis laxantibus, si aliæ sit dura.

Cura fit 1°. Mell: rosac: ℞ Syr: granat: ℞ Rubi Idæi, ℞ Cydon: cum pauco alum: ℞ gutt. aliquot sp: vitriol: ℞ cum pauco Ung: Ægypt: 2°. Colyrio Lanfranci, ex vini alb. aq: ros: plantag: āā ℥iv. Auripig: æruginis, Myrrh: et aloes, āā gr: X. quod etiam maxime in Aphthis et ulceribus à lue venerea prodest, quamvis dec: Sarsp: cum Mair: et sem: Cydon: multo potentius sit. Si sint à ☿io, prognostica quo magis Aphtha à colore rubro et albicante recedunt eo magis periculosæ: adeoque si nigræ et crustosæ sint, mortem minantur. Vitriolum et alum: in aqua dolenta; sed saliva non deglutienda præterlim in aq. vitrioli.

Cura. mucil. sem. psyll. et Cydon. Dec. hord. ex ipsula et Syr: Rub. Idæi et dulc. Hamil. Syr. papav. q. v. sacch. quantum sufficit: per se potest. Lingat lapio. Sapalli... Act. Hafn. vol. 4. p. 49.

Cap: 25tum.

De Relaxatione Uvulæ et Raucedine

Cum Uvulæ Relaxatio sit Catarhus partis in fibris musculorum perislaphilior et gland: Uvulæ, ob humores viscosos et salivos, cum rubedine, dolore, difficultate deglutiendi, et perceptione soli in faucibus. cum abstr. flamma est procedit.

vomit. ℞ Sal. Ol. ℥ß Oxym. scill. ℥ß. aq. C.B. ℥iij M. ℞

Cura fit 1°. Gargarist: astringentibus simul imbibentibus, ex rosis, centinod: fol: quercei, ulmi, rad: torment: bistort: fl: balaust: bolo, creta, et sim. cum pauco alum: 2°. Tangendo Uvulam cum ali quo exsiccatore pulv: 3°. Ung: plantag: cum lap: rubrica, ℞ lap: hæmatit: 4°. Retractione capillorum in vertice summo, ob eorundem communicationem cum cute, cutis cum pericranio, pericranii cum meningibus, et horum cum musc: perislaphilinis.

Cura. vapor: ex sp: vini, ℞ sp: ... cavitas in adm...

Si

ZZ, [illegible]

i: Relaxa~ sit à pilulis [illegible], rubr: purett: [illegible]

lib. 1. c. 12.
lib. 2. c. 1.

& Sinapi, multu[m] prosunt: sed pro caloris videat[ur] Catarrhus & calido & frigido, ut et Angina Notha, cu[m] eju[s] sola sit gradu[s]; qui= bu[s] tamen non proficientibu[s], tangatu[r] aq: fuo[r]amala, imo et aq: forti, et si nigrescat & putrescat, aut intensitiis sit, aut in a= cutu[m] turbinem, mollem laxatu[m] abeat, & acro [illegible]: more can= crorum tumeat, tunc Chirurgia tractanda venit. vide Angina.

Pro Raucedine vide Tussim contumacem et convul= sivam, lib. 2. c. 6. Rx. pulv: ʒvi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mucilago sem. psyll. et Cydon. aq. [illegible] extracta Glyc: Rub. [illegible] Glycyrrhizae Lovanii. edulcorata.

Lib: 2us.

De morbis Pectoris.

Cap. 1mum.

De Angina, Pleuritide, et Peripneumonia.

[illegible] omnis [illegible] [illegible] & Boer:

Cum hi tres morbi sola respectu loci affecti, non vero causa differant, sic 1o. Angina est inflammatio Laryngis et Pharyngis, cum calore, dolore, rubore, tensione, dyspnoea ingenti

& [illegible] in Bl.

(ob angustiam Laryngis inflammati) Ranulæ intumescentia, lin= qua tumore tanto, ut canum more extra [illegible] liquidorum potius quam so= lidorum deglutiendi difficultate, et aliquando omnis [illegible] [illegible] [illegible] ore hiante motu strangulatus, faciei et colli rubore et tumore, et denique cum febre. 2o. Pleuritis est inflammatio pleuræ~ [illegible] vera & spuria, prout materia stagnans major & minor

[illegible] [illegible] dila=

acrimonia prædita sit, & prout musc: externos magis & minus afficit, & in superiore, & inferiore, & anticâ & posticâ, & medi= â ejus parte, cum omnibus prædictis signis, exceptis iis quæ os & linguam peculiariter respiciunt, ut et decubitu faciliori in la= tus affectum quam non affectum, quia pulmo in pleuriticis et peri= pneumonicis fere semper lateri affecto adhæret, quam [illegible] expectoratio [illegible] in pleuriti= [illegible] via aliter explicari potest [illegible] [illegible] Peripneumoni= cis [illegible] os, prius [illegible] Empyici evadunt; 3o. Peripneumonia [illegible] in [illegible] inflammatio membranæ [illegible] pulmonum, cum iisdem in [illegible] de symptomatibus, sed mitioribus (quia pulmones obtusi sunt [illegible]) ut et sputo sanguinolento et tussi & sicca, & ma= & humida, quæ bona portendit. [illegible] [illegible] [illegible]. Bibl. 21.

Ejus signa sunt [illegible] calor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] spiratio difficilis [illegible] et pulsu duro.

i. e. antequam [illegible] rumpatur in pectoris ca= vitate.

Causa.

Causæ sunt 1o. subita post æstus refrigeratio & potatio fri=

frigida poros subito constringendo 2º sang: vel seri extravasatio ob plethoram vel nimis molis, vel accidentalem laesionem in istis partibus. 3º Evacuationes sang: suppressae et vasa nimis distendentes. 4º Lympha nimis viscida ob imperfectam in ventric: chyli comminutionem quae circulationem aegre absolvit. 5º Vocif[e]ratio nimia post liberalem potationem (quia iste motu nimis movetur sanguis. 6º scabies et similia rebus repulsa (quia nimiam acredinem sanguini suppeditant). 7º Dysenteria et Diarrhaea suppressa. 8º Terrores, praecipue in tempore vel Evacuationis solitarys vel criticarum (quia ab iis subito supprimuntur). 9º Australis aeris constitutio, pluviaeque tempestas. Nullam hic mentionem facimus acidi ... ab Ethmullero decantati, ex praedictis omnes ejus causae ... hujus suspicione sufficiant, quamvis non negamus acida opola haec mala posse producere, uti etiam faciunt salia volatilia nimis usurpata: aciditas non causa, sed effectus stagnationis; alcalia et ab eo, et a novis ad usum perficiendam exhibentes.

Cura Anginae. Vide excerpta ... p. 24.

... in Angina fit 1º V. S. in brachio lateris sani vel in pede si inflammatio sit in utroque latere, eaque repetitas praesertim in angina illa in qua nullus apparet tumor; V. S. enim in Raninis vix est admittenda saltem prima vice, eo quod majorem suffocationem ... inferat vel ad minimum, quod sang: sic eliciendus sit nimis paucus. 2º Vesicat: amplo nuchae. Cucurbitulis etiam ibi ubi oblineas (Oxymelli de ... colli ...) ... dem, ut et ... et mento. 3º Clysteres (quia purgantes in morbis acutis non valde tuta sunt, nisi in principio vel declinatione, ob augmentationem molis sang:) 4º purg: laxante ex pastulis lem: tamar: et Senna vel ex Elect: lenit: ex cryst: tart: aliisque in cap. 10. l. 1. exhibendo semper pandeorieum vel Emulsionem, post finitam purgationem. 5º Cataplasm: ex albo Graec ex melle, vel Empl: Galeni ex a. b. ovorum ex nitro, alum: vitr: usto; vel nido hirundinum ex lacte, vel dec: ... vel millefolii, vel fl: sambuci, vel Ung. ex polygonat: digitat: ... et ... tali. 6º Gargaris. aliisque in inflammationibus ... et ... : ... ad ℥ 50, 60, ... patiens.

Experientia contraria: ... nimis ... si obtinuit: et inflam. tantum occupat amygdalas ou les ... aperiendae sunt lanceola lino ... et ori introducta. Charr. de la Bronchotomie. Nitrata ... humidi ... assidue hausti ... Boer.

... 2º in ... fit 1º iisdem, 2º infusione stercoris equi non castrati vel mulis vel porcelli in vino albo vel cerevisia vel aq. Card. b. ... 3º ... bis vel ter in die. 4º pulv: ex mandibula Lucii piscis ... ana ℥ ij ... et bibatur calido ...

Haec causa magis com[munis].

6º Feminis et Languidis accidens.

v. Bi. n. p. 517.

Lucij pilus, donle apri, proasso Equus et spr: Coeli, cy syr: de althaea 5o. et Lini et amygd: dulc: in salis magna quantitate interne. 6o. sacculis ex hordeo germinante consuto, cy flo: chamaemeli et sale. 7o. empl: de cumino aut sulphure. 8o. Mixt: ex aq: scabios: Card: B: tussilag: cy camph: sal: prun: sach: sat: et ska opij. 9o. sudoriferus ex ijsdem aq: cy antim: diaph. Bez: Minde: et Theriaca pauco. 10: amphora et omnia ex ea pro scrobis habentis, praecipue si pueris...

Cura 3o. in Peripneumonia fit ijsdem, sed ijs non proficientibus, ad maturationem deveniendum est, de qua postea in Phthysi; sed plerumque in Angina ulceris ruptionem promovere cogimur, digitis, penna, oleo illitis in fauces intrusis, fistulo vero, ope fili reducendo.

Obs: Media inter praedicta quae particulis subtilibus sunt praedita, praecipue conferre in Angina spuria, ubi tentor, humor aliquis pituitosus culpandus venit, ubi etiam Vomit: non parum prosunt; quod etiam de pleurit: dicendum.

Cap: 4o.

De Haemoptoe.

Dec. pervinc. mill. mag. fer. etc.

Est vasorum anastomosis, Rexis, Diabrosis, a sang: copioso, impetuoso, acri, ab ictu, vociferatione, aliisque in praedicto Cap: cum sang: ebullitione, dolore thoracis gravativo aliisque pleuritidis symptomatis, quod sero semper Empyema minatur, nisi in puellis viris coquitur, et devenitur sang: balsamici et dulcis.

Cura fit 1o. et 2o. Cyst: et pura: laxante. 3o. Oxycrato ut in Haemor: narium. 4o. Lohoch cons: ex gum: tragac: Arab: Amylo, bolo, sang: drac: sacch: sat: sal: prun: sem: rosae: et Lim: cy conserva ros: et syr: de symphyto. 5o. potu ex rad: consolid: et alth: cy glycyr: 6o. Mixt: ex praedictis aliisque in Haemor: Nariu, cavendo interea nimiam astrictionem, ne Maras ma inducatur. In caeteris procedendum ut in Cas: ...

Cap: 5us.

De Phthisi seu Tabe.

Est Ulcus pulmonum, alicuius partis nobilis, cy sputo nunc sanguinolento, nunc purulento, nunc aquoso febricula praesertim...

...ris floren: rad: ... rad: ... ingel: ... scabios: marub: alb: pulmonar: ...

Marginalia:

remedio pouvd... ex rad: ... scabios: tussilag: ... calidg ...

Species aquor... exhibito ... in scrofulis ...

Angina notha ut et pleurit: Spuria.

Chumg ab aq. ... Dec. Vinc. pervinc. ... Cura: ... Bolo et ... Ball: Samarit: ...

Cort: ... officacios. ... 70. Dec: ex ... sapall: et ... gono in ... lis et aq: ... qualis: mane ... p. 14 dies. ... vero fumatur ... Cap: Rubr: ... idem spalip (com) paris.

à cibo, tussi siccâ et vulpinâ, et exlabescentiâ quotidianâ, ex 1º ob Luem Vener: (in quo capilli defluunt ob acredinem puris) ex 2º ob contagia, consanguineos solummodo afficiens. 3º ob Catarrhi serinum pravis, pulmones corrodentem. 4º ob morbillos, variolas, pleuritidem et Peripneumoniam pravios. 5º ob fumi carbonis, auram aerem, et metallorum fusiones, evaporationes calcis in domo recens exstructa et sim. 6º ob suppressionem solitarum et necessariarum evacuationum, utpote menstruorum, Lochiorum, et sim: 7º ob gravia animi pathemata, qualia sunt moeror, Ira, tristitia, et sim. 8º ob exercitii debiti neglectum. 9º ob studia nocturna, vigilias longas, et somnum diurnum statim à pastu. 10º ob aerem densum et paludosum. 11º ob lapides cretaceos in pulm: repertos. 12º ob pectoris malam conformationem. 13º ob potus et cibi intempestivè ingurgitationem. 14º ob sedentariam vitam. praecipuè in Scorbuticis à frigore, praesertim ... mixturâ sang: praecisè ... potius nimiam ingurgitationem. In quibus omnibus casibus, nisi praeveniantur, adsunt febricula, dolor scapularum, Dorsi, brachii, oris, ... etiam ad calcem usque; ardent genae et lingua, sitis vexat, ... praesertim manè, sputum fit aliàs dulce, aliàs salsum, aliàs acidum, aliàs purulentum (sed in carbones conjectum grave olet, et in aq: descendit, quod non facit pituita) ... omnes sapores mutat; aliquando tremunt, rigent, et horrent (ob acredinem puris per vices membranas vellicantem) aliquando Urina ... ob pinguedinem abrasam, aliquando pus ex Urina mi... ... sine ulla exulceratione renum aut vesicae; aliquando tussis ab... est, et quod pulmo non sit pars affecta, et quod insensibilis facta ... quit ... tunicâ et Schyrrosa, et coriacea evadente, quo in casu nequit fieri Empyema, quia pus nequit exedere tunicam; aliquando portio pulm: excreuntur; aliquando subitò pereunt ob rupturam ... et suffocationem à pure; aliquando febricula est conti... ... quam ... non sentiunt, quia ei diu assueti sunt; aliquando ungues in digitis curvantur et ... et costarum extremitates ... facies interdum Hippocratica apparente.

Cura in initio fit ut in Peripneumonia et pleuritide; sed si ulcus jam adsit, nec V. S. nec purg: nec diaeta tenuis, nec Caustica, nec Vomit: sunt approbanda, sed omnia acrimoniam involventia:
Equitatio. Antiscorb: mitiora, Amara, Dec: Lignorum, Balsam: mitiora, in initio ... [illegible]

Cauto.
...dram calido ... pip: alb: ... 3. ut ... pulo: pip: alb: ʒiij. Bals: ... laud: Liq: gtt. 40. Extr: Gent: q. s. f. massa pro pil. 30. Dos. ij manè et nocte super: bibendo Cochl. 6. vin: Chalyb: ex aromat: parat. et plura p. 53, etc.

etiam ob fluxionem humoris ... ex gland: ... ... cujus cura in initio fit sumendo sternutamentorio. Etiam ... Chlorosim ... Ulcera interna et externa, ... variolas, Hydrop: Dysenteriam, etc. In quibus omnibus casibus ... nisi ... fit à dest... humoris à capite ad ... est primaria. Bagl. l. 2. c. 9. §. 1. ... Calc. viv. ... aq. font. ... post ... filtra Dos. ʒiij ... in die ... Chambers.

Cura ...

lia. ut pulv: had: ex gum: tragac: arab: amyl: sem: pap: alb. sacch: penid: mucil: rad: alth: ℥ ij pulpa, ex Dec: ex buonia, sanicula violis, symphyto, &c. ℞ Emulsione, ℞ anulochus potery. ℞ jusula glutino sa ex animalis extremitatibus, ℞ Lac vaccinum asinina, ℞ caprinas cum sacch: ros. Lac praecipuum remedium, et quaeso ℞ Bagl. 225. [illegible] mutatis [illegible]. In omnibus [illegible] interpon: Bals: lucat: et Bals. [illegible] sola opt.

[illegible] si ventriculus induratus viscosa sit [illegible], ex appetitu dejecto, inflatio ventric: et ructibus dignoscitur, vel si fecetio Maxt. sang: culpanda sit. utiliter possunt vomit: exhiberi, ut et purgat: praecipue succus fraos vulg: ad ℥j ut et dec: amara et antiscorb: ut et liq: sudorif: ℞ pectoralibus mista; sed haec omnia ante appareant utcunque, aliter ab iis, pus acrius evadit. ℥ij syr: de rico nigro mane jejunus etc. exercitio. compositionem vide in ℥j [illegible] p. 43.

Cap. 4.

De Asthmate.

Asthma Idiopathicum est difficilis respiratio ob vitia aliud pulmonis; ℞ rei alicujus in iis contenta, ob quam aer aegre fodere cogitur.

Causae sunt 1o. succi crassi et mucilaginosi in Bronchiis haerentes et ingressu aeri denegantes. 2o. pulmonis tumor, ℞ marasmus, seu scirrhus, inflammatio, oedema, colliquationes, tuberc: et [illegible] 3o. [illegible] Carbunculi. 3o. phthisis pulm: provida pus. 4o. vulg vehemens 5o. Evacuatio suppressa mensis ℞ haemorroid. 6o. nutritio pulmonis laesa. 7o. animi terrores subiti. 8o. Cachexia a sang: vitiato, prolapsa chyli adventi crudi. 9o. Aneurisma Art: pulm: ℞ glandulae bronchialis induratio, ut et ipsius tracheae, quae in aliquibus ossea evadit. 10o. calculi in Bronchiis. 11o. [illegible]: musculorum nervorum respiratoriorum a frigore, quae causa est maxime attendenda, quamvis ab Authoribus neglecta sit. uno verbo. quaecunque sive liquida, sive solida efficiunt ut sang: aut tardius ℞ pulm: transeat nempe ℞ canales constringendo, ℞ sang: incrassando, ℞ motu sp: animalis impediendo, ne elevationem pectoris moliantur aut ut sang: fiat rarior, aut copia major, ita ut illi irruenti non sufficiant pulmonis cavitates. haec omnia Asthma producunt.

Obs: Nullam in praedictis mentionem fecimus crassi illius mali in aliquorum ventriculis haerentis. tanquam ad tumultum pro causa Asthm: decantata, ut ad Asthma sympathicum lanis pertineat; nisi enim ℞ laesa et sanguinea in pulm: propellatur, nunquam ℞ Stertorem [illegible] pulm: infarctis ℞ non satis dilatatis ortus

---

Marginalia:

[illegible] rad. et Dec: ex rad. Consolida: et Dec. Consolida pro potu ordinario

opt. [illegible] [illegible] incisi: [illegible] ℥ myrr: pulv: ℥j croc: [illegible] m. ℥ß [illegible] ℥j [illegible]: opiat in aq. theriac: dissolut: gr. vi [illegible] ungu in ℞ potu. In ulceribus omnibus internis in quibuscunque partibus Bals: Lucat: et Bals. [illegible] sola optime.

℞ obs:

Causae

[illegible] caus.

omnia incidentia et attenuantia sine calore, ut acida, [illegible] vol: spirit. acida, [illegible] nitri praeparata, &c. &c. omnia pectoralia calida vitanda. amara et [illegible] cum acidis. ℞ Floyer.

Asthma siccum Willis. ℞ Bibl. p. 7.

vesicatoria, fontanella inter scapulas. Hamil. 174.

℥j rad. [illegible] coq. ad pulpam [illegible] add. Mell. depum. ℥iij coq. cum vin. alb. Gall. q. s. ut f. Elect. vel [illegible]. in Tussi humorali viscosa.

orbyre asthma periculosum inducerel; quaecunque enim de causa turgescerel, inflarel, aut distenderel ventriculus, et diaphragmatis motus deorsum impediret, non in tantum fieret ac per cibos et potus copiose assumptos.

Obs: 2a Asthmata alia sympathica fiunt vel a pectoris vel abdominis hydrope, tympanitide, vel aliis quibuscunque eorum affectibus, ut pleurae, Mediastini, Diaphrag: Ventric: Jecoris, Lienis, Uteri, &c.

Cura fit 1o. V.S. quae tempore paroxysmus imminuit, donec de si asthma subito invaserit, aliis auxiliis inspiciatur, et in plethora et evacuatione aliqua sola supprossa saepissime morbus prorsus tollit. 2o. Vomit: (quod convulsiones corporis, etiam ex pulmonibus derivent, ut videmus derivari circa glandulas, in oculos, nares, fauces, vel ex vin: Emet: vel fol: Nicotian: ℥ß coctis in aq: ℥vi. ad ℥iij, cujus dimidium saccharo temperatum caro propinetur, et expectetur vomitus, qui si non superveniet quod superest assumatur, non neglecto sero lactis, vel aq: tepida, vel cerevisia admodum tenui, vel posseto, ad facilitandum vomitum. 3o. post vomitionem, (vel ea omissa si aegri vires non respondeant) extra paroxysmus purgatio est instituenda per succum rad: Iridos nostr: vel Ebuli, vel pil: ex gum: ammon: Diagr: resin: Jallap: āā gr: 5. 4o. In et extra parox: Infusio mellis: in vino, vel gum: amon: cum fl: Benz: vel sale aliquo vol: 5o. sper: Ceti ℥ß bis terve in die, quod sola V.S. cedit 6o. Apoz: Ecligmatis, &c. ex Rolen: tussilag. hyssop: liquiril: Marrub. (et in casu cachexiae) Brion: Iride, aro, guajac: sarsap: sassafr: in magna quantitate. 7o. Dec: Sterc: Equi cum ejusdem. 8o. Mixt: Willisii. ex vinaterale. ... Spi: Sl: Sulph: ℥ij, sal: vol: succ: et C.C. āā ℥ij. quod simul in digestione 24 horas ante usum sint. 10o. Gram[m]on: gutt. ass. ... Balsam: ... āā ℥ß. sal: vol: C.C. ℥j. ... pil: ℥ij. ... Syr: tussil. ... āā ℥j. ol: amygd. d. ... rad: ... ℥j. ... ℥ij. rad. ... g.j. ...

Cap: 5um.

De Empyemate. ... Chirurg. & la Charriere

Est collectio puris generaliter in qualibet parte, specialiter in pectore; vel 1o. a sang: in pectoris cavitatem effuso, vel 2o. abscesso rupto, cum respiratione difficili, aliisque in pleuritide confirmata.

Obs: Lateris affectum cognosci vel a fluctuatione in eo audita, vel ab aliqua ejus parte tumida apparente, vel ab ejus calore tanto, ut sentiat...

℞ Jujub: sebest: ficus, uv. passul: Dactylorum: ... nal: āā ℔ß. gram: canin: hopat: Hyssop: fol: et fl: tussilag: et scolopend: āā m j. herb: capillar: āā m j. liquiril: ℥iv. sacchar: ℔iij. f. syr: et utatur saepe.

Cura.

Omnia emoll: profunt, ut Dec: Rad: malv: hau: ... Syr. de ... hydromel: mane ... octo dies; qui si non satis prodest, ei adde Sp: Nicotian. gtt. v. ... Bals: Tolut: āā ℥j ... lap: ... myrr: ... Bals. ... Dos. 4 pil. mane jejunans, et vespere ... cum aq: hyssop: cum sach: dulcorata. ... cum vino ... Infusio flor: ... Syr: tussilag. et hyssop: āā ℥j. ... collectio ... gra sunt respiratio difficilis, anxietas, febris, gravitas in pectore, tussis sicca et molesta, febris continua a post sumptos cibos ... sicca et ...

[illegible] madida [illegible] qm [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ~~[illegible]~~ pondere et septo,
& qd dambis in illud [illegible], in oppositz verò molestissi [illegible] & Pharr. 153, 154.

[margin:] ... regravescente, sudore copioso, somno interrupto, appetitu prostrato, corporis emaciatio, &c. Cura Nuck. eadem adsunt signa in Pectoris Hydrope, quibus accedit aquæ fluctuatio. id. ib.

Cura est eadem ex illa Hæmoptoes et Phthisis, præcipue dec: et Bugula, Sanic: consolid: et sim. vulnerariis dictis. aq. Calc. vel aq. Bened. B. opt. Dos. ℥iij vel iv. ter de die.

[margin:] De aliis generibus p Obs. ibid.

Cap: 67.

De Tussi contumaci et Convulsiva, seu Vulpina, Chink-Cough dicta.

Ex hactenus de Tussi sicca (in Catarrho calido ut et symptomate Phthisis) et de tussi humida in Catarrho frig: sed speciatim in Asthmate tractaverimus, idcirco quædam tantum de ustani de Convulsiva dicenda, quæ p intervalla nunc longiora, nunc breviora, ægros, præsertim juniores, ferociter invadit, ex tussiculâ admodum siccâ p minutum unum & alterum durante, et ejusdem nunc uno, nunc pluribus (ex inspiratione inter singulos satis forti, longâ et sonum edente) recursibus, ut et ex faciei maximo rubore et intumescentia, lachrymarum ex oculis, ut et muci ex naribus, expressione, &c; ægro tamen inter paroxysmos satis bene sese habente.

[margin:] Causa

Causa immediata est convulsio in musc: expirationi inservientibus, specialim abdominis (eodem modo ut singultus fit à musc: inspirationi inservientibus, specialim Diaphrag:) & à mâ acri in vesicis pulmonum, aut in [illegible] (ubi fit post subitam refrigerationem) easque vellicante, & ab eadem p nervos ex capite fluente.

[margin:] Splenetici imlabile [illegible] — mucilago [illegible] valet: coct: in lacte [illegible] addito saccharo. Cura. præ omnibus Muzres exenterati de tracti ut de vino [illegible], deterso & exsiccati in clibano donec pulverisari possint, de eo ℈j & ℈j in haustu [illegible] hum: mane, ejaculando, et [illegible] ingestu. — Etiam panis tostus ex butyro et melle pro infantulo. Mayor.

Cura fit omnibus acrimoniam lenientibus, ut et Antispasmodicis, non viscosis, ne obstructiones confirmentur, ut 1º. O.G. in jugulo & brachio. si vires ferant. 2º. mixt: ex aq. hyssop: fl. benzoini pulv: de Guttetta in satis magna quantitate, syr: (& gum: ammon:) pulv: de Guttetta in satis magna quantitate, syr: de hyssopo, et sp: C.C. 3º. spr: Cale ter in die. 4º. pulv: ex Muls piscium ℈j. cum gr iij. sp. c.c. ex Saca. sæpissime. 5º. Vesicat: Nuchæ. 6º. ung: solari et rad: Allii contus: ℥iv. axung: porc: ℥viij. coctis ad succi consumptionem, et expressis, quibus adde croci pulv: ℈ij. sp: salis ℥ij, pro plantis infantis inungendis. 7º. Empl: pro sutur: coron: ut cerebri et principia nervorum corroborantia, & Empl: ex Theriac: qd etiam cordi, imo et abdomini applicari potest. 8º. Aq: Tussi: in saccharo candi. Quibus omnibus parum levaminis adferentibus, ad syr: Nicotianæ, & Vin: Emetic: exhibendum singulis fere diebus. Dosis sit ad vomendum bis tantum, & ter ad maximum. (Hæc in [illegible] hodierna primum locum tenent, non ultimum. X)

[margin:] Cochlear: succi pulosii, optimum remedium. Bl: syr: et [illegible] coct: [illegible].

[margin:] & Observ.

[margin, right:] Hoff.

℞ Syr. Violar:
— Tussilag:
— Ros. solutiv: aa ℥ß.
— Papav. rubr. — ℥j.
℥j.
Sp: vitriol. — gtt XX.
Aq: Hyssopi q. s. ut
repleatur phiala.

℞ Myrr. pulv. ʒij.
Croc. — ℈ß
N. M. — ℈ß
Mellis — ℥ij
Laud. opiat. in
aq. Theriac.
dissol. — gr. VI.
M. f. Elect.

Tussis Convulsiva

℞ Fol: violar.
— Pulmonar:
Musci Quercin. ā M ij.
— pixidat. Unc. ß.
coq. in. s. q. aq. ad ℔ j.
Exhib. ante & post paroxys.
Opt. Nick. Scott.

vel coq. cum Melle & saccharo ad syrup.

addi potest pulv. de Gutteta.

addi etiam possunt Flores violar.

Tusses.

℞ syr. viol.
— tussilag
— pap. errat. ana ʒß.
pulv. Glycyrr. ʒij
opij purifs. sicc
& pulv. — gr. ij.
M.

℞ oxymell. squill. ʒj.
Bals. sulph. tereb. ʒj.
M

℞ Mell. comm. ℥iv.
pulv. rad. Glycyrr.
— ireos Flor
— Heleny
Flor. sulph. — ana ʒiij
M & cum aq. Hyss.
ad consistent. mell. reducat.
add. parum opij.

Lait tiré de l'avoine, de la scorzonere, & du chervi, a été toujours regardé comme le plus excellent lenitif contre les douleurs violentes. Boerhaave Atrocis Morbi historia, Leid. 1724. Bibl. Raisonnée Tom. 1. p. 189.

... pro ℥j. Rx. ʒj ... ℈j ... fig. ...
... ficati.
... vini absynthij. Colocynth. ... sp. vini ℥j. ... in infusione.

In aq. sp. vini consideratur ut simplex aqua, et si velis aq. duplo fortiorem duplex sp. vini et extrahe dimidium; si aqua forte adest tantum aq. ac sp. vini extrahe quantitatem sp. vini inditi.

Omnes flores ad syrupum conficiendum macerari debent in aq. tepida — flo. volat. ℥j flor. ad ℥ij aq. / flor. non volat. ℥j ad ℥iij ad iv aq.

Nott. 1. uno eodemque modo non operantur.
Nott. 2. Mutuam opera non impediant.
Nott. 3. Attenuantia et incrassantia.
Nott. 4. ... Tragacanthi in ... sicca, vitiosa est, ... ex attenuantibus misceri non
Nott. 7. acida ex pectoralibus ... solventibus et ... quorum vini ...
Nott. 8. Acida et salina ...

Elect. purg. ex Senna. Dos. debet esse quantitas in qua continetur ʒß ad ℈ij Senna.
Elect. ex Diagrid. Dos. in qua gr. xij ordinarie continentur. — Elect. cholagogon.
Con. dia ... Dos. in qua continetur ʒj purgantium, i.e. ʒß Electuarij. ʒß

Pil. de Agarico, et similia purgantia, quia multum in sua ... habent, non utuntur ... enim diutius in intestinis morantur quam volueris ..., immo ... morantur ad dysenteriam excitandam. Sed si utatur Agaricus addi debet aliquid ... in ...
In pil. opiatis gr. j. tantum debet ingredi dosin pilularum; et largior ... non debet quam ... compositionem ... gr. j. opij.

Pil. de duobus, et pil. Weddern. stomachicae sunt, sed posteriores meliores ...
Pil. Rudij. optimae.

Trochisci, ut de Agarico fieri debent ex aliquo liquido, ut gr. arab. tragacanth. in aq. soluta, ut post exsiccationem et evaporationem, ~~...~~ et aromat. suum valorem amittant.
Pilul. massa fieri debent ex liquido aliquo, ut gr. arab. tragac. in aq. ..., ut post evaporationem illorum massa in pulv. ...

Trochisci de Carabe ... collingens.
et in propriis locis in Reg. compos. Medicorum.

gr. iij ad iv ℥ d. ... purg. ... nil ... ... post ... ℥ d. enim ... ... purg. ... bilibus ... ... cunt post ...

Dec. in olla aperta, Apozema in olla clausa ad usum internum.
Epithema est applicatio externa cordi.
Apophlegmatizans. liquidum et solidum quod salivam in ore movet.
Gargarisma, a gargareon uvula.
... liq. ... nutrimentum.
Oxyrrhodinum ex aq. ros. et aceto, et applicatur fronti et capiti.
Pessaria ... perforato et oleo, ... oblinita ... valvam ... ex ...
...

arrêter toute sorte d'hémorragie, il n'y a [illegible]
[illegible]; que de faire bouillir des toiles d'araignées dans le meilleur
vinaigre; et d'en faire ensuite une Cataplasme sur les parties d'où
sang s'écoule. Rhotmans observ. (Tela aranearum farina aspersa
ut in molis et pistrinis, etiam opt.) Il dit qu'il a souvent
[illegible] des malades travaillez de la gravelle, et de la pierre, en leur
donnant à boire une drachme de verre commun, réduit en poudre
[illegible] subtile, dans 3 ou 4 onces d'eau rose. id. Memoires des Arts &c.

Nott: Me vidisse Tussim per duos dies sine ullo intervallo, nisi eo ad inspirationem necessario, sine ulla expectoratione, durantem, quam mixtura sola, sine ullo alio remedio, ex aq: Hyss: Diascord: Laud: Syr: pap: et musco pixid: in satis magna quantitate, fugavi.

Appendix.

Nott: Omnes huc usque recensitos in pectore morbos tantam inter se relationem habere, ut nunc hic, nunc ille, alterius, et vice versa, ille alter sit illorum nunc causa, nunc effectus; adeo ut ad ullius in pectore morbi per curationem per cognitionem, intima et perfecta omnis requiratur cognitio. Sic Haemoptoes, pleuritis, Peripneumonia et Tussis sicca non saepius phthisin antecedunt, quam eam sequuntur.

Cap: 7mus.

De Palpitatione Cordis.

Est inordinatus cordis arteriarumque motus, levi excandescentia saepe recurrens, cum motu in sinistro latere, non solummodo tactu perceptibili, sed etiam aliquando audibili, cum difficultate respirandi. et pulsu aliquali intermissione. Effectus semper provenit ab impressione aliqua circa cor.

Causa est omne illud quod cor et arterias convellere valet, ita ut in iis per fiat motus contrarius, per dilatatio insolitas quale est 1o. serum pericardii nimis salsum vel acidum. 2o. abscessus in corde per in pericardio. 3o. Hydatides, sang: grumosus, polypi, aneurysmata, tartareta, vermes, crines. Mucus, et ossificatio cordis per arteriis. 4o. Aortae et art: coron: petrificatio et ossificatio. 5o. Crassities, aciditas, per fixitas sang: nimias, ut in Cachexias scorbuto. etc. 6o. fermentum aliquod acre et viscosum e latibulo aliquo erumpens. Quae omnia per lancinationem, per obstructionem in causa esse possunt. ut per sang: inordinate à corde pellatur, per in arterias tempore debito non recipiatur. unde syncope saepius infestatur per saltem in eam inclinatio. Sic plurimi dantur qui à piscibus per lacte dulci cum sach: palpitationes patiuntur.

Cura fit 1o. V. S. per impedita per in haemorroid. sive in pleth: sive cacochymia (obvientis oppressas quam consumptas). 2o. Mixt: potentiss: ex aq: Hyss: et: benz: bals: sulph: anis: cum Syr: de hyss: etc. 3o. Epith: ex ess: et: theriacali. 4o. pulv: Rhapontici veri ad ℈ij in vino bis per die. 5o. Elect: ex pulv: testaceis crassitiem attenuanti per pulv: ista zedoar: bezoar et aromat: cum moscho et ambragris: si non sit foemina. 6o. Lino mod=

Marginalia:

Jul: ex se: quatern: flor: viol: pulmon: a mij. coq. in s. q. aq. ad ℔j. exhib. ante et post paroxysm: per coquum sacch. et syrupus cum pulv: de Guttetâ.

vid. Actuar. l. 4. c. 7. & Friend. loco infra citato.

Causa.

per Bagl. 229.

Causa vera.

Cura.

V. S. et purgatio. Friend's Hist. Phys. 267. etc.

Rhab: in vini [illegible]

medicamenta mox in usum trahantur ex cardiacis et pectoralibus praecipue si palpitatio sit continua et rad: Angel: gentian galang: Zedoar: Imperat: Valer: Sulph: Bacc: Lauri et Sassafr: in satis magna quantitate. Quibus, si vis, addantur absinthium cum vel sine purgantibus, et aurantiorum et similia. Et ante omnia pulvis chalybis utur, vel Graub Chalybs condita. Glom.

vel Observ:

De Syncope.

Est praeceps virium lapsus, ex cadaveroso faciei pallore, sudore frigido: membrorum flaciditate et refrigeratione, pulsu raro, debili et imbecille, abolito, ut et motus et sensus pene ablatione.

Diagnostica sunt Facies solito pallidior et tumidior; corporis habitus squalidus (bloated) pulsus parvus, piger, Causa cum longis intervallis.

Causa est vel 1o. Sp: aut sang: dispendium. 2o. Metus et pusillanimitas (ob quae cordis orificia contrahuntur. 3o. Cordis palpitatio. praecipue lacertis in polypo, vel sang: grumoso. 4o. Odor suavissimorum in viris, vel gratissimorum in foeminis ob Sp: alterationem aliquam ab iis excitatam, vel ob disconformitatem partium odoriferarum corporis vel nervorum vel aliarum corporis partium in diversis subjectis, imo etiam visu. Sic quamplurima dantur exempla aliquorum qui visu pomi, casei, felis, etc in syncopen incidunt, ob antipathiam, ut volunt Authores, in talia contractam, forsitan ex eo quod constitutione dantur partes a parentibus derivatae, talibus operationibus non parum repugnantes, vel ex eo quod paulo post ortum injurias aliquas ab iis perpessi sunt. 5o. Sp: suffocatio a plethora. 6o. Venena vel primi generis, Sp: vel alterando vel dissipando, vel secundi generis, sang: coagulando, vel disipando, quod et etiam de cura postilentiali, ut et de Sp: per catharsis dicendum. 7o. Secessio partium sang: vel excussio humoris alicujus ex latibulo ob animi pathemata, quae fermentationes magis vel minus suffocant, vel elevatio aliqua vaporum, quae cor vel art: contrahit. 8o. Ictus, Lapsus et sim:

Antipathia. Symbolum continent ipsa filamenta, et sic eo a corpus cortis matibus semel in utero alligata, postea semper in eodem ... in quo fermenta cordis syncopalis, sympathicis, antipathicis, ... temperamentorum varietate.

Differt a suffocatione uterina, quod in hac adsint contractiones vel ventris, vel brachiorum, vel pedum, ut et etiam pulsus aliqualis fortitudo, et coloris parva vel nulla alteratio.

Vapours or Hysteric fitts.

Cura Cura in parox: fit Sp: ✳ci, C.C. assa fœtida, plumis et linteis ustis, ol: succ: Sal: apopl: pro temporibus, aliisque in morbis soporosis, et in et extra paroxysmum, et omnibus in talium morborum curatione. qui syncopen pro symptomate habent.

Syncope & Aphonia, si accidat in perfecto sanitatis statu, & sine ullâ causâ evidente, optimè curatur Venæ sectione, procedit enim ab obstructione venarum. Hippocr. de Vict. in acut. 4. 23. si accidat in Causo, sive Febri ardenti spuriâ, curatur V. S. et frictionibus. Alex. Trall. l. 12. c. 3. vid. Friend Hist. Physick, p. 90—96.

Cap. 3.

De Morbis Abdominis.

Sect. 1ma

De morbis ventriculi.

Praefatio.

Cum debita ciborum in ventr: digestio dependeat ab optima sang: temperie, et ab ejus mixtura debita, ejusq: depositionibus gastricis et salivalibus, ut et à motu tunicae musculosae ventr: (non neglectis interea consideratione ventric: tanquam debitis caloris circumstantiis et activitatis partium ipsius cibi particularis, ut et, si vis, mad. primi et tertii etiam:) Idcirco omnes ejus morbi inappetentia comitati, oriuntur 1o. ab omnibus sang: intemperiem (i.e. unius aut alterius partium generis, sive bilis, sive phlegmatis, sive seri, sive melancholici, etc in eo praedominii) causantibus. vel 2o. ab omnibus ejus mixturam turbantibus, ut à se in ventr: deponat, quae alias in eo remanerent, et circulationem absolverent. 3o. ab omnibus contractionem et impetum tunicae musculosae ventr: impedientibus, et rarefactionem liquidi nervosi et sang: frustrantibus, sive sint pinguia fibras laxando, sive viscosa, impetum eludendo et fontes obtundendo, interveniente molli et lubrica tenacitate contractionem ventr: impediendo et frustrando, sive narcotica, sang: coagulando (quod etiam de marore dicendum est) et fibras solvendo, et contra. Per Vesoriicos sang: nimis rarefaciendo, et sic dilatando arterias ut non possunt excedere sp: animales ad ventr: concoctionem requisiti, et nervos compressos; quam ob causam etiam volunt narcotica adeo obstare appetitui. Uno verbo. Per eundem, Quaecunque ventr: nimis implent, appetitus et minuunt et solvunt; et contra, quae eum evacuant, famem excitant, et vulgarem et caninam si modo intercedat contactus mutuus tunicarum ventr: impediens, quod faciunt omnia nimis purgantia aut quovis modo inanientia. Veris exacte considerantur causas praedictas, et debilis et indebilis digestionis, patebit nunc unam esse alterius causam, nunc effectum; sic vitium in gener: sang: inficit, et econtra, vitium in sang: ventriculum, ita ut decipiatur ex Vesoriico, Concoctionem et apepsiam omnem per ventr: contractionem et debilem et indebilem absolvi; non

non tamen uti velit et sang: nec in uno laudandq, nec in alio culpando sit, nisi ventr: prig affecto. Nullam hic mentionem facimq acidi ab authoribq tantopere pro causa digestionis decantati, non qd negemq eam omnis ventr: plus minusve esse, sed qd sic hic affectq inde oritq sang: fermentationis, et cibi et potq diutiq aquo in ventr: (extra pomaria circulationis) stagnationes; adeo ut acidq sit semper ventr: vitiq (non vero fermentq) sang: coagulando, et ejus rarescentiam impediendo, praecipue si acidq sit fixq, et peregrino acore infectq, ut fit in cruditate acida. Sic talentq authores acidq illud debere esse salis volatilis, alias esse noxiq: et revera non potest negari, quin multo plus actioni tunicarq ventr: in digestione (ut causae proximae) tribuendq sit, qm ullo fermento, cq alia ex-stione cur causa proxima) tribuendq sit, qm ullo fermento, cq alia ex- tione nequeat, cur partes ciborq ventr: lateribq proximae prius coquantq, et cur fiat qd ingesta laminatim dissolvantq, partibq eorq extimis primo liquescentibq, et ex ventric: elabentibq; nam fermentq mediis mistq ingestis.

Cap: 4tum.

De Ventric: cruditate acidâ.

Est affectus inappetentiâ, et ad minimq malâ digestione comitatq, in quo ructq dantq acidi, dulcia ipsa in aciditatem convertentes; aliqdo etiam tensio circa os tabiforme (ob vapores extendentes et aliqdo etiam fluctuationes (ob humidq ventr: et costarq membranas) aliqdo etiam vomitq (ob ejusdem acidi vellica tione acido commixtq) saepe etiam vomitq (ob ejusdem acidi vellica tione et si acidq austeritate praeditq sit, pallor adest faciei; ventr: etiã et abdomen versq dorsq contrahuntq (ob austeritatem vasa et fibras constringentem) Urina etiam fit alba et tenuis (ob obstructionem) filis interea abest, quia sal abest et infringitq.

Causa. Causa est et cibq et potq diutiq aquo in ventr: stagnans in acidq excrescens, et acidi à sang: in ventr: et vasa gastrica depositq uti fit in affectionibq hypochondriacis et hystericis mensiq obstructionibq, et sim. in quibq sang: non rite fermentatq et vero crass: sitiem habitationes qmplurimas, in acidq excrescentes, praecipue in Hypochondriis et Utero patitq.

Cura. Cura, fit 1o. Vec: amaro cq simplici et duplici Anna quat et saxies adhibito. 2o. pulv: nostro digestivo. ex sem. coriand: ℥i, anis:

anis: fœnic dul: Carvi, rad Zedoar: āā ℥ij: cum ol: Macis, N. M. Gariophil. āā gtt. j. cujus cum sacch: dosis ℥j bis per dies in dies, vel si vis, singulis dosibus addatur pars pulv: Jallap. 3° Species sanativa ex rad: Gentian: Galang: Zedoar: cal: arom: bac: Lauri, āā ℥j, Gariophill: cinam: rad. Angel: Croci āā ℥ß, sp: vini ℔j. cui si vis adde lig: nephritici ℥j. Diagrid: ℥ij, ut alvus sit libera; 4°. Vino et Apoz ex iisdem, ut et amaris pro potu seu ordinario. 5°. [illegible] ex [illegible] canc. oc: 69. [illegible] salibus alcalicis et opio. 6°. Conditis et conditurus ex prædictis, ut et ZZ cum menthâ. 7°. mithrid. Ther: diascord: cum sacch. et ol: macis quotidie in parvâ quantitate. 8°. Vomit: ex salo vitr: multisque aliis in affectu: Hypochond: præcipue Chalybeatis.

Dos. cochl. j. vel ij.

Cap: 2dum.

De Ventr: Cruciatu Nidorosa.

Est affectus in quo datur ructus nidorosus, ut ab ovis frixis (ob salem volat: pinguem sensim et olidis mordicatione etiam ob eundem, imò tales quæ in momento sine ullâ cognitâ intemperie, non solum sedes et vomitus, sed etiam sang: extravasatione efficiunt; sæpius etiam solent ob putredinem: anxietates etiam dantur circa ventr: ; vagitus etiam sæviter [illegible] rumpentes vexant.

Causa est indigentia crapula capis. tabacco et sim. sale prædictis; et de positione partium salinarum authoribus Bilis) vero præcipuè et autumno, sanguine tunc temporis ipsius purificantis; et secretio eorundem à sang: ob causam ejus misturam turbantem, ut in Præfatione dictum est.

Causa.

Cura fit j°: Vomit: præcipuè si nausea adsit & omni [illegible] ex Cydon: Granat. acetosâ et Tamarind: 3°. pulv: Ostrac: &c. de quibus vide Choleram.

Cura

Cap: 3tium.

De Cibi Fastidio. seu Anorexia.

Cum hic morbus nunc sit effectus nimiis. acidis cum ovis amaris, nauseâ [illegible] in præced: cap: Nunc nimis acidi, ut in Cap: 1. l. 3. S. 1. idcirco restat solum considerandum ejus causa à [illegible] viscidâ. ventr: membranas et nervos infarciente, [illegible] [illegible] influxu intercipiendo, et contactus tunicarum ventr: impediendo, et si vis, fermentis enervando effectus suos ut in Præfatione, producit.

Cura exactè fit iisdem ut in cap. 1 l. 3. S. 1. Omnia en: acidi fixi destruentia, viscositatem, et debilis fermentationes illi fere semper conjunctas, etiam superant.

Cap:

Cap. 4ᵘᵐ.

De Cardialgiâ.

Cum morbus hic p ab Acido, ut in Cap. 1. l. 3. S. 1. vel ab humoribus Salsis et biliosis, ut in 2do. orificii superius ventr: ut et diaphragm. qd terebrant, pertundunt, lancinantibus et distendentibus, cum motu suffocationis, antolitu et praecordiorum angustiâ oriatur, Cura sit exactè ut in iisdem capitibus.

Cap: 5ᵘᵐ.

De Singultu diuturno.

Obs. 1ma.

Est affectus in quo fit sonus p subitaneam aeris in Laryngem inspirationem, ob convulsionem et retractionem subitaneam diaphragm: deorsum à mâa p acri, p viscidâ, p acidâ etc pori infarcente. Ventriculus enim quoties à talibus convellitur, et vapores ex eo exeuntes sonum edrent, non tamen subitam inspirationem aeris p singultus producere.

Cura.

Cura fit ut in Cap. 1. l. 3. S. 1. si acidum, et ut in 2do. si sal praeest; sed et pars affecta sit exculpanda, idcirco remedia sint fortissima, ut 1o. Vomit: 2do. Mixt: ex aq: melissi: menth: Ether: Vent: sale Absinth: Laud: liq: et sp: ✱ci cum syr: eodem. 3o. et: macis sale Absynth: et Laud: 4o. potu aq: cois cum sp: acido p express: cum sale Absynth: et Laud: 4o. potu aq: cois cum sp: acido in causâ salinâ, aliisque uti prius.

Cap: 6ᵘᵐ.

De Diuturno Vomitu, et alio quocunque.

Quaer:

Quaer: 1o. An cibi vomuntur post singulos pastus? 2o. An vomitus est Sympathicus p idiopathicus? 3o. An ingurgitationibus p tabacci usu et sim. supervenit? 4o. An adest Lumborum dolor, qd signum est esse effectus Nephritidis. 5o. An morbus aliquem praecedit? 6o. An statis anni temporibus recurrit? 7o. An mâa ejecta sit nigra, flava rubra (ut sanguis) p quaenam?

Causa.

Causa nunc est mâa acris p viscida in tubulis ventric: haerens, nunc apostema in iis, p aliis partibus circumcirca cujus habitans, nunc apostema in iis, p aliis partibus circumcirca cujus suspicionem inducit febris lenta nunc inflammatio p scirrhus in iisdem nunc ingestorum putrescentia, nunc nervorum communicatio (ut in 4tâ Quaest.) nunc partium acrium et salinarum depositio. Nunc humoris noxii ex sang: depositio, secretio, p purificatio. (ut in 6tâ Quaest.) Nunc à causis variis (ut in 7mâ) Nunc mensium obstructio.

Cura

Quaer: Sy succ: malorum granat: aut Limonum cochl: j. sal: absynthii ʒß. M. f. haustus. ... N. M. p express. ... macis p express ... pauco Laud. opt. ... Haustus contra Vomitus ... aq. Cinam fort. syr: Limon. ãã ʒß sal. absynt: ... ol. N. M. et Caryophyll. ãã gutt. j. Laud. liq. gutt. XX. M. Expertissimum, ubi steterit ... sinistrarie sallaa ... remedium ... cum vomitu enorm. ... et acidi ... reiterando donec operetur. Rulleri Pharmac.

Vomitus curatur astring: et excretionem minuentibus, inter quas excellunt aquæ Pyrmontenses veræ vel artificiales. Vide 192.

Cura. ... um nova omni cura ... bona cura ...

Specialim ab ea Cholera et Crudilatis ventr: vel acida, vel nido-rosa dependeat; idcirco hic pauca restant dicenda de Sanguinis Vomitu, qui ab ijsdem, ut in Hæmorragia et phthisi excitatur causis, et ijsdem ex ijs gaudet remedijs, ut jo. ℥. S. in parva quantitate. Sed partitis vicibus, vulnus sæpe digitis occludendo, ut sanguis nunc fluat, nunc sistatur. Quæ cautela tam magni à multis habetur, ut Hæmorragias nullis alijs remedijs cedentes, hac sola curatas jactitent. 2º. Dec: vel succis ex Symphyto, hedera terrest. plantag. bursa past: Urtica, millefol: polygon: ex pauco salis vel nitri. 3º Ska ros: vel aq: ferrata. 4º. emulsione ex camph: alijsque, ut pag. Vomitu cessante, sumatur pulvis ex myrobalan: tamarind: Rhab: folijs Senn: et aq. in qua fol: acetosæ et fl: ros: rub: fuerint decocta; Colatura sumatur ex Syr: de Alth: vel ros: pallidarum. 5º ... pomum in bolo valitera ex ... sanguinis ... et ... in cura procedit.

Obs: Si hæmorragia à Ventr: orta sit à potu vini vel cerevisiæ acidi vel tenuis, aquas ex cedro, ex medicatas, liberaliter haustas, vix unquam expectationem fallere.

Obs: Si hæmorragia sit à mensium obstructione, eam non esse sistendam, nisi magna sit; ea tamen cessante adhibenda est methodus contra Menses suppressas, nisi in nubili viro cognitu ut in Hæmoptoe.

℞ 2da mea MSS. Cura.

℞ Caryoph: q. s. ad soilem ... quartam haustus cerevis: coquantur simul ... Sacch: et bibatur calide.

Laud: opiat. Poter: ... ab intr. in liq. approp. ...

pulv: astring: in bolo, vel absque vehiculo, vel ex pauco, qui nullis ... operantur ... posteriora ... vomitus ... continuandi. Hæm.

℞ Obs:

In Nausea: empl. Stom: mag: ... part: ℈ Ca-ranna, Taca-mah: ā p. VI. ol. Cinam: gtt. VI. m. f. Empl. ventriculi ... applic. Hartm. 134, 147.

Cap: 7mum.

De fame Canina, seu Bulimia.

Cum nihil aliud sit quam fames aucta, ergo omnia quæ viscidilatem ventr: aut ejus mucum tollunt, quæ nimis purgant, incidunt, detergunt, et abradunt (ut sæpe fit à vermibus) hoc malo officiunt; idcirco illud, ut Stomachi vitium, in quo latera sua, ob pars vel nihil intercedens, sese nimis contingunt, considerandum, à quacunque causa sive externa sive interna proveniat, ut la Stomachi voracitas. Authores omnes acido in ventr: morem ... tenentes vertunt (et non solum in eja cavitate, quam pro causa Naturalis dant hunc morbum ascribunt. Fori, in prætacto dicta est, Acidi ... alis dant hunc morbum ascribunt. Fori ... sine vi fluido aliquo ... fixe, sanguinem coagulare, adeoque sine viscido aliquo humore in stomacho nunquam posse adesse quo certe sensus famis frustraretur, et contactus tunicarum impediretur. Ad adeo verum est, ut si quantitas aliqua major liquoris acidi in ventr continetur, quæ

cale-

labra à mutuo contactu dolinendo, nullg [illegible] sit sensus famis. Quare quæcunque officiunt ut labra ventr: ac se accedant, sive sint acida eo visciso privata, sive aliud quid non acidi in parvâ quantitate, ea sensus famis & vulg: & caninæ officiunt.

Cura. Cura fit acidi austeri infringentiog, ut saliog fixis, rubi. tostaceis, omnibgq alijs in crudit. acidâ, ut et mussi. laginosis, pinguibus, et oleosis, imò et viscosis, ut Gelat: C.C. pulveri. gelatin: vino Hysp: Canariensi, vel et Cerevisia Brunsvicensi, et sim: [illegible] potu. ut etiam vomitorio.

Cap: 8vo.

De Pica.

Est affectg in quo lapilli, frumenta, creta, et sim comedun: tur, cu oris et ventr: morsu, anxietate & toto corpo (ob p: acidi: tatem seri à sang: à talibus alimentis) pallore (ab obstructio: nibg) et gracilitate, ob defectu alimenti.

Causa. Causa est insolitg nervor. ventr: motg, gravidis coîs, forte q: passionibg indulgent, et delicijs se tradunt (adeoqz animi potig qm corporis morbg) et forte defectg est in sang: qui potest abs: his restitui.

Br[illegible], nihil aliud est qm fames aucta: & canina, cu delirio & melancholiâ. sic affectione uterina & hypochondria: ca laborantibg satis est familiaris; non q: tales famem inducant sed q: fami aliunde inductæ superaddant delirin.

Cura. Cura fit omnibg ijs in prædicto Cap: ratione famis, et omnibg in melancholiâ et affectione Hypochond: ratione delirij.

Cap: 9no.

De Siti.

Causa. Causa est & defectg humiditatis in sang. facile curandg. 2º. seri in alios locos translatio, de quo in Hydrope et sim. 3º [illegible] & ductus salivalis, quæ nec potui nec refrigerantibg cedit, sed spirituosis, ut sp: vini, & incidentibg ut *co. nitro, sal prunellæ, et sim. in ore detentis. 4º. nimia excallatio & motg partium salinar. ut in febre. 5º. indi [illegible] solis considerandæ et ingenti opere curandæ. Ariditas nimia fibrar. & nervor. oesophagi à nimio spirituosor. potu contracta et & consequenti. nimig oris motu, qui non desinente potu citò redit. ejg partibg flexibilibg superficiei oesophagi adhærentibg citò avol-

avolantibus. Omnia ergo quae iis diutius adhaerent oodqz [illegible] ant, hic prosunt ut Dec: malv: alth: fl. viol: borag: et Emulsiones ex sem: 4. frig. et amygd: et omnia mol: sang: diminuentia, ut serr lactis, aq: font: cum Nitro et succis acidis, praecipue [illegible]. — Cura.

Sect: 2da.
De Morbis Intestinorum.
Cap: 1mr.
De Alvo adstricta.

Causa sunt ... inter assumptas, ... sang: acido-austero aut terrestri ... melancholicus dicto. humores in velamento Bombycino coagulantes, et nervos et tubulos intestinalem adstringentes, cum fuctibus aciditatis (austeritatis signis) Cardialgiae etiam et Capitis dolore. Non quod hi effectus à vaporibus oriantur, quamvis ab iis etiam fieri possunt; sed quod Sanguis talis in vasis proximis facile obstructionem patiatur. — Causa

Cura fit Clyst: emollientibus, ... ex jusculo pingui, cum ℥ij vini Emet: turbidi, ... ex ol: eandem: lini, amygd: et sim. 2º. Catapl: ex fimo vaccino cum lacte, ... ol: praedictis, ... butyro. 3º Manna cum ol: amygd: ... Ptisana ex uvis Corinthiacis cum Senna, et sim. laxantibus mitioribus, quae multo plus prosunt quam fortiora, aut ... quae irritando potius quam diluendo effectus producunt. 4º. Jusculo cum ... et Mercuriali pro cibo et potu, ... cum prunis laxativis. Morbo ... diluto, multi ... sit usus pil: aperient: cum ... nervino ... in alvo adstricta cum torpore et languore, ut in ... Chalybs Bredg in alvo adstricta ... melanch. Glac. — Cura.

Cap: 2dr.
De Passione Iliaca, seu Miserere Mei.

... affectio in quo pars aut nihil per inferiora ... ex ... acida ac in ... per superiora ejicitur cum dolore vehementissimo, ... in umbilicali regione (ob intestinorum ibi angustiam, et ... acumen) ... in inguine, ... in Scroto, ob ... in iisdem descendens et strangulationem. — Intro susceptio vid. pag. 83. de Ranis ex.

Causa est ... inversio, ... inflammatio, ... in iis ob quamvis causam obstructio, ... in magna quantitate. — Causa. Intestinorum strangulatio à ... pag. 79.

Cura fit exacte ut in Cap: praeced. Qua non proficiente, ad ... vivum ad ℥ aliquot, et etiam ad ... emittendum recurrendum est, et postea patiens in curru vehatur. — Obs: — Cura. aq: menthae, et applicatio Catuli ad ... vomitum sedens.

Obs: 1º. Passionem hanc esse aliquo affectus Vomitionis, vomendi conatus nimij, quae 1º Cataplasm: ex Mithrid: et diasc. vel ex crusta panis, vino rubro calido, indita, et aromaticis inspersa; vel aluco vivo abdomini applicato; vel Sale absynth: ex Laud: ol: Macis, aq: Menthae, et sim. interne, curanda venit.

Obs: 2º. Si aeger convellatur, singultiat, aut difficulter respiret, si urina intercipiatur, stercora valde foetent, extrema frigent, de eo actum est.

Cap: 3tium:

De Diarrhaea, Lienteria, et Passione Coeliaca.

Cum hi tres morbi gradu tantum differant, i.e., cum in primo dejectiones sint Biliosae et concoctae cum corp: lassitudine et dolore (vel ob obstruct: partium salinarum in intestinorum poris, vel ob eorundem depositionem vel secessionem) cum in 2do alimenta non concocta reddantur, et celeriter (ob glabritiem ventr: et intestinorum, vel ob tormenti defectum,** vel ut volunt alij, ob mucaginem abrasam motum progressivum subeant. Cumque in 3tio. excrementa est chylosa, ob recedantionem Lactearum a mesa tenaci, vel ob glandularum mesenterij vel intestinorum strumosam obstruct:* incurabilem fere contendam, quia non potest nutriri) Deinde Lienteria potest magis curari, quam qui os non habet nutriri; (et vel à circularis post assumpta aperientia et sim.) Diarrhaeam (cum teria cura perficitur ijs omnibus, quae dyspepsiam et Diarrhaeam (cum sit morbus ex his compositus) tollunt; passionis vero Coeliacae omnibus paulatim purgantibus, et quae copia magis quam virium magnitudine operantur, ut sunt aq: medicatae, vel sal tartari, vel sal purgans (multa aqua dilutus) ex alum: ℥viij, sal: tart: ℥ß in aq: bulliente dissolutis et filtratis, ut evaporatione sal purissimum ad ℥ß vel ℥vj. adhibendum pro una dosi, obtineatur.

Superest ergo ut Curationem Diarrhaeae tradamus. Sive sit à materia in fistula intestinali accumulata, et ibi putrescente; ob easdem causas ob quas aeri calido exposita putrescerent; sive sit à apertis radicibus ductus hepatici et pancreatici solito patentioribus; sive sit serosa, sive biliosa, sive colliquativa, sive ulcerosa profunda, vel post inunctionem succedens, sive Lochialis (ob menstrua vel Lochia suppressa) sive dentientibus, empyicis, variolosis, morbillosis, aut fructus immaturos comedentibus, sive in febre à frigidis et prunis calidis super faces assatis, sive à Humoribus accidat; Quae fere variam aegri indolem (nisi criticae sunt et morbum minuentes) vel in insensibilem transpirationem — … reno…

Diarr: cum ventris torminibus, sp: millep: ad gtt xx. bis in die ex haustu potus ordinarij. sine ullo torminibus. Hamil. 175.

Obs:
Diarrhaea semper … ob … ultra … non ducatur. a ventris glandulis acido coagulo obstructis … Poy. 73.

* ob grand. intest: infarctionem, ab acido coagulo … Poy. 73.

In Diarrhaea inveterata et diu durante … sequitur … vid. exempla … 166, 191.

Cura Lienteriae

Purg. mala nisi in initio. ib. Pass: Al- ambae curantur alcalicis coagulum acidum absorbentibus, volatilibus … C.C. ex et fixis, ex … et … ut … diaph. martialis, ex Poy. Diarrhaea

Ol. … pulv: et in … valde … Mart. …

Laud: opiatum … Poter. … masticatio … Bagl. … 108.

ʒj sem: … Chirurgorum medic: … …

-ra:em aut simi:em, restaurantibus, ut Succis: blandis exsiccantibus Diaph: Laud: liq: Guaj: Junip: Sassafr: Salibusque volat: decoct: Rt. Camomil: &c. Vel acrimoniam diluentibus (si mãa non sit tenax, incrassantibus etiam aliisque et exsiccantibus sed maxime liuida, quod ex excreta cognoscitur) ut in Dysenteria; vel si mãa sit tenax et viscida, purgantibus et astringentibus permistis, vel separatis, curanda veniunt, ut 1º Pilulae: ex fol: Sennae ʒij, Rhab: ʒi, sem: plant: ʒij, Salsaparill: ʒj cum aq: pura per triturationem. 2º pulv: Rhab: tosti: ʒij, et myrobalanorum M: corret: ʒß. Laud: gr: j. 3º Astring: ut in cap: seq: 4º Rad: Hypopar: ʒß bis vel ter, et post ea, cort: peruv: in bolo, vel quovis alio modo. 5º Balneis et mentha abdominis. 6º pro lactis interne et per clysteres.

Obs: 1ᵃ Si Diarhaea sit longae durationis, cum parvo vel nullo dolore, cerevisiam vel vinum medic: ex stomachicis (ut in Apoplexia) et Rhab: cum rad: Bistort: et Torment: omnibusque aliis remediis praevalere, praecipue si orta sit à frigore et debilitate humido, militibus eam ob causam satis familiaris. Excipias vel inferiora vaporibus ab pravis spiritibus junctis.

Obs: 2º Diarhaeam cum mãa tenaci purgantibus tractandam, eam solam esse, quae à nobis ut Diarhaea consideratur; cum omnes aliae non tam sint morbi, quam morborum symptomata.

Obs: 3º Diarhaeam cum maximo dolore citò evanescente, Gangraenam vel Sphacelum indigitare.

Cap: 47.
De Dysenteria

Nihil aliud est quam Diarhaea magis vel minus sanguinolenta, cum torminibus ventris, calore corporis acri, ardore, siti, vigiliis, excrementis spor: Ranarum similibus. ob viscositatem, et ob ulcera aliquando saniosis. quod proxime in intestino Recto, et periculosum.

Causae sunt eaedem quae in Diarhaea, et praecipue acres latices quae tunicam villosam et plexus glandulosos ^ exedunt, seu corrosive omnium viscerum intestinorum, bonificia vasorum ... dente: sive sint cibi putrescentes, sive bilis, sive pus, sive tum: ... praedicta sunt. ...

Cura fit 1º 4. 5. praecipue in posteriora, cacochymia, vel 1º in 2º. purg: si Diarhaea orta traxit à mãa tenaci in intestinis ... Rhab: solo ... tempus sit, nisi Diarhaea vel sit critica vel subita, modo ... invadens, aliàs, iis omissis, sumantur ea quae astringunt, incrassant, acrimoniam obtundunt, ut 3º Electi: ex pulv: Ar... Balaustiorum ... conf: Rol: rub: Cydon: ãa ʒj, Ether: ʒiij, Troch: de Ca... ra ... Rhab: N. M. ãa ʒv. Sal: absynth: cinam: ãa ʒj, syr: plant: Elect: Antidysent: ... ʒ ms p. 13.

mendatum in alvi fluxu de Dysent. ib.

Theriac: ʒi vel ʒv vino dissolu- ta. opt: Bagl.

℞ Singulis ʒ Ravis Lact: vacc: ʒij co... eti cum vitello ovi, sacch: ʒß. panis biliici q. s. et sit hoc et cibus et potus.

C. C. ust, coctum in aq. et Decoct: hiva- ... intrantibus et lubricitantibus. Cons: ros: ... inf... opt. intantibus.

℞ Rhab: ʒij sol: Ci- nam: ʒj Diascord: q. s. ... fomet: ... Diaph: ... Idem.

℞ Diafe: ʒij. coq. in aq: font: ʒj: adde Agrlinam: ʒij ... pauco Diasc ... t. Decoct.

Observ. In fluxu stomach. sanguis semper prae- cedit faeces; in Dysenteria verò vel post, ... faecibus ... Bagl.

Causa.

Astring: non usur- panda in principio ... Bagl.

Cura. ...

Rec: Consolida ... Una: Plantae: et Balsam: ...

pulv: p nil: Hohrolij in aq: forr: 12. Dec: vinca per viac: lorb6.
Ra stiplica D. D. inter 2/ mea p. 43. mij: aq: forr:
planlag: q. s. cujg capial a ʒß ad ʒj, ter p qual in die. 4to.
sem: planlag: tostis, C. C. usto, croco Mart: ter: sigil: ex praedict.
consero: vel Laud: liq: 5to. Ra ex Rhab. ʒij, diasc: ʒß, boli veri ʒß. rad: torment: ʒiij, cort: quercus, fl: balaust: aa ʒj, sem: plantag: ʒij, et sp: vini ℔j, et aq: menth: ʒiv. cujg colaturae cochleatim assumendae, addatur syr: papav: ʒij. 6to. Mixt: ex aq: spec: Ranar, Myrtill: menth: ex diasc: Laud: sale absynth: sal: saturni, sang: drac: syr: Myrtillor, et sim: 7to. loco omnis diasc: solo, Laud: solo ex sale absynth: mane et vespere, effectg producit; praecipue si Ra Diascord: levissima pro potu usur potur, ꝑ potiy si fortis. adsit Dec: albg Lond: ex C. C. usti ʒj, aqua ℔ iij. coctis ad ℔ij, ut fiat colatura ꝑ cribrg non tenuem filtranda, et sach: edulcoranda, p si vis, Ra ros: rub: sine acido facta. vel si vis fiat apoz: ex cort: Guaj: ʒj, aq: ℔viij. coctis ad IV. addendo sub finem rosar: rub: Pflaum: Bas: Liquirit: et sim. p sit potg nostr ordinarig ex crustâ panis ex aq: fl. M. cinam: et vin: rub: 9to. decoctis vitel: ovi ex rad: torment: Bistort: et ... Ichthiocolla ʒß vel C. C. ʒiij, pulv: torment: et ros: ex lacte et sem: plantag: coctis. 10to. Catapl: ex ther: ʒj, micae panis ʒij, ex sp: vini et vino rub: inlincta, et pulv: aromaticis insperso. p ex crustâ panis tostâ et vino rub: 11to. Sudorificis. 12to. Clyst: p ex lacte, p ex decoct: intestinor vervecis, quae saepissime dysenterias sine ullo alio remedio auferunt. Quibus omnibg nihil proficientibg p d: (causâ praesertim haerente in intestinis) ad gr: X p XV. exhibita, ex cons: ros: p diasc: ex p sine Rhab: est insigne remedium, si saepig exhibeatur, excipiatur p inferiora vapor ... ex ... pruni decoctibus injectis. Bagl: ... ferrum ... Obs: Dysenteriam a Lumbricis referri ad eorg curam, ut et eam à puris, et sim. ad morbos cujg sunt symptomata.

mal: ras: tor
ꝑ ʒij extracti
porci, in dysent: epid: mica, praecedente ... Rhaber: stopgil.

Dec: alth: et malv: in lacte, pro victu ordinario. Haustg etiam olei, Butyri, floris lactis, & sim. ...

Ol: amygd: dulc: ... p loco ejg ol: oliv: ʒij. aq: ... ʒij. lauch: ʒj ... haustg jejunanti mane exhibeng; et semaig clyster quotidie.

Bals: Samarit: Cloriae ex ol: oliv: p. 8.

Rad: Hypopec: ... ter. ʒß ad vomendum. Col ... Bagl: ...

Aq: Ros: in quâ aurg restinguitur ... Burrhus.

Laud: opiatg gr: j. ... et Clyst: ex gr: 6, 8, p 10. in ʒj dissolutis. Poter.

Cura fit per alcalia Diaphoretica et Alexiph: mixta ex Laud: opiato. Pag. 77.

vitell: ovor lactis ... inlinmo ... et p clysteres injectg. Bagl: 73. 2, 42. specificum.

Fabae rubrae in lacte coctae mane et vespere comestae. Vide ... ad fabae ... mea.

Cap: 5^tum.

De Cholerâ. *overflowing of the gall.*

Est affectg in quo liquida flavo colore tincta, et amarore infecta, aliqdo etiam nigras sursum et deorsum expelluntur, ex anxietate, dolore pungente, torminibg distentivis, febre, cardialgiâ, lypothymia et fatiga ... à vomitu et secessu aliqdo etiam ex sudore frigido, singultu, extremorum livore et frigore, et convulsionibus in toto corpore, mortis indicijs.

Cau=

Causa est copiosa ingestio ciborum citò putrescentium, | Causa.
priusquam sang: attingunt, qui ventr: intestinorumque fibras stimulando, motus convulsivos, nunc in uno, nunc in alio potentiores (cum expressione omnis liquidi ex hepate, vesiculâ fellis, et pancreate) efficiunt; vel forte humores copiosi à sang: depositi et secreti convulsiones has excitare possunt; vel dari potest oostr: ductus hepaticorum ad aliqd tempus à bile glutinosâ, quae tamen processu temporis acrior et copiosior evadens, ductus ita stimulet et recludet, ut inde ingens copia eructetur in duodenum, quae ob majorem vel minorem vellicationem, nunc Diarrhoeam solam, nunc Choleram efficiet. Non ergo, ut videtis, existimamus convulsiones semper depositiones praedictas praecedere, easque causare; sed et etiam multoties earum esse effectum, quamvis ille ipse effectus causam non parum augeat.

Cura, si non sit Crisis, eodem modo procedendum, per Authores, ac post Emetica datum, ut 1°. Magna copia seri lactis, aq: tepidae, vel jusculi macri, aut cerevisiae tenuissimae. 2°. Clyst: ex iisdem cum oleo, omnibus ferè horis 3°. oleo ipso ad facilitandum vomitum et leniendos humores acres. 4°. Dec: fol: malv: et Alth: cum syr: eorundem, ut et syr: Limon: et acetosae. 5°. Excretionibus cessantibus, sed superstite excernendi conatu cum debilitate, opium caute et partitis vicibus in formâ liquidâ exhibeatur. Amygdalata etiam, Ptisana ros: et sim: hic prosunt. | Cura.

Obs: 1°. Me, non obstante methodo Authorum praedictâ, saepissime in Cholerâ biliosâ, purgans laxans cum successu, plurimis aliis non proficientibus, exhibuisse.

Obs: 2°. Me etiam in Cholerâ nigrâ bis in ipso morbi initio (quamvis patiens videbatur nimium vomendo lacessito) vomitorium, cum successu exhibuisse, metuens ne humoris talis pravi aliqualis in corp: retentio, morbum aliquem pejorem induceret. | ^ ex Hypo: personâ pro tertim.

Cap: 67.

De Lumbricis.

Causa est semen cum cibo, praecipuè caseo putrido, in ventr: et intestina (cum Dom: Rhedo) inductum, qd in Infantibus aliisque concoctionis et fermentationibus debilibus praeditis, Per solutionis ignis ... in ... vel syr: ... vari ... jejunans infantibus. Boer: prax. 152. 4°. syr: chalyb. ... Boer: prax: 16. | Causa. Cap: ... lich: ... Sem: sanct. ... minor: gr: XV. ... glene.

℞ ℥ii d. gr: xii diagr. gr. v M. dētur cum brodio. Dos. pro Adultis. Bagl. Ch[illegible]

variam suę indolem, faciunt ℘ 1°. in vermes minimos, Ascaro: es instar (Syrones in Recto parientes) Ascarides dictos; ℘ 2°. in latos et Cucurbitinos. ficubus Indicis similes, tormina parien: tes, et chylum voracissime absorbentes; ℘ 3°. in longos et teretes, in intest: tenuibus versantes, eorumque torminibus ab eorum rosione, Ru: ctu acido, fatore anhelitus, tussiculâ siccâ, naris pruritu, stri: dore dentium, tremore ex intervallis, febri erraticâ, sopore (ob vapores ex fimeto avolantes) aliquando etiam cum clamore, Epilep: sia et motibus convulsivis (ob mali acrimoniam) saepe etiam cum pavore, insomnijs, urinâ crassâ, oculis pallidis et saturninis, tumo: re abdominis (ob flatus egressus intercepti) Haecque omnia ℘ cum Diarrhaeâ et voracitate, cum excrementis argillaceis, ℘ bovini ster: coris colorem referentibus, et in scapha saepissime turgescentibus, ℘ sine ea; Haecque iterum omnia ℘ cum ℘ sine febri et Ra[illegible] ℥ii ℘ [illegible] partibus vicibus intra 2. hor: [illegible] [illegible] [illegible]

Cura omnium cum Diarrhea ℘ cum ℘ sine febre, sive in In: fantibus sive in Adultis, fit 1°. mixt: ex aq: gramin: Cichor: aā ℥ij pulv: C.C. Rhab: sem: sancton: aā ℈ij sal: absynth: ℈ß syr: cichor: ℥j Limon: ℥ß pro 2 ℘ tribus dos: 2°. Dec: pro po: tu, ex rad: gramin: Cichor: absynt: ruta, sabin: rad: bistorta, torment: cum syru: aliquo acido. [illegible] in cochl. [illegible]

℞ crud: addito ℘ semi-pisi magnitud: in cochl. lactis. Chosn: opt.

Cura omnis cum devo adstrictâ sine febre, fit 1°. pulv: in nullo convenit:
Lond: et pulv: sem: sanct: in cum pulv: 9a: Tap: et aethiop: mineral: 2°. et: coi et amygdalarum interne, quia intestina contra rosio: nes oblinunt, et transpirationem impediendo vermes necant. In ubi s[illegible] Cuili febris et Diarrhea nulla vexent) prosunt omnia praedicta amara interne, ℘ externe sub formâ Cataplas: cum felle bubulo et Hierapicra; prosunt etiam pil: ex colocynt: Agar: et aloe; excellit etiam pulv: Simeri ex sem: absynth: Sancton: aā ℥j sem: Hyperic: citri, fl: tanaceti aā ℈ij Scord: M.ß. Sed ante omnia, post aliquantulum purgatum corpus, ℞ d: x. in tabellis, ℘ con[illegible] aā gr. xi M. cum sacharo. pulv: corall. [illegible] ex tres ℘ quatuor dies exhibeatur, et postea purgetur, utrumque idem officiatur: sed si aetas hac non videatur permittere (quod tamen nunq:) tum infunde ℥ij vivi in aq: fl: tanaceti ℘ gramin: ℘ noctem super lenissimum ignem, in quavis quantitate, et coct. [illegible] eius cum sach: dotur; ℘ liquefactum stannum anglicanum saepius immit: te in aquam, eodem modo exhibendam. ℞ [illegible] ℥i [illegible] Cap: [illegible]

---

2 [illegible] succ. Limon. pulv: Crocc. ℈ß sach. q. s. dos. [illegible] infantibus [illegible] nde.

in Intestin crassis.

et aliquando stomacho.

Syr: Limon: cum ℥ d. ℘ pulv. Rhab: cum corall:

~~fimeto~~

vermis limo

℞ succ: Limon: aut citr: cochl: ij. cum aq: quantitate ol: dulc: aut vini alb. ℥ß f. haustus [illegible] mane [illegible]

Pro Infantibus [illegible] ventre ol: [illegible] amar: et [illegible] Empl: ex [illegible] Para: ℘ [illegible]

In genere in [illegible] omnia amara, ut et omnia scabrosa, ut pulv: [illegible] Corallia, Corallina, lim: at: solis, martis, lun[illegible]

℘ observ:

pulv: ad vermes [illegible] gramin: [illegible] pulv. [illegible] ℥i: [illegible] M. [illegible] gr: xv. Laud: opiat: gr. ii. opt. [illegible]

℞ ℥ij crudi [illegible] ℥i aq: [illegible] et portulac: aā ℥iij [illegible] Sapdac [illegible] Dosanacq: [illegible] Bat. Bici 61. opt.

[illegible] umbilico [illegible] cum [illegible] ex [illegible] [illegible] cum felle [illegible] [illegible] vermes [illegible]

4 Sennæ ℥iij. Rhab: ℥j. Cannon: ℥ß. infund: in sp: vini ℥iv
4 Rhab: ℥ij infund: in ℥ij sp: vini, vini Hisp: duo tamen remedia crassis physicis ex Thalley

sp: vini tuminosalis ... ad finem Elix: n: radlis ... sal succin. ... vid. p. 63. in marg. obs. imas.

Cap: 7mr. De Dolore Colic.

Dolor hic sive sit distendens (ob pilulam intestina obducentem, et dispropor:nem vaporum eorumque poris) sive sit scindens, ab acido, sive pungens, à sale, sive vagus (nunc nephritidem, nunc dolorem hypochondriacum, in tantum æmulans, ut ab iis nunquam ritè possit distingui) sive fixus; à me sine ulla distinctione, poros aperientibus, et obstructionem (sine quâ nequit fieri dolor sive sit à causâ calidâ, sive frigidâ) discutientibus tractatur; ut 1o. mixt: ex aq: fl: Camom: ℥iij, melissæ: menth: Cinam: āā ℥j sp: croci, cast: āā ℥j ol: menth: et macis chym: āā gtt: XX. sphor: Von: sp: salin: aromat: āā ℥ij, Laud: gr: iß. sach: q.s. 2o. posselo et dec: fl: camom: in vino Hysp: qd sæpissime sine ullo alio remedio morbus tollitur 3o. stolu et sacculo pro abdomine, ex melissæ: menth: rad: Levist: Angel: bac: Iunip: lauri, sem: coriand: Cymini, fl: Chamam: pulegio, et sim. si sit fœmina. 4o. cum dec: prædictorum cum aliquo laxante: 5o. 4 Rula Xoris: ... 6o. ... palv: ... pilul: ...

Obs: 1o. si sit Colica à fæcibus induratis, Curam ut in alvo adstrictâ, et passione Iliaca instituendam esse.

Obs: 2o. Me non absolutè negare, quin Colica ab Author: calida dicta à frigidis aliqdo (ut haustu aquæ et cum et sine sp:) aliquo acido crudo; sed potius sic tales esse sobrie affectus depositionis et secretionis partium acrium à sang: (eodem ferè modo ut in Choleras quamvis non cum omnibus eius symptomatis) et nullo modo ratione istius et obstr: in intestinorum tunicis, cum à frigidis nunquam poterint dissipari.

In coliæ ... ℥ij aq: ... vini ... elix: salut: Anglic: ... ℥ij aq: pulegio: ... ℥ij sp: rosl. ol: ... ℥j. ... 2 dos. intra 2 hor: capiend.

Cap: 8. De Hæmorroid: Dolore. et chirurg.

Cum sint venarum varices (nigriores enim sunt et molliores quam arteriarum aneurismata) interne et externe in podice pendenti; et cum melancholicis, scorbuticis, cachecticis, et alvo stipatis, familiares sint, sequitur causam esse sang: grumos obstructiones facientes, et ipsam sang: gravitatem in his vasis, (qd non satis patentem in iis viam invenit) scrobiculos, in ano

In Colica ... 4 aq: rol: ol: ... dulc: ... ℥ij ...
Laudanum opiat esse cum surgante mist. ...

stone-Colick.
wind-Colick.
In flatulenta applicetur ... calidè loco affecto. ... applicetur sal commune calidè in sacco.

Cura.

et Obs:

magis prodest si ante eius ... rasur: ex corn: c: philos: ... diaphor: et ... cornu Xoris, ... propinetur. Bas:

sol: fiq ... in terra, non in muro nalis ℥v. sol: ulm: Xoris: ℥j ... cum brodio. Basl. ... fl: iuglend: pulv: in haustu vini albi.

et Cap. de Vomitu. in Margine

et chirurg.

et ... hæm. ... gravidis. Causa.

Liber ... ad ... ℥ ...

ano vero minores, ob loci angustiam, sed pauci sæpè in vasis venalibus (pulsus cordis aliquando mentientibus) adæquantes efformantem, et dolore 1o. Distentivo, aliquando etiam tam pungente propter præcipitationem salis, ut homines sæpè ad insaniam redigat. 2o. Et sang: à prædicta emissione tantâ, ut aliquando hydrops minatur, quæ tamen in Hæmorroidibus fluentibus assueto non sistenda est, et in ijs morbus non est, sed potius præservat à morbis. 3o. Calore; quæ tria per intervalla recurrunt, quia circulatio sang: per illa vasa, aliquando promptior, aliquando lentior.

Obs: Puerperas vix unquam Hæmorroidas fugere, ob pressionem intestini Recti et venarum hæmorroidalium à capite infantis, Unde (crassiore sang: parte refluxu libero concesso, et crassiori remanente, sanguine interdum per arter: quæ non tam prementur ac venæ, satis liberè fluentes fiunt Varices.

Cura fit 1o. Clyst: si fæces sint duriores. 2o. sanguisugis, si eas apertas velis, vel suffitu ex rhin: vulg: ut per se aperiantur. per 3o. si eas discussas et repulsas velis, Catapl: ex fimo vaccino 4o. et c. præcipuè in pede. 5o. Catapl: vel Ung: ex Chelidon: min: et rad: verbasci cujus ultimi dec: in lacte internè maximè commendatur) 6o. Ung: populeo et opio, camph: et sach: Satur: vel ung: linariæ, rosat: et vel crudo. 7o. Aq: rosat: plantag: et troch: albi Rhasis, camph: sach: sat: sem: hyosc: et opio; quibus et alijs adstringentibus imbibitus spongias ut et, si vis, succ: portulac: crassul: et sempervivi. 8vo. Anodynis ex micâ panis, fl: sambuci, sem: lini, fœnugræci, et sim. 9o. si venæ hæmorrhoid: internæ exulcerentur, optimè remedium flor Sulph: internè, et clysteres anodyni et detergentes ex lacte, mel: et vitello ovi soluto.

Cap: 9um.
De Tenesmo. Dry-flux

Est affectus doloriferus circa marginem Ani et extremum Recti, et frequenti, sed inani, ad sedem inclinatione, et cum emissione nunc mat: viscosæ instar albuminis ovorum, nunc sang: nunc puris.

Causa vera est à Recti ulcere, sive ab humore acri, sive à Lumbricis ascarides dictis, sive ab hæmorroidibus internis.

Obs: Tenesmus diuturnus sive gravior, sæpè gravidis abortum parere, sæpè etiam in fistulam Ani degenerare.

Cura fit 1o. Clyst: ex absynth: Centaur: rosat: rub: agaric crebrò Clyst: anodyni et traumatici. pag. 90. Vide alio Annot: Ettmuel. p. 9.

Marginalia:

Rx Sedi (Small mat. Stonecrop) et butyr: recent: q.s. contund: simul, et applic. loco affecto. et renovet. ter vel quater in die. prodest hoc in internis et externis, et vel sint sanguinol.

ad Hæmorrhoidas leniendas: Rx ol. ros. ℥vi. amyli ʒss coq. ad fin. fil. (?) [illegible] add. ung. [illegible] ℥ Croci ʒi. [illegible] ol. [illegible] catapl. [illegible] sing. [illegible]

Vinca pervinca [illegible] dec.

Rx fl. [illegible] ℥vi. syr. viol. ℥i. [illegible]

Cura [illegible] Hirudinibus.

x Repellentia.

y Emollientia et Anodyna.

x Malagmata si lit [illegible] rosat. [illegible] camph. et troch. alb. Rhas.

Dec. cort. tamarisc: [illegible] fluxus sistit.

x Londino March: Atholia.

+ ex gland. Intestini Recti lenticularibus. pag. 84.

Causa ex vasis sang. erosis. ib.

Cura Anodynis atque traumaticis Radicalis Calentibus. ib. Cura

Londinensis.

℞ Tereb: venet: axung: suill: āā ℥ij
pulv: Canth: ʒß piper: nig: sinap:
cōis āā ʒij. Cer: flav: ℥j. M.f. Ung.
bonz of [illegible]

Edinburgensis.

℞ Tereb: venet: axung: suill: āā ℥iß
pulv: Canth: ʒj. pip: nig: sem: sinapi
cōis āā ʒiß Cer: flav: ℥ij. M.f. Ung.

Psilothrum

℞ alb: ov: conquass. N° 3. Calc. viv. ℥viij. Auripig: ℥j.
Lixivij q.s. ut f. Ung. Illatz in [illegible] [illegible], abluatz aq.
tepida, et locq inungatz ol. ros. et lini.

Combur. aliud
Cera ℥iss axung: ℥ij. Terebi: venet. ℥ss pulv.
Canth: Sem: Sinap: āā ℥iij. M. f. Ung: [illegible]
[illegible]

℞ Gr. Ammon: Bals: Tolut. aa ʒj. Millep: ppt ℈iij
Myrr. Styrac. Calamit. aa ℈ij Bals: Peruv: ʒß
Bals. Sulph. Terebinth: q.s. M. f. M. ex singulis dra:
chmis formentur pil. No xij: dentur in pixide.

Hernia. Sr Thomas Renton.

℞ Rad. symphyt (sive consolid. maj:) pulv.
Aloes puriss. pulv.
Ol: carvi, vel Anisi.

vel

℞ Sigilli Solom.
Pulv. Jalap.
~~M. f. pulv.~~ quotidie per 6. hebdomadas
~~sumendus.~~

Locus, ol. vitrioli embrocetur,
et Caustico Lunari, sive Lap. Inferv. inuratur,
ut Eschara decidat, et Cicatrix fiat.

℞ Gum Galbani
— Ammoniac. aa ʒj (Pilula Polychresta. Boerhaave)
Sap. Venet. — ℈ij
Tart. Vitriolat. — ℈ß
Aloes — ℈ß.
M. f. pilulæ gr. ij.
Involv. Cinamomo.
Dentur in Capsula. Dos. iij. aut IV. mane vacuo stomacho, & post merid.
aperiunt & leniter movent alvum.

A travelling Receipt by Dr Woodward for Mr Padge

℞ Elect: Lenitiv.
syr. Ros: Damascen:
Ol. Amygdal. dulc. aa ℥ij.

M. Cap. Cochl. j. vespere & mane.

℞ Rad. Gentian. — ʒj.
— Zedoar: ʒß.
— serpent. Virgin. ʒj.
Cort: Aurantior. — ʒj.
Cochinell — ʒß.

Infundantur per septimanam, vel duas septimanas, in sp. vini ℔j. ~~calide~~ tepidè vel frigidè; tum effundatur purus liquor: deinde ipsam materialibus affundatur novi sp. vini ℔j. stent tepidè iterum per unam vel duas septimanas; effundatur purus liquor, & misceatur priori, & servetur ad usum.
Dos. gutt. 30. 40, 50, 60. in vino vel cerevisia.
Sir H. Hamilton. (stomachicum.)

---

vid. supra Pil. Polychresta.

℞ Pulp. Cass.
Crem. Tart.
Flor. sulphur.
Syr. violar. q. s. ut f. Linctus. adde
olei N. mosch. gt. j. vel ij. Mrs H. gentle purge for Piles.

Hernia abdom. Pulvinar rotundum assulis assula rotunda [illegible] supra [illegible] fasciae vel ligat. circa corpus. assula [illegible] [illegible] duo [illegible] [illegible] quae ligantur supra plagam. In Mulieribus [illegible] [illegible]. Hernia umbilici in infantibus [illegible]

(Operatio Herniae ventralis [illegible])

Enterocele dignoscitur tactu, qui sibi diversas corporis vel [illegible], si non Epiplocele.

[illegible] prolapsus [illegible] [illegible] [illegible] perforata [illegible] [illegible] vel [illegible] immersa cum [illegible] filo ad extrahendum ex volumine et immittendum [illegible] ad [illegible] [illegible] astringentibus [illegible] [illegible] dorso vel lumbis.

[illegible] [illegible] in Operationibus.

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible]

Wils J. Hau.
Caius Samuel [illegible]
Jean Nilson

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible]
[illegible] vel [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible], [illegible]. [illegible] [illegible] in [illegible].

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible]
[illegible]

Dunkeld May 27th 1709

I received yor giving acco
that Lord George is very well
since he went to Perth which

The following is called the perpetuall issue

First they apply a comon vesicator plaster the breadth of half a crown for a night or till it blister well, then a melilot plaster ~~24~~ 36 hours then they take the following oyntment spreads a little of it on a rag & applyes for a night & diapalma next day & so on as need requires and it runnes

℞ Terebinth venet axung porcin ā ℥j cerae flav ℥ß cantharid in pulverem subtilem trit ʒij piper nigr sem sinapi subtiliter pulverat ā ʒß M. f. s. a. unguentum. Some leave out the piper and Sem. Sinapi. Mr Bruce shifles to give his receipt wch I believe is nothing but Basilic. ℥j cantharid subtiliter trit ʒj ~~M~~

any of these will doe well enough as I have tryed severall times that with the piper & sinap. makes the greatest evacuation but is more painfull. all the kynds I have seen raises a strangury in some persones whereupon it must be left off.

D. Boerhaave pro
D. Gregorio.
℞. Rhei elect. ℈ij.
Calechu ℈j.
Japon. aromat. ℈iß.
M. f. pulvis gran. iij.

℞. Radic. rub. tinctor. Unc. v.
Fol. parietar. M. iv.
Sem. Bardanae Unc. ij.
Cort. tamarisc. Unc. iij.
[illegible] j hora
Cum aq. decoct. ℥iij.
Inunct. pil. j singulis [illegible] horis di[illegible]
[illegible] Unc. iij decocti cum singulis.
[illegible] [illegible] Hydrogala [illegible]
ij aquae et [illegible] j lactis.
Brachij [illegible] linteis calidis.

Philos. Transact. No. 314. for March and April 1708.

~~By my solution~~ By my solution of the problem for determining the due Doses of purging and vomiting Medicines, in all their cases, it is manifest in general, that those medicines operate either upon the account of their being mixed with the Blood, or by their stimulating the stomach and Guts. 2. That this their operation is more or less according to the Quantity and Thickness Blood, i.e. a greater quantity, and the thickest Blood require the greatest Doses. 3. That when the Quantities of the Blood are the same, the Doses of purging and vomiting medicines are in a duplicate proportion of the Blood's Thickness. As also, that in every case those Doses must be in a proportion compounded of the Quantity of the Blood and those squares of its Thickness. ——— &c

Postul.
Schol.
Corol. 1.
Prop. 1.
Prop. 2.

1. It plainly follows, that those medicines always purge best and most constantly in a liquid form, bec. more easily conveyed into the Blood, and can stimulate more parts, and that upon the account of this their Fluidity; whatever may be the way that purges and vomits work, or whatsoever their nature may be. ——— ———

2. The Doses must be increased according to the Quantity, and according to the Thickness, and not only so, but they must be increased in a duplicate proportion of their Viscidity. This is evident by the Tables in Cassia, viz. 9:8ʒ :: 4:3ʒ, 1℈, 13⅓ gr. and therefor alternando 9:4 :: 8ʒ:3ʒ, 1℈, 13⅓ gr. Therefor the Doses are as the squares of the Constitutions. As this is true in the mean Constitution, so also in the highest and lowest 4:16 :: 213⅓ gr: 853⅓. i.e. the Doses are as the squares of the Constitutions. ——— ———

How Tables are made.

Econ. animal. p. 51. Bibl. anat. p. 1124. tom. 2.

The Ages wherein these different Doses are taken, I find to be four; when a man is about 16 or 20 years of Age and weighs about 12 stone, he then takes the common Dose: one of 9 years takes ¾ of that: one of six the half; & one of 3 years the quarter. Moreover, it having been already shewn, that the notable healthy constitutions are but three, as also the notable pulses of each of those; let then these constitutions be as 2, 3, 4. That of the most fluid Blood as the first number, and so on; in that case, the Dose of any person will be found by multiplying the common Dose for his age into the square of his Constitution and dividing by the square of the midle Constitution. For Instance, if ʒj Cassia is the common Dose, or the Dose of the midle Constitution, ʒiij, ℈j and gr. 13⅓ is the dose of the first constitution, and ʒxiv. gr: 13⅓ that of the grossest or last constitution; and so proportionably for every medicine in all the Ages, as appears by the Tables.

The only Exception against this Calculation is when a person is more loose or Costive than ordinary, which is to be reputed as if an Equivalent quantity of a medicine proper to produce those Effects had been taken. Any Physician who has considered this case in some people after Fluxing, will allow the justness of this Exception.

As vomiting medicines have the same common Doses with purgatives, they also admit of the like divided Doses, we therefor may be found by the same Tables. Only, as people that are more Costive than ordinary require a proportionable greater Dose of a purgative; so they require their Dose of a vomiting medicine to be considerably less, as is very well known in hot Countries. Hipp. S. 7. aph. 70.

Not. 1. That in the Tables Age stands in stead of Quantity of Blood; bec. they increase pretty equally, and it makes the practice more easie to such as are not accustomed to weights & numb.

2. That the mean Ages multiplied into the mean Constitutions, give Doses more nicely. ———

Philos: Transact. No. 303. for Sept and Oct 1705.
Gul. Cockburn M.D. solutio Problematis de Purgantis et Emeticorum Medicamentorum Dosibus determinandis in quacunque hominis Ætate, Temperamento, Temperamenti varietate, per universum terrarum orbem &c.

[11]

Supponendo 1o. Illiusmodi medta nihil prius operari quam in sanguinis massam appulerint, et eidem penitus immisceantur &c. 2o. Generaliorem eorum effectum esse temperamenti sanguinei aliorumque liquorum gyrantium alterationem. Ex hisce duobus postulatis sequitur quod ubi sangs. Crasis est eadem, Medtorum Doses, ad certum aliquem eliciendum effectum, sangs. quantitati proportionales esse: si v.g. certa quædam dosis exigatur ad ℔i sangs. crasin alterandam ad certum aliquem gradum, duplicem oportebit dosin adhibere ut ℔ij ad eundem gradum alterentur, triplam ut tres &c. ———

Coroll. Quantitas sangs. et caeterorum humorum in gyrum actorum cito ex Animalis pondere potest æstimari — exinde sequitur Doses quantitates, caeteris paribus, esse corporis ponderi proportionales — Ex. gr. pil. Rudij gr. XXX. unica plerumque dosi Homini exhibentur, et Hominis pondus commune est 160 ℔, et Infantis ℔ 12. quare ut sunt 160 hominis pondus ad 12 Infantis, ut sunt gr. XXX hominis dosis ad gr. $4\frac{1}{4}$ quæ sunt Infantis; ac semper in eadem ratione medtorum doses augendæ sunt ut crescit Infans. —— Hucusque Homines omnes eodem gaudere Temperamento simul et Augmentum ordinemque secretionum, ad annorum numerum, æqualem supposuimus ——— Sed si Temperamenta sangs. differunt, hæc differentia in certa quadam partium ejusdem cohærendi dispositione consistit, qua sanguis magis vel minus fluidus evadit, unde medtorum in sangm. operationes fiunt diversæ pro varijs Cohærentiæ gradibus. — et manifestum est medta illa facilius laxioris texturæ sanguini admisceri quam firmius cohærenti, commiscendique proclivitas quam habent medtorum partes particulis sangs. est semper ut Fluiditas directe vel reciproce ut est sangs. Tenacitas, et medti in sangm. vis erit in eadem similiter ratione; supponendo sc. sangs. quantitatem eandem, ut et celeritatem. Si vero, quantitate posita eadem, sangs. velocitas sit diversa (diversa etiam existente Cohærentiâ, ut supra) medtorum operationes, i.e. secretionum quantitas ab eis productas, erunt ut sangs. velocitas: secretiones enim in qualibet Glandula, in dato tempore, sunt semper ut sangs. quantitas quæ in eandem glandulam eodem tempore devehitur, h.e. ut ejus velocitas. Sangs. etiam velocitas, caeteris paribus, semper se habet ut ejus Fluiditas, seu reciproce ut ejus cohærentiæ gradus: si igitur sangs. velocitas esset una consideranda, hoc casu quantitas Dosis ad eundem effectum producendum, erit directe ut cohærentiæ gradus in partibus sanguinis.

Prop. 1. In hominibus duobus æqualem sangs. quantitatem habentibus, sed cohærentiæ gradibus differentis, medtorum emet. et purg. doses, ad eundem effectum eliciendum necessariæ, sunt in Duplicata ratione graduum cohærentiæ sanguineæ. ———

Prop. 2. Dosis quantitas hominibus diversæ quantitatis sangs. exhibenda, qui simul diversis pariter cohærentiæ gradibus, est in ratione composita ex ratione ponderis hominis et duplicata graduum Cohær.

Coroll. ——— Qualitas seu Temperamentum sangs. ex pulsibus, urina, alijsque Secretionibus invenitur.

Scholium. —— Dispositio quam habent ventriculus et Intestina ut stimulentur, est ut memorati vitalis et Cohærentiæ in sanguine gradus. —— Lond. 4to Non. Febr. 1706.

...hoïdes, pour adoucir le sang & pour remettre l'Estomac.

Il faut garder un regime simple & moderé, en evit[ant] toutes sortes de sauces de haut gout, d'epiceries, de patisseries, de confitures trop douces, & tout ce qu'il [y] a aigre du fruit aussi bien que des sauces & des boissons.

Il faut manger de la viande simplement rotie & bouillie, des soupes & du bouillon sans ou avec des herbes ou des racines, pourvû que les herbes & le[s] racines ne donnent trop de vent; dans ce cas, il faut manger peu avec un peu de noix de Muscade rapée là dessus.

Que cette diete ne soit trop rigidement observée, puisque cela même fait souvent du mal.

Souvent il est bon pour la digestion de mange[r] mais avec moderation, du fruit doux de soi-mêm[e] & meur, aussi bien que de la gelée de pommes & [de] Coins, principalement apres les repas.

La boisson ordinaire doit être cette eau de gr[aine] de Geneuvre prescrite ci-dessous, en s'abstinant d[e] toute sorte de vins & d'esprits, excepté apres le r[e]pas un verre de bon vin de Bourgogne ou d'autr[e] sorte, qui n'est pas aigre, avec un biscuit trempé là dedans.

L'on peut manger des prunes qui ne soient pas aigres, des Raisins d'Espagne & de Corinthe, melés dan[s] d'autre manger, ou d'ailleurs en petite quantité, comm[e]

emple, pour desert.

Quand il faudra purger, que cela soit tres doucement, [comme] ce qui est prescrit. 2 ou 3 dragmes de poulpe de [C]asse nouvellement pressée, avec la Confection complete [de] Hiacinthe, ou 5. ou 6 semences de Citron concassées ou [pi]lées dans un mortier & melées avec la Casse.

Pour rafraichir & pour lacher le ventre, l'on peut prendre de tems en tems une Dragme de poulpe de Casse avant diner ou avant souper.

Pour metre l'esprit & le corps à leur aise, il faut pren:dre des exercises moderées, jusqu'à ne pas suer.

Il ne faut pas manger ni trop souvent, ni en trop grande [qua]ntité, de l'huile, du beurre, & de la viande salée.

Il est bon de prendre de Chocolat 3. ou 4. fois par se:maine, mais non pas trop fort, ni trop souvent, ni en trop grande quantité.

De Ris & de l'Orge nourissent tres bien, mais l'Orge [c]ause un peu de vent.

Quand les Hemorrhoïdes saignent trop, des œufs sont bons [po]ur la santé, & ils nourissent tres bien, comme aussi [M]ille-feuille en Thé ou en Decoction.

Quoique les Hemorrhoïdes saignent un peu, il n'est pas [n]ecessaire de faire autre diete que l'ordinaire, excepté [de] s'abstenir du vin, & de tout ce qui puisse echauffer.

Que les Hemorrhoïdes saignent un peu, fait plutôt du [b]ien que du mal.

L'on peut prendre le matin de Thé, & un bon dejeuner, selon qu'on s'en trouvera apres

À boire de Caffé trop souvent, fait de mal.

L'on peut se servir de tems en tems, même avec tres grand avantage, d'un petit lavement d'environ six ou sept onces de la Decoction de Mauve echauffée comme [à] l'ordinaire dans ces sortes de Cas.

Et

… sucre, sans oublier à chaque … se ordinaire de Cassia pour le soir.

6. Il faudra prendre longtêms la Tincture de Mars. on peut l'interrompre pendant quelques mois, & la reprendre ensuite, particulierement au printêms & à l'automne.

7. Le Melange de l'Eau Vulneraire avec l'Eau de Lentilles sera toujours utile.

8. C'est une affaire bien delicate que d'arrêter le sang qui sort des Hemorrhoides. Neanmoins quand l'evacuation en seroit trop grande, & que les forces commenceroient à manquer, dans ce cas, outre le …anissement de Vin, & de tel mouvement ou exercice …ue ce soit, il conviendroit de se servir de l'Eau de Laituë avec de salpêtre, laquelle on devroit pareil…lement ajouter à la Ptisanne ordinaire sans Gene…re, que —— prenoit ci-devant. Ce qu'on a con…illé ci-dessus pour amener le sommeil, seroit …ssi propre à produire cet effet.

… …tage encore plus grand … ployer les fumées ou les vapeurs de vin de Claret … & laver souvent & souvent les parties avec la decoction de Lent… où se refroidit un fer tout rouge. L'on peut mettre une cueillerée d'Eau Vulneraire (comme on l'appelle) avec 8. ou 9. cuillerées de la susdite Decoction, ce qui ne laissera pas d'avoir un tres grand effet aussi.

La Composition de l'Eau de Genevre.

Il faut prendre 6. ℔ de grains de Genevre bien choisis, pleins de suc & meûrs, & il les faut un peu ecraser. Une poignée d'Orge commune, lavée dans plusieurs eaux bouillantes. L'Ecorce de 4. petits Citrons les plus fra… 3. ℔ de pain bis, chaud tout comme il sort du four. … moitié d'une noix de Muscade rapée finement.

On met toutes les drogues ci-dessus nommées en 60. pintes (ou bouteilles) de bonne eau dans un baril, de façon qu'il soit absolument plein; ensuite on le bouc… avec une telle exactitude, que rien ne puisse transpi… & on le laisse ainsi environ 3. ou 4. semaines.

Ce tems passé on perce le baril, & l'on en boit … tant que la liqueur soit claire, apres quoy on le … bien, même avec de vin blanc, & de nouveau ensu… on prepare une autre dose pareille.

Quand on commence à boire d'un tonneau, il en … apprêter un autre, pour s'en servir à la fin du prem… continuant ainsi tour à tour.

Afin que la liqueur soit meilleure, il faut la tirer le moment avant que de s'en servir, autrement elle s'evanteroit en attendant.

Il ne faut pas remuer le tonneau de sa place, san… quoy toute la liqueur se troubleroit.

Rouillo…

…on, qu'on doit prendre une heure… avant diner.

…e la Chicorée sauvage, de la Porcelaine, du Cresson, de la racine de fraises, des semences de Melons, de concombres, & un peu de celle de Pavot blanc, du gros Orge mondé, & des queuës d'ecrivisses ecrasées. On prend un poulet que l'on remplit des choses susdites, & on le faut bouillir dans de l'eau jusqu'à une juste cuisson; apres on le fait passer par un linge blanc, & immediatement avant de le prendre, on y met dedans une petite cuillerée de Tincture d'acier au suc de pommes.

…1. Une legere evacuation de sang par les Hemorrho… de tems à autre, & en tres petite quantité, n'est que bonne & utile pour le malade. Dans ces bornes-ci, elle n'est pas un mal, mais une purgation. C'est un bon effect que derive d'une mauvaise cause, qu'on ne sauroit ordinairment vaincre, en sorte qu'il seroit dangereux en tenter la suppression, ainsi que l'experience ne nous fait voir que trop evidemment tous les jours. Cependant afin que cette evacuation ne passe pas les bornes, & de Critique ne devienne pas symptomatique, il faut agir prudemment, & d'observer pendant sa durée une regle de vie qui ne puisse l'augmenter. C'est pourquoy dans ce tems on pourra laisser le vin àpart, étant d'ailleurs irreprehensible la methode de vivre que —— observe dans le reste.

2. L'Injection de la Decoction de Mauves doit être continuée autant que les passages des excremens par l'anus causera de la peine. & aussitôt qu'on gagne la lubricité naturelle au ventre, & qu'en poussant la selle le malade ne sent plus d'incommodité, on pourra la quitter, ainsi que le foment de

…, qui d'ailleurs ne … qui même alors convient mieux quand les Hemorrhoïdes amenent le plus de sang.

3. Le Parfum avec le vin rouge de Pontac pourra servir surement lorsque —— seroit universellement rentré dans son premier état, & que les Hemorrhoïdes seules de tems en tems enfleroient avec grande douleur, comme il arrive dans celles qu'on appelle Aveugles, à cause que malgré l'enflure & les empreintes douloureuses, elles ne donnent pas une seule goute de sang.

4. Le sommeil sera une suite de bons effets que la methode ordonnée fait esperer, de sorte qu'il ne faut pas le solliciter par les medicamens, particulierement par les Narcotiques & par les assoupissans. Tout au plus en cas de besoin on pourroit prendre le soir une ~~mêlée au diner avec la viande de la Laituë~~ soupe de Laitue, X etuvée, ajoutant aussi à la dose & aux ingrediens du blanc manger, le lait tiré des amandes, des semences de   & de la Laituë, au quel on pourroit ajouter, en cas de necessité, celui aussi de Pavot blanc & de la

X & au diner, la même soupe de Laituë melée avec la viande de la La…

5. Le lait d'Anesse au premier printêms, c'est à dire au mois de May, seroit necessaire, particulierement si —— se trouvoit encore extenué & sujet aux irritations & aux douleurs hemorrhoïdales. Continuant à se gouverner de même qu'à present, il est superflu de lui donner d'autres avis, pourque l'usage de lait lui soit utile, la regle qu'Elle observe y suffit pleinment. A l'egard de lait de vache, on pourroit s'en servir le mêlant au Thé, comme on fait ordinairement, ou en le prenant à part, d'abord qu'il est trait dans la quantité d'une tasse chaque matin, avec un

aloe, colocynth: Rhab: & polig ex terb: cum vitello ovi et ol: Hyperici, 2º. Bals: sulph: in anum intruso, ut et interne sumpto. 3º. suppositorio ex sevo cervino, bolo, campk: opio, bals: sulph: bals: lucatelli: saur: et sim. 4º. ulcus post deterssionem consolidantibus tractetur, ut suffitu ex mastich: thure, et myrrh: & dec: ex nymph: et sim. in vino rub: interea clysteres frequenter, sed in parva quantitate, sc: ad ℥ij, sunt exhibendi. 5º. excimatur p inferiora vapor terb: prunis ardentibus injecta. Bagl: p. 72.

cum, praeuntib. a... adhaerendis.

etiam ex ... una: populeo, ... plant: ... in obs: 3ºio. ... Observ:

Sectio 3tia.

De morbis Hepatis, Lienis, Renum, et Vesicae.

Cap: 1mum.

De Ictero, aurigine, morbo Regio vel Arcuato.

Est affectio in quo tota corporis superficies, et praecipue oculi et ungues (quia contraria juxta se posita magis elucescunt) flavo colore linguatur: vultus etiam, quia aeri expositus, poros habet minus patentes. alvus et dura. et faeces albicantes.

Causa. Cum Bilis sit, ex authores, humor acris, tenuis, et pungens, cumque ejusdem katilanes & obstructiones & copia, effecta calidos et dolorificos producant, cumque nihil tale in hoc morbo accidat, sed e contra omnia viscidilatis effecta, sequitur non Bilem supra descriptam, sed humorem viscosum, medicis innominatum, in sang: flavum, hujus morbi esse causam. hac enim obstructiones in tubulis partium solidarum fiunt, hepar fit durum, et saepe etiam schyrrosum, cum dolore hypochondrii dextri gravativo, non vero acri et dolorifico, ut a Bile vera fieret. 2º. cum Dyspnaea quod jecur onustum (Diaphragma) et 3º. Gravantur a cibo et potu assumpto, quod jecur (Ventriculum) premat. 4º. cum excrementis subalbidis, ob defectum bilis, ob infarctum aut meatus Cholidochi, aut radices pori biliarii. 5º. cum alvo adstricta, ob defectum stimuli naturalis. et 6º. cum urinis flavis lintea tingentibus, ob viscositatem.

Causa

Obs: 1º. Hunc morbum posse produci a quacunque causa humorem praedictum flavum in corp: retinente, sive a calculo, sive ab inflammatione hepatis. Obs:

Sic: 2o. flavitas corporis aliqdo aliquamdiu flavor apparere. qmvis secretio Bilis in hepate satis bene sese habeat, et aeger, sc: cum sint flava, uti fit a ira, passione hysterica, debilitate: ne à febribg, et Mentis sudoriferis nimia quantitate assumptis.

Cura.
In flavo sp: acidas hei specificy. p obs: succg seu fæcula Brionia olim specifica. Omnia Medta acida non corrosiva. R. stерc: anserin: aut gallinæ, seu galli, exsiccati et pulv: ℥ß v ℥j mane in haustu vini albi cum pauco sacchar: et cinam. per 8. dies.

Cura fit 1o. vomit: ut hepar et meatg fellei, ventric: et abdominis constrictione, materiam obstruentem cogantg excernere. 2o. purg: (et non omnino et g. nisi ad sit metg inflammationis, et hæmorragia aliqua consueta fuerit suppressa) ex sol: mann: cum sale tart: et pastulis laxat: et syr: cichor: cum rheo, qui in hoc affectu multy faciunt, quia purgationes plerisq educunt, p: Hepar: cum Bi: feoderic, meatg cholidochg sit præcipug canalis p quem Medta purgantia derivant liquores à sang: in intestina. 3o. pulv: et infusione millip: croci, et Rhab: et christ: tart: v pulv: lumbricorum torrefl: 4o. vino et cerev: medic: ex rad: cichor: Rub: tinct: cholid: Rhab: monach: fænic: asparag: petrosel: Rusci, cort: fraxini, tamarisc: Berber: rad: curcumæ, Brion: stipitibg amaræ dulcis, scolop: fl: genistæ, sem: aquileg: limat: Martis, fl: sulph: et sim. salinis et amaris, viscositatem incidentibus. 5o. Infusione cinery genistæ, cum aliquibg prædictory. 6o. potu ex iisdem cum cineribg clavellatis et tibro; et catapl: ex cineribg et stipit et urinæ, ^capdi.^ 7o. potu et julepis ex cichor: rad: 5 aper: fl: Borrag: Bugl: fragrar: v ex sero lactis, v ex Guajaco. 8o. sapone p. se. v in pil: cum cochinella, v cum lacte (qd à multis pro secreto habetg) Quibg omnibg non proficientibg, ad pinguedinem canis destillatam, instar æthiocollæ in vino, partes viscosas et peccantes præcipitantem, et ad ♀. d: confugiendy erit.

Ita Ludov. ziij: partitis vicibus intra 2 duas horas jejunans, cum deambulat: cum spiritu lacte, sp: C.C. et plialicis. Boerh. Chem.

v. Hippermallod.

Decrescente Luna lotium ægri in panno lineo non loto excepty nocturno aeri exponaty donec linteg exsiccety, hocq toties repetaty donec ictorus cesset. act. Hafn. vol. 4. p. 64.

Cap: 2do.

French mss. 155. } **De Inflammatione Hepatis et Lienis.**

Est affectg Hypochondrij dextri, ^cum dolore,^ non tamen acuto, ob paucitatem nervory; 2o. Dyspnœa ob ligamenty hepatis cum Diaphragm: 3o. singultu, ob convulsionem ventr: et diaphrag: 4o. Decubitu in lato ægry molesto (alias ac in schyrro) ob pressionem hepatis, et peiore in lato sany, ob hepatis suspensionem. 5o. febre, alvo durâ, siccâ, aridâ, siti, urina croceâ, et colore corporis icterico, ob pressionem ductuy biliferory, alias ac in pleuritide.

et quia non febriosa

Causa

Causa est partium salinarum (unde inflammatio exquisita) et pituitosarum et terrestrium (unde spuria) in poris haesitatio. | Causa

Cura fit 1º. V.S. 2º. clyst: 3º. Lap: prun: 4º. Dec: ex rad: cichor. taraxaci, Endiv: acetos: et eorum herbis, ut et fumar: agrim: tamarind: tart: albo, cum sero lactis chalybeato. 5º. Epithematis ex iisdem. et ung: santalino, cum camph: aliisque omnibus, ut in aliis inflammationibus. Si in suppurationem tendit, promoveatur maturantibus, ut in Chirurgia, et si vis, aperiatur ne interne rumpatur, quod vix unquam sanatur, nisi fortuito vulnerariis internis, et clyst: poros intestinorum aperientibus. | Cura

(seu Empl: de mucilaginibus.)

Obs: Inflammationem Lienis esse iisdem omnino symptomatis manifestantem (nisi quod dolor sit in Hypochon: sinistro, et quod color corporis sit potius subnigrescens quam flavescens) eodem modo esse tractandam.

Cap. 3^{tium}

De Obstructione et Schyrro Hepatis et Lienis.

(et vide causasque et curam Humorum.) (vid. French MSS. p. 155.)

Ex utriusque obstruct: dolor fit 1º. gravativus (aliàs ac in Colica.) 2º. Respiratio fit difficilis, et quia partes, diaphragmati non facile cedunt moveri, et ob efferv escentias et flatus, praecipue inter Lienis tunicas et parenchyma. 3º. Corpus fit grave, tristitia adest, facies pallet, pedes tument, praesertim sub vespere, ut in Anasarca. 4º. Urina fit tenuis, et abest febris.

Causa utriusque est obstr: et habitatio à sang: viscoso, crasso et terrestri, quae si contumace sit, ob firmam cum tempore partis cohaesionem, et ob subtilium et mobilium discussionem, in Schyrrum degenerat, i.e. in tumorem durum, situ et forma jecoris circumscriptum (aliàs ac in Schyrro externarum partium abdominis) cum decubitu in lato affecto satis facilis ob ejus indolescentiam, sed in opposito difficilis ob gravitatem Schyrri alia viscera premente. | Causa

Obs. 1º. Obstr: Hepatis exacte coincidere cum imbecillitate hepatis pituitosa, nisi quod cum Hydrope aut Anasarca quadrat.

Obs: 2º. Schyrrum exquisitum ab humore sic. terrestri rarò et nunquam, spurium verò ab humoribus mixtis, cum vi aliquâ corrosivâ, saepissime in Cancrum degenerare. (et potius ulcus) | Cura

in viscera restituit: chalybs & tartar. opt. remedia ... mas.

Cura. ... Amon. ... Bals: Lucat. interne, et Empl: ... extern. apl. ... 2das.

Chalybeata maxime prosunt in Schyrro hepat: ut et Cons: fl: Marrub: facta cum melle, cujus ʒi exhibeatur mane per 40 dies. Et: ferrum ignitum et ... extincto opt. cum ... duro et scirrhoso ... Beard ...

Cura harum obstr: fit 1° et 2°. in pede. 2°. Apozem: et infusione ex iis in Sero, vel ex polypod: fumar: rad: capari, hellob: nig: &c. 3°. pil: aperient: praecipue Gum. Amon: cum sale chalyb: vel tartari 4°. solubus, ut in Sero, ut et Empl: de molil: et gum: Amon: 5°. Balneis, cum sulph: sale, nitro, *co, &c. 6°. Bez: miner: et ♀ d. ℈iiß pro sex dos: quae nec purgant, nec sudorem movent, sed fermentationem promovent. Quae omnia sed majori dosi usurpata in Schyrro tam bene quam in obstructione conveniunt. Asplenii Cataplasm: et Dec: sp: vini, Empl: Carmin: Sylvii, Lieni prosunt. ut et Empl: de molil: comp:

Cap: 4ᵗᵘˢ.

De fluxu hepatico, seu Imbecillitate Hepatis Pituitosa aut potius serosa.

Est affectus in quo cruda et fetida, ut abori excernuntur, nunc instar loturae carnis, nunc instar sang: nigri coagulati, Cachecticis, scorbuticis, Colliquantibus, febribus malignis et Variolis (praecipue circa diem 15. ubi lethalis est) plerumque accidens.

Causa. Causa est vel sang: fermento destitutus fermentationem patiens, vel est humor serosus jecoris textum destruens et corrodens, unde bilis et sang: non filtrati ad intestina per ductus Cholidochos amandantur: Quae putredo aliquando tanta est, ut in ea digitus ad articulum usque intrudi possit; pedes etiam fiunt oedematosi et pruriginosi; vinum expetitur, quia febris vaporem exigit; naris etiam adest haemorragia, ob humoris serositatem.

Cura. Cura fit moderate aperientibus, Hepaticis dictis; cum acidis et moderate astringentibus (ne vasa nimis aperiantur) ut rosis, fucis, santalis, cum lignis sudorificis, et si purgantia exhibeas, sint ex genere astringentium, qualia sunt Rhabarb: Myrobal: Tamarind: glene.

Cap. 5.

De Affectione Hypochondriaca.

Nosologia. Oritur hic morbus a deficiente comminutione Chyli, sang: et humorum (ut etiam postea dicetur in passione Hysterica, cum plurima utrisque symptomata sint communia) a qua illud acidum quod in ventr: et intestinis et forte in Lieno Hypochondriacorum aliquando observatur, producitur; cessante enim motu et comminutione, ob stagnationem in iis partes in acidum convertuntur; hincque intra vasa febris sanguinis minus comminutus incipit paululum cumulari, hincque partes ab eo expirantes, cum minoris sint impetus, excitabunt brom=

[...] ob hos species viri et foeminae valdè obesi ... conveniunt Frictiones quotidianae: Balnei enim frigidi usus ... iis licitum est. Trull. 218, 155.

tremores minus vividos et rariores, adeoque Melancholiam morbi; aliquando etiam apoplexiam et Epilepsiam; et ob rariores et parciores separatos exhalationes Sang: Sp:, longo intervallo temporis prosecuto ne ex massâ tenaci protendes, rariter et debiliter pulsant Cor et Arteriae; et ob tentorem in Ventr: Intestinis, et praecipuè Colo sinistro, Apepsia, Flatus, Ructus, et Borborygmi oriuntur; in pulmone verò difficultas respirandi; in universo corpore lassitudo spontanea et gravitas, alvi pigrities, Urinae tenuitas; et si acerbitas et austeritas conjuncta sunt, dentes strident, fauces constringuntur, Cor palpitat, aliaque adsunt Hystericorum symptomata.

Nott. 1º. Omnia Hypochondriacorum symptomata pendere à Ventr: Colo, et Liene, (cujus pullatur enormis observata, politissima ad Art: splenicâ, deducenda est) quoniam Lien parum in hoc morbo, aut etiam in sanitate servandâ vel mutandâ adferat, ut patet in iis ex quibus Lien tutò eximitur, ut ex canibus.

Nott. 2º. affectiones Hypochondriacae, Hystericae, et Scorbuticae Melancholicae, in quâ Dr. Willisius, Ulcera et eruptiones cutaneae minimè infestant, sed praecordiorum anxietas, gravitasque ancholosa) eandem prorsus esse rationem et curam.

Cura eis difficilis sit, et morbus Balneorum Diaboli dicatur, fit 1º. Vomit:ˣ non ex V. Emet: (quia multi vires sine animi deliquio ferre nequeunt) sed ex Centaur: min: Mij coctis in aquae lbij ad lbj. Cujus ℥iv. cum V. Emet: ℥ij, et oxymel: squill: ℥i hauriat paliens, superbibendo post dimidiam horam seri lactis, partitis vicibus, lbij, pennâ gulae imbutâ revocandas; dein tantundem mixturae dato, et sic procede quoties vis. 2º. Apoz: ut in Melancholiâ. 3º. Clyst: et pro faecibus induratis, et pro doloribus, ex Urina cum colocynth: fol: Senn: sale gemmae, etc. 4º. purg: (praemissis pil: aperient:) alvum solummodò apertam servanti, quia Hypochondriaci purgantia fortia non ferunt, ex fol: Senn: pastul: sale tart: vel ex syr: de Epithym: spinâ Cerv: vel conf: Hamech. 5º. post purgationem Chalybs exhibeatur in substantia, vel potius in infuso ex absynth: Cent: min: aa Mij; Sem: Card: B: ℥iij, rad: Gent: (vel ejus loco Cort: peruv.) limat: Chalybis aa ℥vi. aq: Lactis Alexit: lbiij, aq: absynth: lbjß, Cujus cochlearia 4 aut 6 dentur pro dosi, unoquoque mane. 6º. ex ... Ludov. ℥i jejunans, post horam altera, postquam deambulat. ... Lact. ... dicalicis Boerhaav.

Fr. Hoff. ... vel ... aegrum et nihil profuit Vº. 3. purgans, sudorifica, et sim. est enim morbus spiritus et praeterea nonnulli, qui ubique Exercitio animario corroborantur et meliorantur, ut viri etiam in pauperibus et Laborantibus, qui Hypochond: et Hyster: et affectibus nervosis raro tentantur. Optimo ergo Remedia sunt Exercitia, ut Equitatio, Rheda, Balnea frigida post Equitationem diu ... fatigatam ... pro foeminis ... Chair. scala. Trull. 139. ... Sydenh. op. 521, ad 524. etc. in Hypoch: ... Anatolica Chalybis utu ad menses 4, 6, 8; vel plures ... Dolor ... ... bole ... Melancholiam ... Chrysost.

Cura gr: vij
ˣ Tart: Emet: vel sulph: auri m: Glauc. gr: V.

gr. flatibus Hypochondr: Dos: 8, et aliquando saliva: tio, est Polerp. 68, 7.

ˣ plus prodest in initio quam sine vacuatione morbi.

Ita amara Lower. Glauc.

Ferrum ignitum aquâ, vino, et oxycrato extinctum est et salutissimum Medicamentum. Zoar. Lib. 1. 7. 9.

ad gr: VII. pro 5. & 6. noctibus, purgando inde quatque lenes dolor; bibendo interea Dec: amar: sine Senna, aut Dec: fl: Chamaem: 7o. pulv: testaceis. 8o. pil: aperient: cum coll: peruv: limat: chalyb: sale tart: succini et Laud: 9o. opiatis pro dolore, ut in aliis morbis Hypochondriorum. 10o. Balneis aliisque in passione Hysterica.

Cap: 67.

De Calculo Renum et Vesicae.

Causa Calculi cum difficilis sit, in varias circa eam opiniones dividuntur Authores. Quidam ex consideratione quod nulla constitutio determinabilis ab hoc affectu libera sit, et quod nec calor, nec frig., nec arenosa, nec solida in quibusdam culpanda veniunt, Spiritui cuidam lapidifico, liqua ipsa in substantiam durissimam coagulanti, hunc affectum attribuunt. Recentiores vero ex eo quod per Chymiam observarunt salem volat: urinosum, acido fixo commistum, in corpus durum facessere, simile quid in corpore ex acido peregrino salem volat: urinae figente fieri posse asserunt. Sed 1o. salis unio seu coagulatio nil nobis adferret, nisi salem Armoniaco similem, longissime a Calculo diversum; Cumque 2o. Calculus humanus majorem deberet portionem acidi fixi et coagulantis praebere, quam Urina ipsa (quod est contra experientiam); Cumque 3o. In omni Urina sal sit acido saturatus sine ullo tali effectu; et cum nullam rationem habeamus allegationis accessionis novi et peregrini acidi, ut volint Authores, ut eum producat; Cumque 4o. separatio salis volat: et acidi fixi in corpore, ut in Chymicis Laboratoriis concipienda non sit; Idcirco, Nos ex consideratione 1o. quod Calculosi plerumque sunt Podagrici et Asthmatici, 2o. quod non bene coquentes, nec Stomacho valentes, adeoque cibum et chylum comminuentes, hoc affectu (contra sententiam primam) laborant; et 3o. quod nimius usus casei, et sim. dolorem Nephriticum semper augeat, Calculum nihil aliud esse existimamus, sive nil aliud ad ejus generationem requiri, quam congeriem plurium partium urinae durarum, sive liquore viscido unitarum, sive canaliculi renalis angustia et compressione, plus forte nati (cum in Calculo haereditario obnoxiis fieri potest) coactarum. Quippe cum in

Primo & deinde molesti, in primis vers. vel merg: aromaticum attentans, quaedam pil. bech. mass: ad ℈i & ʒi. — Deinde puriss. ferrum in scobem limatum, recens, non rubiginosum, diu in M. V. tritum, ut asperitas evanescat, vacuo stomacho ad gr: IV. & VI. bis quotidie, exercitatum motu corporis adjuvante, victu tenui incitato; potu vini generosi Rhenani aut Gall. Vid: fortioris, roborante; caveat ab aliat: salibus, fixis & volat: simplic. & compositis, etc. Boerh. Aph: 27, 34.

^ Boyleus.

^v Van Helmont, Vauquion, Harr.

In Urina sunt sal. vol. urinosum nitro sim. et Sulphur purum Sp. vini sim. Calculusque formatur a Sulphure vinoso sal vol. coagulante, quod probatur per mixturam Sp: vini et Sp. Urinae perfecte dephlegmatiorum, unde fit substantia dura et sicca, offa alba dicta. Van Helmont de Lithiasi. Vaug. Harr.

^ Pitcairn.
Hippocrates.

vid. Pitc. prax. de Calculo, ubi Attractionis doctrina in ejus formatione, p. 77. etc.

Sanq: continuantz partes duræ ex cibo et potu elicitæ, et cum hæ cæteris sint graviores, debent ad loca minimi motûs deponi, i.e. circa articulos (in podagrâ) vesicam folleamq sed sæpiùs in canaliculis renalibq, ob majorem eorum numerum; nam licet in cerebro sit etiam minima vis motûs, ad id tamen partes viscosæ faciliùs feruntur, quæ non sunt adeò graves, ac eæ quæ propriè dicuntur duræ. Hinc fit ut pluribq partibq duris intra canaliculos angustos et compressos hærentibq, crusta fiat respondens formæ locis quæ tandem rupto canaliculo ob magnitudinem et gravitatem in pelvim renalem excidit.

nim: in Brutes.

Signa 1o. sunt mictus cruentus, ob dilatationem canalis secretorii. 2o. Dolor nephriticus, cum si ullæ parti pelvis tamdiu adhæreat, donec novæ crustæ superinducantur, quæ ureteres nec ingrediantur, nec facilè pertranseant. 3o. Vomitus (cum calculus sit in rene) per ureteres et ventr: eosdem habent nervos, ex ramo sexti ... paris, ob sp: valide versus cerebrum per nervos pro dolore refluxum, et eorum dem derivationem et delapsum plus solito. 4o. Dolor intensissimus, ob sensibilitatem membranæ ureteris, ejusdemque à pressione seu inarvatione exacerbationem. 5o. Stupor cruris è directo partis affectæ, quia musculus ob viciniam afficitur. 6o. Retractio testiculi in eodem latere, ob consortium membranarum cum cremastere. 7o. Imminuta urinæ mictio, et aliquando ejusdem suppressio, ob canaliculos renum obstructos aut compressos, et semper minus spatii sero secernendo concedentes, per ob consortium membranarum et nervorum, quoniam unus solus ex renibus sit calculosè affectus. 8o. Emissio arenularum, nunc rubrarum, quæ in calculos magnos rarò aut numquam degenerant; nunc aliarum coloris, cum mâa viscidâ maluto etiam vitreo adhærentes.

Signa. φ Obs: de calculo Simus et 2das. mictus cruentus ab imbecillitate renis, ex omnibus aliis frustra adhibitis, curabatur intra 3 φ ψdies, haustu quotidiano lact: vacc: recent: mul: cto supra ramos menthæ rubræ, coagulante ex casei dulciorato (sc: gelatinâ, sapâ) cydon: et syr: cinam: majori; in eo proluunt. φ S. succ plant. propinatur. Dec. et consowr. rad: consolid: maj. Dec: malv: et alth: ex astring: et agglutinantia, item vulneraria, ut Bals: Lucat: φ postea in obs: 2dis.

In calculo vesicæ præt signa primum, 7mum et 8vum, adest 1o. nunc dolor nunc gravitas in hypogastrio. 2o. Dolor in excretione urinæ, præcipuè in virgæ extremitate, per ob communicationem membranæ interioris vesicæ cum ea urethræ, per ob abrasionem muci urethram obducentis, à transitu arenularum et urinæ, unde punctio subsequitur; per à pressione calculi in vesica collum, per à collapsu vesicæ repletæ in calculum [illegible]

Cura in paroxysmo fit 1o. φ S. in ætate florente et robusta. 2o. Clyst: vis per loc in die, ex dec: ut dolores silis, et vomitus minuantur. 2o. Clyst: ex dec: alth: malv: virg: aur: saxifrag: rad: ononid: bac: alkek: sem: bardan: apii dulc: dauci, cum lenis: lon: ℥ß et Elect: lenit: ℥j. φ soluta in vitell: ov: Clyst

Vannol. ad. Sect: 7. c. 3. praxeos. φ 3. part: Pharmacationis.

L. ... φ Lithontriptica et aperientia obsunt magis quam prosunt: confer: ubi Emoll: Lax: antia et Anodyna.

+ vel ex Dec: alth: lanugi: ficuum, furfur: Chamom: et ol: Chamom: vel Lin:
vel Clyster sit ex ipso lacte recenti. 3°. Mixt: ex aq: petrosel: Saxifr: Ononid: Raphani, et sim. cum pulv: Millip. sale tart: occu: Cancri, Laud: sale Ononid: et Syr: Alth: 4°. Hordeo infuso, sed= gisterio dicto, Anglice Draff, regioni lumbari applicato; vel Ung. ex Dialth: ol: Scorpionum, Lini, Amygdal: vel ovi loco, æger sedeat in balneo dedoal, et interea Dec: fl: Chamom: fortissimum ut saltem proxime fiat, cum pulv: millip: et Lumbricorum propinetur. 5°. Ptisana pro potu ex rad: Alth: et sem: Violarum, Syr: viol: et limonum e= dulcoranda. 6°. purg: laxante ex Elect: Lenit: terebinth: sale genist: et pulv: millip: vel potius deleto pulv: in minimâ materiâ, ne vomat, ex ☿ d: resin: Jalap: et troch: alhand: 7°. frequenti exhibitione Salis absynth: vel tart: vitriol: vel Tra Cantharidum. Quibus non pro= ficientibus, Emetica est exhibenda, ut contractione violenta e= co deturbet Calculus. 8°. Specificum est pulv: fol: ulm: ℥v. pulv: fol: ficus sylv= vest: ℥ij in vino albo exhibeatur. Bagl: 66. sperma ceti et millip: junct. et Scorp: pro lumbric:

Extra Parox: conveniunt 1°. Diuret: Mineralia et Naalia qualia sunt aq: Spadana, Burbonenses, Moffetana, vel artificiale= a ex sale tart: ✱co, et sale vol: succ: in magnâ quantitate. Aq: font: Non quod hæc ideo prosunt, quod acidum tollant; idem ~ enim faciunt omnia acida; sed cum ob alias rationes sanitati mi= nus conveniunt, idcirco caute exhibenda sunt. 2°. frequens ~ usus terebinth: aut potius ✱ supbibendo Dec: Malv: 3°. Laudanum liq: in magnâ ~ quantitate, quo Harveus Calculos ingentes inter dormiendum excre= vit. 4°. potu ex sang: hirci, ut et ex Lacte, cum aq: hordei et sach: icato ex nyu. vi...diox. Trau... 5°. pulv: ex lap: Lyncis, qui Arthriticis opitulari observatus. 5°. pulv: ex lap: Lyncis, Ju= daici, et sim. quos tamen vix commendamus, quia Arthriticorum et Calculosorum sanguis partium durarum et cohærentium nimis magnâ habetur proportione præditus est, et saltem eorum canaliculi renales naturaliter nimis angusti vel parvi sunt. 6°. materialia sanativa. 7°. usus ℥ quotidianus. Bl: a Sko et Bagl. + et 8°. Balsa elix: Junip: Scrod. Infus: summit: pini + p. 67 in marg.

Cap: 7mum.

De Ischuria et Urinæ suppressione.

Quamvis hi duo morbi sint effectus plerumque Calculi, sive in Renibus, sive in Ureteribus, sive in Vesicâ sive in Urethrâ, idque vel eorum cavitates partialiter vel totaliter obstruendo, vel obturan= do, vel inflammando, vel vulnerando; tamen à sang: grumefacto, aliquo, ut et à Carunculis, Hypersarcosi, Inflammationibus,
Constantiam ... dedit illis in mulieres quæ menses per urethram ... evacuabat.

℞ ol: amygd: dulc: ℥ij. succ: Limonum ℥j. succ: Citr: ℥ij M. f. haust. q. aut sumatur ex vini alb: ℥j.

In dolore Renum ap= plicetur loco affecto spongia lineo oxy= crato imbuta.

Alsa, ut amygd: d. oliv: crato: destill. perfricanda, vel sola Laudanum. effect.

Drachma vitri com. subtiliter pulv: in ℥iij + 4. aq. ros. Chesneau observ:

Ol: Lini Cochl: iij singulis noctibus. Hamil. 114. + pur. R. + cum sperm. ceti.

Raph: Rust: Hortens: sylvest: aqua, Dec. Cat= tapi: Act: Hafn: vol. Vinum ex uvo ... exracto e saccaro.

Semen Lapathi ... amnes ... expellit. Bl:

vel Dec: ex mullo ... quo vi= num album diluatur, et comesto bibatur. Bagl. 83.

solutum in vi= tello ovi, et saccharo com= mixtum.

mullo uteg Balt: Lucat. sperm. ceti, millep: et mæalia sanatif: opt. Braid albin.

Urina nolia qualis Diana. Colonel Hill. Paullo aq. alida; mel. ... opt. ... Toiet cap. ult.

Lapis ... pulv. ... ℥ij et vino alb. propinentur. Pulmar: Cemaska= no, sepe in ... usu ...

Raph. rust: Hortens: Sylvest: Aqua Dec: Catapt. Act. Hafn. ... vol. 4. p. 129.

Pituitâ et pure in Urethrâ, sine ullo existente Calculo, provenire possunt. + operationem punctionis Perinaei, Hornes Vaag.

Obs: Si dolor et tumor sit in Hypogastrio, nec Renes, nec Ureteres, sed Vesicam et Urethram in culpa esse.

Cura fit iisdem ut in medicamine praeced: praecipue omnibus ex terebin: oleis, et interne et externe, ut et immissione Catheteris.
[marginal additions: Et: scorp: ad lumbos. Pulv: Millep: cum sperm. ceti. ... Sp: ... praesentaneo sunt remedia. Bagl. 93. + patiens duobus ... adstanti ... suffalg ac probo ... cabinet plurib: obam ... culet ...]

Cap: 8vum.

De Stranguriâ, seu Urinae incontinentiâ, Ardore, et Stillicidio. + Ruck Chirurg.

Est Urinae frequenter et guttatim excretio, cum dolore et ardore circa perinaeum et glandem, et constanti urinandi inclinatione comitata.

Causa est copiosum sal + acidum à sang: praecipitatum (unde Urinae flammeae et rubicundae fiunt) + ob varias cerevisias recentes diu haustas, + ob alias causas vix notabiles, ut calor, pluviae, frigidus, etc.

Cura fit sang: praecipitationem, mixturam, restantibus et acrimoniam diluentibus. Ut 1º. H. M. aliisque aromatis in vino generoso, vel cerev: pingui et recenti. 2º. Sp: terebin. ad gtt. x in singulis haustibus. 3º. Dec: ex Alth: aliisque emollientibus, cum paucis Diureticis ut in Cap: 6to. praeced. 4º. Pulv ex iisdem. 5º. Oc: Cancri, et sim. in causa praesertim acidâ, et Sp: Nitri aut Salis, in causâ salinâ. Sed loco omnium prosunt Sudorifera Alcalicis mixta, ut C: Cor: venet: etc.

Obs: 1º. Si sit à Cantharidibus, Emulsiones, Lac amygdalatum, et Lac prodesse, quia acrimonia solus et non praecipitatio, culpanda est.

Obs: 2º. Si sit à pure, ut in Empyemate, vulneraria ibidem praec. esse.

Obs: 3º. Urinae Enuresia seu Stillicidium involuntarium sine ardore et dolore, + vulneri vesicae, + esse maxima ex parte incurabilem, cum Urinae diuturnae retentione Cut: Vesicae et sphincteris fibrae magis + minus + distendantur, disrumpantur, et contractionis vim amittant, quod pueris in Scholâ accidit, et saepissime parturientibus, ob caput foetus in Coronâ ... impediens) sueti diem unum aut alterum urinae totaliter ... Urethra ... cedit; vix enim putandum est Vaginae + Urethrae ... hoc malum posse producere. ... omnes culpant ... + Ruck Chirurg. Instrumenta commoda.

Cap:

---

iisdem. lini ℥j. m: fund: in aq: font: lbj. + 24 horas. colat: bibe ℥iv. mane, meridie, et vespere.

℞ Millep. praep. ℈j. Aq. petros. ℥j. M.

Cura.

Alii, et sim. in polist...

Catheter, flexibilis in Hyp. sarcosi.

Dysuria et difficultas urinandi cum Urinae ardore comitata etc. + Bl.

Causa

Cura.

De Urinae ardore + Obs: 2das ad hoc caput.

pro urinae ardore: Decoct. gum. arab. ℥iij. coq. in aq: font: lb iv. adde Syr: alth: ℥iiij. ...

gr: 1, 2, + 3 in pulv.

in ardore conveniunt Emulsiones, Sal. Frigida, aq: ...

Urinae incontinentia vitro suâ urinâ repleto apud Dementum in fontali capulo recondito. Act: Hafn. vol. 3. p. 17.

... instantias attulit.

Balneum ex Dec. cort: querc.

Cap: 9um.

De Diabete.

Est urinæ nimius profluvius, vel ob serum nimis attenuatum, vel ob canaliculos renales (et forte etiam aperturam plus solito pororum intestinorum intro foras, et foras intro spectantium) nimis dilatatos, vel serum nimia quantitate scaturiens: vel ob vasa sudorifera externa nimis constricta, vel ob copiam salinarum et spirituosarum particularum a sang: projectarum, quo in casu liquida profluunt. Bibl: p. 516.

Cura, nisi supervenerit hydropsis, quod raro, sit, 1o. (nisi transpiratio inhibita causa morbi fuerit, et sudoriferis tollenda) Apozem: ex rad: Consolid: plant: Borras: Bugl: eorum herbis, et foliis, Sem: Sumach; Flor: balust: ros: et sim. quæ omnia astringentia sunt. cum aq: ferrata, 2o. Camph: sach: Sat: et omnibus Martialibus et Nitrosis. 3o. Viscosis et mucilaginosis, ut Lacte, pultibus, orizâ, Sthiccolla, portulacâ, Lactucâ, et sim. vide Bibl. p. 516.

Aq. Calc. vel Aq: Benedict. B. simplex vel compos: opt. Dos. ℥iij vel 4. ter de die.

Cura vel diaeta, et Dec. ex lignis, imo et sher: vel aliquo Glom.

Cap: 10um.

De Ulcere Renum et Vesicæ.

Sunt affectus ardore et stillicidio urinæ purulento comitati, cum dolore circa Lumbos in primo, et circa pubem in 2do.

Causa, sunt vel Calculi ut in Medic: 6ta. vel Inflamma tio (ut in Inflammationibus Hepatis et Lienis) curanda.

Cura sit 1o. Detergentibus consolidantibus mixtis, ut Bals: Lucatel: ter benthinatos, cum Cassia, Dec: ex lig: cum paucis paucis diureticis: 2o. omnibus ex ros: Hyperi 3o. omnibus ex tragac: 3o. Aq: Mineral: 4o. omnibus ex ros: Hyperi 5o. Injectionibus, si vesica sit affecta, ut in Gonorrhæa virulentâ.

Causa

Cura

x quæ opt. sunt in omnibus ulceribus internis.

externe.

Sect: 4ta.

De Morbis partium Generationi inservientium.

Cap: 1um.

De Gonorrhæâ simplici, et non virulentiâ, sæpe Dorsali dictâ.

Est involuntaria, assidua, et insensibilis materiæ aquosæ, et crudæ ver semen profusio, præsertim in tempore faeces ejiciendi, cum lumborum dolore, pallore, extenuatione, et tarditate in omnibus functionibus:

Causa est elevatio nimii ponderis, vel Coitus nimius etiam cum furore, contribuente fortasse sang: nimiâ aquositate, et aliquali acredine, et obstructione in nervis Generationi dicatis, quæ

a venere, et gemitu, ... ex prav. Hu...

Tripl...

Causa

℞ mass. pil. Rud. ℥i. ʒß
    Coch. min. ʒij ʒi.
Resin. Jalap.
Diagrid. —— ā ʒß
Merc. dulc. —— ʒi. ℈ij
Opobals. vel Bals.
  Capaivi —— q. s.
e sing. drach. f. pil. No. 7.

Dos. pil. 5.

To mr B— at Paris.

℞ mass. pil. Coch. maj. ℥i.
Resin. Jalap.
Diagrid. —— a ʒß
Merc. dulc. —— ℈ij.
Bals. Copaiv. —— q. s.
ex singulis drachm. f. pil. No. vij.
Dos. pil. iv. mane, cum regimine.

Quibus de causis, cum non adsit debita mora, et coitio debilis in vasa: stilis, nec ejusdem cum sp: impregnare, semen fit infertile et sine voluptate.

Cura fit iisdem remediis, quibus aliae excretiones liquorum liquabilis, praecipue sang: sanantur, ut 1o. purg: ter vel quat ex terebinth Rhab. vel ex Myrobal: et Rhab: tosto 2o. astringentibus ut pulv: ad castr, ex Mumia, spor: caliis Rhab: sang: drac: camph: sach: sat: 3o. cons: ex iisdem et sim. cum cons: ros: succino, santal: rub: sem: agni casti, et sim. cum lacte et aliis bonis succis.

Si ijs acrimonia adsit, Balnea multum prodesse et semicupia ex herbis astringentibus.

Sed 2o. curam esse difficilem, cum nec laxitas nervorum, nec partis partarium (si in ijs solummodo vitium sit) nec tota sanguis, si omnia aquositas et debilitas in causa sunt, restitui facile possint, si non diaeta continua ex lignis, cum paucis fermentatis et astring. ut santalo rubro et citrino, qd opt. solent.

Cap: 2dum.

De Gonorrhoea virulenta et Lue Venerea.

modo prius gtio se seqq. Bagl.

In prima adest 1o. Mat. purulenta et sulfida varior. color, ut flavi, grisei, viridis, vel pene proluvie. 2o. ardor urinae praecipue in fine mictionis (Gallis chaud pisse) 3o. seu incurvatio a lateris. Convulsio penis (Corde dicta) 4o. caries vel ulcera pudendi. 5o. pustulae glandis, herpetes, erysipelata, hanc et illam partem, sed praecipue scrotum occupantes; Bubones in inguinis. 6o. capitis et artuum dolor, praesertim nocte. 7o. spaucium ardor 8o. Hypersarcosis aliquando urethrae, urinam totaliter supprimens, vel partialiter tantum. 9o. exostoses et ulcera tum omnes corporis partes occupantia. 10. subcavitas oculi tumet, pallet, et micat. Bibl. 20.

Luem venerem iisdem lignis, excepta Gonorrhoea, sole manifestare, adeoque adstringentia a Practicis praescripta pro Gonorrhoea, eam in luem venerem convertunt, quae idcirco vel admodum caute, vel non omnino usurpanda sunt, nisi ut diximus in praecedenti morbo, ... forsan dicto. In Gonorrh. virul. ... in pil. purg. ... in toto ...

Cura omnis Gonorrhoea in principio fit 1o. purg: vel ex ... cum sem: ... molit. et sale tart: vel ex ... cach. et Ext. Rhab ... vel ex cassia terebinth: et Rhab: quae commendantur, bibendo inde purgando serum lactis, vel cerev: tenuem, vel vinum album Gallicum cum aq: cum ... sal: prun: ter vel quat in die. 2o. post quinque vel ... laxis purgantibus (quibus, nisi tempestas sit mala, egredi ad negotia poterit aeger) et ardorem urinae et fluxu sese mitius habente, vel quoad colorem, vel consistentiam, vel quantitatem. Boli sumantur ... si adsit inflam. penis ... Ardori urinae conveniunt emulsiones, sal: ... aq: plant: ex ... sal: ... aq: ... ros ... in die ... eorum ...

Rx Zedoar. ... rad. ... ana ℥j infund. per noctem in lb iij vini albi, colat. fiant 6 doses, ex matutinis ... infall.

Cura

Rx Rad. ... exsicc. ℥j cum vino rubro hauri quater ... Baldi.

... Acta ... Cons. ... p. 217. et seq. ... 200.

Diaeta in Gonorrh: sint caro vervecina, vitul: pullorum, cuniculorum, ex panad. potus lact. p. 1. cum aq: ... p. 3. ... condita, fructus horarii, pisces, capones, ... caro porcina ... in Lue: ... panatella, cerevisia tenuis tepida, ... pullorum, et sim. ...

Si ... in principio ... modis ... in initio. ... diaeta et modica ... sint in usu ... aq. pro potu ordinario, ptisana, ... ex hord: vel avena, cerev: tenuis tepida ...

Left margin (vertical): ... Ruf. ... Bibl. ... Dom: cal. ...

[illegible] B. plurimus [illegible] ... [illegible] remoto [illegible] exhibitus [illegible]

ex Terob. partibus 2bus v 3bus, et Rhab. parte una 1/6. v 7. dies: in terea lacti tepido, v Dec: malv: et alth: immittatur penis convulsa saepissime, et pro testibus inflammatis sit Cataplasm: ex fol: [illegible] et [illegible] bali in aceto coctis, cum Camph: v applicetur Empl: de Ranis cum [illegible] gio, v illinatur pars ol: Guajaci. Haec si faciet infectus sanabitur, praesertim si primâ vice fuerit et eo contig., si ad Dec: ex lignis [illegible] et Gum: Guajaci ad ʒi pro dosi [illegible] aliquot dies recurrit habeat. At si Ulcera infestant, addantur [illegible] purg: sive pil: sive bolus, [illegible] viri dis Serodori gr: 3. v 4. (praesertim si aeger sit robustus) qui emeti vomitus inde sequentur. 2°. [illegible] d: et purg: ut in Gutta serenâ exhibi lis (si Gonorrhoea absit, imo si vis, eâ praesente, quamvis in Gonor rhoea plerumque sit inutilis) bibendo interea dec: tenue ex Guaj: fol: malv: et Viol: cum pauxillo Glycyrrizza.

Alias si aeger non curetur, v potius si ex morbi severitatem de successu ullo modo dubites, praemissis aliquibus purgantibus, sali var. instituatur, inungendo dorsum, Lumbos, scapulas, plantas pedum, volas manuum, et articulos extremitatum corporis ʒj Ung: ex axung: porcin: recent: ʒvß [illegible] crudi ʒij et ol: Laurini ʒß pro unâ nocte; idem repetatur pro secundâ, et sequenti mane inspiciatur et quaeratur, si gingivae ullo modo v tumeant, v dolescant (eo enim in casu ab ulteriore frictione abstinendum erit, nisi saliva nimis lente pro cedens unam aut alteram inunctionem in posterum postulet) quod si non fiat, inungatur ut prius: Quae tres inunctiones v plerumque sufficiunt; sed si signa praedicta nondum appareant, necesse est ut plures in stituantur. Quidam enim dantur, qui difficultèr ad salivationem dedu cuntur, (pro quibus praevius Balneorum humectantium usus, à Gallis [illegible] omnibus utilatus, fuisset proficuus, et Vomitorius ex gr: 5. v 6. Turpethi Mi neralis maxime prodesset) Alii facillimè, imo post primam v 2dam inunctionem. Ego vero Ung: magis parce usurpo [illegible] ad [illegible] [illegible] Polag: et [illegible] cum cons: ros: v (si ulla alvi fluxus ad sit) cum Dia sc: et Laud: singulis noctibus praebeo, progrediendo à gr: X, XV, ad XX v XXV donec signa salivantis praedicta appareant. Inde salivandi caput tumet, dolent parotides, et lingua, os fit aphthosum, et aliquando in tan tum corrosum ut sang: emittat in satis magnâ quantitate. [illegible] p. 85.

Si Saliva sit nimis magna, et malis symptomatis stipata, ea Clysl: v catharticis paulatim est sistenda, v bolo uno aut altero ex [illegible] [illegible] et [illegible] sulph: āā ʒß et interea Gargarism: emollient. ex rad: alth: Laurum fulminans ad IV. v V. gr. [illegible] exhibitione Diascord: ʒißnonnunquam et [illegible] in vino [illegible]

Lues vener: infantum curatur gr: j [illegible] albi aut gr: j [illegible] d. [illegible] inunctione parcâ cavendum in iis salivatio, ne ore [illegible] sugere renuant. v [illegible] albi exhibetur adultis cum salivatio non incendit v [illegible] militoria et [illegible]

[illegible] Gravidarum salivatio tuta. Glen. et Mauriceau [illegible]

Exturbatio [illegible] chimera est, nam dosis exhibetur semel in [illegible] manâ lue venereâ curatis. sed si exurgant tubel, [illegible] modo est plerumque spirationem [illegible] diaeta ex lignis.

℞ Guaj: ʒj pro Dosi, cum ol. guaj: [illegible] [illegible], post [illegible] [illegible]; quod etiam facit aurum fulm. Dos. gr: iij. Glen. oia supra scripta.

℞ v axung. porc. ʒij [illegible] crudi ʒj. [illegible] Ung. pro 3 noctibus. [illegible] et si post inunctionem salivatio non procedat, exhibeatur Turpeth. Min. gr: 8. v [illegible] ℈. in cons. ros. si languida evadat salivatio antequam dis pareant symptomata, [illegible] [illegible] salivatio moderata ad [illegible] 4. in 24 horis. [illegible] symptomata [illegible] [illegible] [illegible] Diaeta sit qualis in [illegible] [illegible] Post curam [illegible] ne morbus recidiva fiat, semel in septimanâ exhi beatur [illegible] [illegible] qualor v 6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Laud: [illegible]

Rad. Gentian.

Alt: Guaj: et fl: sulph: in aq: coctis, colluat. et. ✝ substituatz porcelia. ut oppbets ✝ig. mista.
Ulcera etiam langantz ✝ ✝ praecipitato rub: et Hamiltz aq: plantag: sach: sat. ✝ lap: infern: et sim: ety: ✝ praecipitato, ung: refrig. galeni, ung: sulitz, et ung: egypt. ad changroz.
per sarcosis etiam urethrae, ut in Chirurgia tractet. aq: sublimata opt: et dein ung: neapolit: et diapomph: curantur. Glepe:
Hic nullam non nem fatiunt curandi ✝ Gonorrhaeam ✝ Luem Veneream, longo Clysterz usu, ✝ Emulsione, quavis nocte reiteranda, ✝ injectione in pene ex mussilaginosis. et troch: albi Rhasi, camph: et Laud: quia cura ex ijs non certa est, aut ad minimz fit tediosa. De injectionibg pro ✝ roskam. ulatz Lac. ✝ Decocto: in lacte ex. ℥ Bals:

Hisce omnibg apparet Causam esse sal magis minusve corrosivz, nonnihil etiam volatile, pituitâ viscidâ immixtz, communicatz ✝ concubitz, ✝ forte etiam accubitz, ✝ suctionem, ut in Infante, ✝ Nutricem, et e contrâ. Probabile est communicari ✝ modz contagii, unde etiam aliter infantes 16 aut 8 annorz, ut accidit ind montanez, ea affici possunt; quare cavendz ✝ Ass: ℥ tetz. a Zombilugz sc ex infectis, sudor enim eorz et calor inficit, eodemz modo ac in scabie. Causa: capio: ℥iß ex vitel: oo: incorp: aq: plant: ℥ß M. pro Injectio:

De fluore albo Mulierum.

Est humoris viscosi glutinosi, plus minusve ad albedinem accedentis (sed aliqdo etiam subflubri, foetidi, mordacis, viridis, uterz exulcerantis) ex vaginâ uteri, praecipue ejg glandulis; aliqdo etiam ab ulcere interiore (praesertim si aegra sit cachectica, et Leucophlegmatica) proximaz profluvii; ob quod difficile est distinguere ind fluorem mulierz Gallicz et non Gallicz; prior tamen tenuis plane et serosg, et secundg ut dixi est semp viscidg. sed vix opg est tam accurate distinguere, cz raro serg ac in viris, possit fluor albg tolli, nisi remedijs Luei Gallicae propriis, ee ✝ naa efficit qd in faeminis magis qm in viris, sanguis bong ✝ inferiores corporis partes excernatz; sic eadem naa sanguine vitiato efficit, ut ✝ easdem partes inferiores excernatz liquor serosg, sed glutinosg (dolores tamen et Ulcera tandem inducens) contribuente glandularz in vaginâ laxitate, magnam seri copiam in se recipientium. ✝ obs. 1ma et 2da. et excerp: Bagl: ad p. 203.

Obs: 1o. Morbz hunc Gravidis 2do mense familiarem esse (quia uterg tz spongiosior et spissior, et vasa ampliora suntz) quia Infans sg se jactitans, corpg glandulosz premit, et humorem nocturnis pollutionibg maam praebentem, ex ijs exprimit. Non ergo putandz est, vesiculas seminales, ✝ totas ✝ ruptas, extra uterz in hoc morbo ejici.

Obs: 2o. Quinquagenarias in quibg fluxg menstrueg incipit sisti, varios humores, antequam vasa claudantz, solere emittere, qui tamen hunc morbz non constituunt.

Prognosis, In Viduis inducere solet sterilitatem, imo saepe in omnibg. In Vetulis, uteri procidentiam, ut et etiam in Gravidis in quibg sit cura palliativa. Cura
Uni procidentia duplex est, ✝ corono. uteri, fundi.

Cura.

Cura fit 1°. purg: leni, quat? rendita ex Rhab: et Mirob: ... in Genor: simplici 2°. Bolo ex gum: Guaj: ℥j. ☿ d: gr: vij. cum Syr: Cariophi: ... ex ☿ d: ℈ß cum cons: Salviæ ʒij, purgando sequenti manè post sinou... los bolos 3°. cum non purgat, assumat sero ... in bolo ... pil: et 4°. post frequentem ... bibat Dec: ... potu ordinario, ex lig: sudorif: cum santalo rub: ras: Eboris et C.C. cum fl: Lamij. et interdum 5°. utantur moderatè astringentia ex testis ovorum calcinat: rosis et Marte; ut et suffitu manè et vespere ex Cinnabaris nativi ℥ß gum: Guaj: olibani, Mastich: styrac: āā ℥ß pro ... suffitibus, ut et injectionibus per siringam matricalem, ex Aristol: Artemis: Matric: puleg: argent: āā ℥j vini rub: ℔v, coctis ad ℔ ... Myrrha et aloes āā ʒvi. Bals: sulph: ʒij. observando tamen, ... cum cautelâ astringentibus uti, et specialiter Balneis adstringentibus, ne scabiem, lepram et sim. inducant. pulamina ovorum calcinata ...

Marginalia: ... utatur Æthiops mineralis in magnâ quantitate. Dec. perwinc. ... in aq. ... pro potu. Balaustia ... Dec. cort. tamarisc. ... 4 pulv. ... ℥j. Corall. rub. ℥ß. ... haustus ex vin. rub. Math. Chem. Injectio Cockb. ... Observ:

Cap: 4um.

De Obstructione mensium, Leucophlegmaticâ Cachexia, et Chlorosi.

Hi tres morbi gradu solummodò differunt. In 1mo. fit mensium obstructio, difficultas spirandi, lassitudo corporis, cephalalgia, somnolentia, cibi fastidium, et stomachi compressio. In 2do, viz. Chlorosi, præter prædicta, fit Hypochondriorum inflat°, ventr: dolor, cordis aliquando palpitat°, et specialiter faciei et labiorum (à quo morbus nomen accepit) pallor, ut et Atrophia totius corporis. In 3tio præter prædicta, facies, genæ, pedes, et tibiæ tument, et aliquando totum corpus.

Progn. Inducunt sterilitatem, et saltem prolis morbositatem; interdum etiam tumorem et scyrrum; et si acredo corrosiva adsit, et præcipitetur à sang: scabies, Lepra, psora, et Elephantiasis supervenire possunt.

Causa est sang: et humorum tenacitas, viscidilas, et crassities particularum ejus nimia cohæsio, ob quod non ... partibus suis ... neque sp: sufficientes ab eo separantur, nec ad nutritionem est idoneus, nec ... obstructiones ubique generantur, sed obstructiones ... per octo dies ante tempus fluxus. + Bibl. 15.

Cura fit 1°. ... in pede ... Infuso, ex rad: Rub. tinct: Brion: Helen: solili 2°. Apoz: Dec: ... ex rad: ... Levist: āā ℥ß herb: ... āā ℥j. Aristol: ʒvi. Imperat: Angel: ... Artemis: melis: Matric: (et si vis cardiaca) Sabinæ āā Mj. calami arom: cort. aurant: āā ʒv. bac: Junip: ℥j, Lauri ℥ß, *ci ʒij, conv:

Marginalia: Pulv: ad mens: provoc: Bacc: Lauri, ... āā ℥j cum ... in pulv: ... ante ... jejunans ... à cibo ... horam. utatur hoc modo ... Prognosis ... Pulv: rad: Bryoniæ ... ad ℥ß. ... Cura ... ad ... Cura ... sufficiunt ... post unam aut alteram ... mensium ... vini ordinario ...

Chalyb: ℥j & ʒj. vacuo stom: in pectore & axillae. Bodi: p. loc. 15235 cordi: decoctis congio uno pro potu ordinario, & ex cordi: vi- leris & vini albi ℔vij & viij, si modo purgantia commiscere placet. usq continuato ott. & Aldr. vid. hic p. 50 in marg. cautio.

Alibi etiam debent addi Chalibs, si modo viscidilas major adsit, ut et rad: ari et asari, alijsq & in affectione Hypochond: & palpitatione Cordis, & pica, prout morbus in unam aut alteram inclinat. 3o. Dosi una aut altera, ante praedictam infusum, pil: faetidarum maj: (et By plurimorum vomitorio) 4o. pil: apor: nostris, & hystericis & plebejis Batav: & troch: de myrr: et boraec. 5o. ol: sabinae, succ: carvi, aa gtt: XV saepe sumpto, & Elix: propr: ex sp: ✱ci, ska croci et castor: 6o. sale & pulvi: placentae, cujus mirus est effectus. 7o. cucurbitulis, femoribus et talorum applicatis. & Bibl: 15.

Cap: 5. 7.

De Nimio Menstruorum fluxu, et de fluxu in Gravidis, et Lochijs. & abortu in Pract: P. 2.

Causa est & nimia sang: acredo, & motus, & ictus, & lapsus, & plethora in robustis, & sang: nimia fluiditas, et secretio seu praecipitatio. ob valorum earumque tunicarum tenuitatem in debilibus, ob defectum carnis.

Progn: In Atrophiam, Hydropem, et vertiginem degenerare potest, ob amissionem sang: et sp: paucitatem et tristitiam.

Cura non-praegnantis fit 1o. & S. 2o. purg: una & altera leni, ex Rhab: et myrob: 3o. astring: et narcoticis, ut in alijs Haemorag: ijs, praecipue Dec: ex cort: Quercus, ex pauco aluminis externe. Balaustia etiam opt: ut et troch: de Carabe. ut et cort: peruv: ex a sang: motitatio est.

Cura praegnantis ante debitum parturitionis tempus, fit etiam 1o. & S. 2o. defensivo ordinario dorso applicato, & Cataplasm: ex alb: ovorum, ol: ros: aceto, bolo, fuligine, et farina tritici. 3o. Ung: Comitiss: & Empl: contra abortum. 4o. Mixt: ex aq: plant: et myrtill: ex Cardo. 5o. bolo ex rad: plant: ex pauco sal: prun: & alum: Quibus si fluxus animadvertatur minui, astringentia tantum caute usurpentur, ne nimia adstrictio suffocarem Uterinam causet.

Obs: 1o. fluxum hunc in puerperis debilibus melius aliquo sisti corroborantibus, & crasitionem restaurantibus, ut omnibus ex Cinam: Cita ut ʒβ indies sumatur salvia, et sim. quale: ex ... et sim: ... fort: etiam peruv: in dosi & aliter, ex a sang: motione accedit.

Obs: 2o. fluxus hunc in Gravidis circa debitum parturitionis tempus mortem fatus minantes, ut et etiam Matris, Diasc: Cinam: conf: de Hyacintho, et aliis aliquot Laud: liq: (et By aliquos, potentissimis Hystericis, ut in Cap: seq: sed praeterim extractione foetus, et sic tractandus.

potus aq: ferrata cum pauco syr: Cydon. & Obs:

Aegrota decumbat quieta quanto corpus et animam et ulatum ... potione confortante et ... ex ... volatilium, ... et ... ex ... ovorum ...

Cura fit magis pubbus attenuantibus, subtilibus partibus, firmis interciali... ne de ... aut ascendant, et partibus firma et ... ... descendunt, sed ad inferna descendant. Gl... Ska d Ludov. ad ℈j intra hor: ... aq. et ... ambulat ... ex ... salida

— Ens Ven: ℥ij pro 10. dos. ... his in die, cum & S. in pede & obsoru:

Causa. ♃ Cort: aurant: ℥β vij. coq. in aq. font. ℔ij ad ℔j: & colat. sacch. q. s. Dos. cochl. ... quater de die.

Progn: ...

Cura ad Men: sistendas. ♃ Syr: plantag: acer: ros: ros: aa ℥j aq: acetos: cichor: aa ʒvi. m. et bibat & dies aliquot. & Alum: ... ℥j sacch: et ... pulv: cinam: ... ling. ... dies.

♃ Conserv: myrt: Mal. ...

Alum: in pulv... paulo ... vel ... ad ... ealorum ... sp: vitriol: et sp. ...

Dec: cort: tamarisc: ... fluxum sistit. ... laud: opiat. gr. 1 & ... dos. ...

In margin (vertical): Dos: quantum ... sacch: ... ʒj ... vel: Cinam: ʒvi ... quanta & post superflua tam tenui & ... & sig ... in die ex ... actu

pulv. vel pil. Helvetii in aq. forrata. | Dec. vinca per vinc. apud Cockb. vid. 2 meap. 43. d. d. Rastinica.

Obs: 3o. Effluxus hunc in Gravidis circa 6um vel 7mum mensem, est multò magis ardua, à me prædictis sistentibus semper tractari, donec nulla spes retentionis fœtus supersit.

Obs: 4o. Lochiorum fluxus nimius fomentis ex astringentibus, et Spec: Corti Haleroni, esse moderandus; sed rarissimus est casus, cum debitus effluxus sæpius desit quam adsit, pro quo remedia in sequ: Cap: erunt proficua. Injiciantur duo vel tres clysteres ex Oxycrato emollienti.

Cap: 6um.

De Partu difficili, et Utero post Partum affectibus.

Causæ sunt 1o. ossium innominatorum mala conformatio, vel ossis sacri parva vel nulla concamoratio. 2o. Mala fœtus conformatio. 3o. Mala fœtus concomitans. 4o. Situs ejus vitiosus. 5o. placenta et umbilici prior egressus. 6o. Mater morbosa aut macilenta, et ideo imbecillis, conatus validos edere nequeuntes. 7o. Fibrarum Uteri nimia laxatio. 8o. Aqua vel horam ante partum effluere solita, per dies aliquot ante ex effluxus. 9o. Alvus in intestinis nimis durus. Non vero hunc officiunt vel femoris luxatio (Uterum enim non premit) vel claudicatio ob tibiam breviorem, vel Calculus (quia elatior est Uteri cervice) in vesicæ fundo, vel funiculus umbilicalis, cum sit 32 vel 34 pollices longus, vel Membrana, eas enim rumpit fœtus antequam in lucem se propellere incipiat.

f. haust. Glanc: Ipse de Hypnoctino pro maximo dolore dorsi ante partum.

Cura causarum quinque priorum ad Chirurgiam vel maritum pertinet; ad Medicum vero nil aliud, nisi ut talia imperet, quæ vires musculorum abdominis vel aliorum, inspirationi inservientium, augeant, i.e. ut eorum contractiones fiant validiores et frequentiores, et ut superetur ossis coccygis, et aliarum partium circumjacentium resistentia plus solito, et ut sang: attenuetur, ut facilius et promptius rarescere et moveri possit, Qualia erunt 1o. Inunctiones ex ol: lil: alb: et amygd: et pulv: Zillam: saffr: decom: matricar. 2o. Epota emolliens pro abdomine, cum aliquibus hystericis: 3o. suffitus ex iisdem. 4o. Suppositoria vel Enemata satis acria: 5o. Mithrid: ʒj cum ol: Succini ℈j umbilico applicatum, ut et etiam ʒj cum tinct. Succin. gtt. xij interne datum. 6o. ... pulv: ex troch: de Myrr: et Borace aa ℈ij pro 2bus dos:. 7o. pulv: ... hepatis et fell: anguillæ cum croco. 8o. Mixt: hysterica potentissima in Cap: seq: 9o. pulv: Hiurnij ex Cinam: Myrr: rad: ... tinct: castor: Borace et croco.

Nota: Urinam reddat puerpera, si opus est, per cathetorem oleo inunctum ante susceptum partum difficilem. Maur: 343. l. 2. c. 30.

---

2 Troch. de Carab. Terr. Japon. f. pulv. in aq. forrat.

2 Succ. urticæ ℥iiij. bis de die. et applicetur spongia eodem succo imbuta, vel aceto et vino rub. pectini et lumbis. Riv. Chom.

2 pulv. torm. ʒj. Corall. rub. ʒß. Ebor. ℈j. f. haustus ex vino rub. mane. Chom.

2 Succ. vel pulv. Stercor: Asini, Syr: Myrt. aq. plant. ℥j. M. Semper ... Rod. à Castro Sennert. Chom.

Causæ: Dol: et annexæ: marg: antes internæ et externæ partes.

contra ad clyst. laxans adhibendus.

2 ... sacch: ... pic: grai: ā ʒvi. opij purif. ℈i. camom. ʒj. ... vomit. ʒj. ... succ. gut. XXX. extend: pro dorso.

2 Sang: hirc: pulv: ʒß. aq. papav: errat: ʒj. ... sal prun. ℈i. Syr: pap. erral: ʒß. ... ex ... pinguis, ... vini optimi ... ʒj. ... Et ... in corde: calid. ... ad partum in ... Bine.

... Histor. ... medic.

v. sc: ex aquam quæ cocta sunt ... ʒij

... Succin: ... xiiij. XV.

Ol. trifol. fibrini destill. regioni umbilic. inunctum opt. Acti Hafn. vol. 3. p. 131. ...

Pulv. algæ marinæ Martin.

Obs: 1o. Formula [tussim] nomine Fomiloris à multis maximè commendari, si ægri vires ferre possunt. Cap. comestio montani.

Obs: 2o. Et G. etiam in sanâ nimio sang: circa infimos ventrem prædita, aliqdo esse proficuam, ne nervi ab Art: graviditatis tempore nimis comprimantur, et sic liquidi nervorum impedito influxu in musculos, ut asserit Hoolorius. Quâ etiam de causa dicit spirituosa quovis horæ minutulo à fœminis allantibus sæpissimè data, exclusionem magis inhibere, qm promovere, præsertim in fœminis boni habitus. {N.B. Cl. Emplor: vini ad pustulas prodiderunt, et ii dolore compressi, exhumandi [illegible] superius [illegible]}

Ham. p. 7, 224. Obs: 3o. Laud: hic etiam præcipuè esse proficuum; quam ob causam Hoolorius, ex solâ vi rarefaciente, et non vi[illegible]ente, et sp: destruente, ægre affirmat. Nos è contra. {N.B. In fb: miliari genuit timor, frigus, opis. [illegible] damnosa. Ham.}

Uteri affectus post partus ordinarius est Lochiorum irritatio dolorifica (Grindings dicta) quæ dosibus aliquot spor: Colli, ꝑ et: amyg: dul: recenter extracto, ꝑ Doc: fl: Chamam: internè datis, curanda venit. Extraordinaria verò post partus difficilem symptomata, sunt 1o. Uteri dolor distentivus ob vapores in eo à frigore retentos, qui aliqdo ex uteri collo erumpunt ob eorundem qualitatem. 2o. Dolor uteri pungens ob acrimoniam vaporibus comitatam, qui Doc: Mixt: saeculis, Clyst: Empl: pilul: suffitibus hystericis, hactenus præscriptis, et adhuc in seq: cap: præscribendis, curandus est. 3o. Febris, præsertim Erratica, Intermittenti similis, sed incertis temporibus invadens (wedding-on-fall dicta) ꝑ ob Lochia intempestive suppressa, ꝑ ob frigus tempore transpirationem impediens, ꝑ ob motus, ꝑ ob lac repercussum, et sim. Quæ etiam prædictis curatur, et specialiter Cinâ Croci, Castori sal: vol: succ: sp: ✻ci, et sim. ex Laud: Vel alvus laxante, si ejus adstrictio sit ullo modo febris hujus causa. 4o. inferiorum quæ fluere debent ꝑ 7 v 8 dies, suppressio, quæ possint ex vino albo removendâ.

Obs: 4o. maximam partem symptomatum puerperas post partus laboriosas infestantium, procedere ex retentæ partis placentæ; et ideo placenta est semper inspicienda, et nullo modo obstetrici, quamvis religiosissimæ, fiat in re fides est adhibenda, ut sic solis talis ex pellentibus symptomata ista tollantur.

Obs: 5o. Omnia prædicta uteri symptomata sæpissimè etiam non-prægnantes infestant, ob solitam mensium purgationem suppressam, et sim. quorum cura ad alios morbos pertinet.

Cap:

Pitcairn sols. Hippoc. etiam [illegible]

aq. Lact. alex: aq. Ceras. nig: aq. Cin: aq. Cinam: hord: aq. [illegible] aq. [illegible] [illegible] sal vol. [illegible] p. C.C. [illegible] Empl. Suppos. [illegible] cuticulis [illegible] [illegible] caner. [illegible] pp. [illegible] pulv. [illegible] Ꝑ comp. Lap. Goentii, Bez. orient. antim. Diaphoret. et Julap. cordial. et stomachic. [illegible] aliquali in [illegible] suspicione, et [illegible] fluxum, convu[illegible]

Ꝑ Bo. miliaris [illegible] 2 spor. Colli, pulv. [illegible] canel. comp. à ʒj. Croci gr. v. [illegible] [illegible] aq. [illegible] adianthi, aa ʒij m. f. haustus. Lochia pollentia, et tolg [illegible] [illegible]

Dolor colicus post partus, sive [illegible] et Diarrhæa, est curatus, pulv. è chel. Canci. comp. ʒj v ʒ[illegible] et sal. vol. [illegible] gr. x. vel curatur Laudano cum sudorificis mistis. Hamil. p. 101, 103. Act. Hafn. vol. 3. p. 131.

[illegible] Dictamus curatur. Bl. [illegible] etiam mortuum, aut molam, expellit, sumendo pulv: [illegible] internè, in vino albo. ꝑ applicando externè in suffitu ib: [illegible] [illegible]

Cap: 7mu.

De Passione Uterina et Hysterica.

Quamvis, uti diximus, Hypochondriacorum et Hystericorum symptomata et Cura maxima ex parte conveniant, tamen hoc in Cap: ad minimum ea quæ huic morbo magis sunt familiaria recensebimus.

Est affectus in quo foeminæ syncopticis similes apparent, cum corporis prostratione, et exercitii sensuum totali vel partiali carentia, sed cum pulsu parum aut nihil mutato, ut et faciei colore fere ordinario, si non meliori, ut et cum membri nunc unius, nunc alterius jactatione, nisi in paucissimis, in quibus et pulsus et faciei color non parum mutantur, et corpus totaliter immotum jacet, semper tamen meliis respirant quam in syncope. Hæcque omnia vel fiunt post signa in Cap: obstr: mensium recensita, vel sanis ex minutissimis causis accidere possunt, uti per causas patebit

Causa sit 1o. semen mora collectum et corruptum in puellis sanguineis, idque vel in testibus ipsis (in quibus vesiculæ, quasi totidem vomicæ, pus flavum et viride, imo et aliquando nigrum continere observantur, præcipue si adstringentium nimius usus præcesserit) vel in tubulis Uterinis, vel in Uteri fundo, præcipue in gravidis, quia exitus per Uteri orificium per totum gestationis tempus non conceditur; quæ de causa cum Lochiis post partum sub formâ Steatomatum et Meliceridum excreta, obstetrices sæpissime fallunt; vel in hæc peculiari cavo ob fimbrias carnosas, et tubos angustos, vesiculas non admittentes, ad maximam sterilitatem reddunt aliquando. 2o. autem. 2o. Lochiorum et menstruorum, vel aliorum humorum in Uteri fundo stagnatio vel putrescentia. 3o. Sang: austeritas, ut in Hypochondriacis; vel ejusdem coagulatio, vel nimis parva comminutio a quacunque causa. Et quibus omnibus oritur 1o. Cardialgia, ob acredinem et austeritatem junctam. 2o. crurum imbecillitas, ob sang: crassum et viscosum. 3o. Murmur in abdomine (ob flatus) et aliquando dolor ob acrimoniam junctam, et ob flatus suos carceres infringentes cum impetu. 4o. Globi in faucibus per [illegible] apertis, vel a vaporibus diaphragma convellentibus et sursum vel [illegible] [illegible] aliis detinentibus (quod etiam fieri potest aliquando in virginibus ipsis, quam [illegible] non ab Utero, ob sua ligamenta) vel ab ejusdem musculos [illegible] [illegible] constringentibus et convellentibus. Unde etiam fiunt nunc fauces

Balneo aq: frig: curata in turcassonica. [illegible] melancholia 313.

vel Bl: Hyster: passio et [illegible] [illegible].

vel Convulsione et syncopen.

Si noctu Hysteria infestet, ægra surgat e lecto et per cubiculum deambulet. Hull. 50.

In hyster: affectionibus sæpius dosis vini generosi ejus potum [illegible] vid. [illegible] Hull. 143;

Causa

Nott. narcotica foeminæ Hyster: et præcipue puerperis, non sine noxa et incommodo sæpe exhiberi ad soporem inducendum. Harr: 157, 158. Opium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] strangulationis, et flatus eleganter. Harris. 101, 103.

℞ Cons. fl. borag. ℈ij. Castor. opt. ℈ß. Syr. carioph. q. s. f. Bol. horâ somni superbibendo Cochl. iv. Julapii sequent. ℞ aq. lact. alexit. ℥iv. pulegii. Rutæ ā ℥ij. bryon. comp. pæon. comp. ā ℥j. Syr: artem. ℥iß. m. f. Julap.

℞ Castor. opt. subt. pulv. ℈j. Myrr. elect. Gall. Ammoniac. ā ʒß. Crocus ℈j. Extr. Gentian. in aq. [illegible] comp. dilut. q. s. f. pil. mediocres. Dos. j. aut ij. hora somni, ad sopiendum morbum. Harr: 156. etc.

nunc fauces et pectoris constrictio et suffocationis metus nunc singultus, vomitus, convulsiones, suspiria profunda. Sed et morbi abolitio ... numeris fluxo è genitalibus, suffocatione tantâ ... humor auctoritatis et stipticitatis multum habeat, ut multi pro mortuis sepulti fuerint et corporis post paroxysmum lassitudo, ut in epilepsia ipsa. Dein Woolricus qui omnes hos morbos convulsivos oriri statuit à pressione cerebri factâ per arteriolas quasdam ~ sanguinem non satis comminutum ferentes, et sic hos et non illos nervos, pro inaequali spirituum distributione, promentes.

Cura in parox: fit 1o. Vesic. in crure & pede, si facies colorata et pulsus non multum mutentur. 2o. Sternutatorijs, & sp: salis ammoniaci naribus admovendis. 3o. Clyst: ex hystericis, & ex urina et hiera picra. 4o. ligatione abdominis supra umbilicum. 5o. motitio pro umbilico. 6o. Mixt: ex aq: pulegii, artemis: melissae, ... chamom: theriacal: cinam: aa ℥j tinctura croci, castor: aa ℥ij sal: vol: succ: gr. XV. Elix: propr: ʒß syr: artemis: ℥iß sp: salis ammoniaci et CC. aa gtt. X. 7o. pulv: sale & aq. ... humanâ. 8o. mixt: ex assa fetidâ Battei. 9o. si vires ferre ... 10. sal aut Bezoarticum Jovis. specificum. Bagl. 243. Pitcairn. ... appetitu ... matricis ... paucis ... Bagl: 209.

Extra parox: eadem prorsus conveniunt quae in obstructione mensium commendantur, et propterea pil: Hystericae Batei, ex sem: Rutae, assâ fetidâ, campher: castor: aa sp: aq: et guttis aliquot ol. succini. Suffitus etiam ex assâ fetidâ, ut et balnea et hystericis maxime prosunt. ex pauxillo vin: gall. cum deambulat. ... tinctura Sthudov. ad gtt. 60. & ʒj ter quaterve ... à laete Ital...

Obs: 1o. vinum, imo et sp: vini, plerisque Hystericis esse noxios, eo quod non satis fortia sint ad claustra obstructa perfringenda, sed tantummodo vapores intra suos carceres commoveant aegri incommodo.

Obs. 2o. Hystericas aliquas vigilijs et fluxu mensium, levissimâ de causâ, quovis fere quatriduo & octiduo recurrente, infestari. pro quibus etiam praedicta prosunt, praecipue pil: ex gummis, laud: et Elix: propriet:

Lib: 4us.
De Morbis in Habitu Corporis.

Cap: 1mum
De Scorbuto.

Est affectus in quo 1o. vexant Rubor, pruritus, Haemorragia, et faetor etiam putridus, gingivarum, et dentis vacillatio, imo tantâ altitudo ut facile tactu è suis alveolis sine dolore evelli queant, et iterum in suas sedes reponi. 2o. Lassitudo spontanea ob nervos ...

---

pro suffocatione uterina: R Cinam. pulv: ℥j. Sacchar: pulv: ℥ij. Aq: ros: ℥v. sp: vini ℥vi. Stent in infus: 12 horas, cola bis & ter, et sumat liquoris dos: cochl: ij & iij. et in et extra parox:

Nott.

Caryophyllata Mj contund. et infunde per horas 4 in vini albi ℥xij, et bibat ℥ix paulatim et salit.

Cura strangulationis: R Castor: gr: vj. assa fetid: gr: xij. sp: par: ... Pil. VI. Stan... alia hal: Galb: castor: sp: sal. ammon. CC. ol: succ: ... Mixt: dos: gtt 20 & 30. ... et ol: succini.

Hystor: ... forma ... Bagl: 209.

& Obs:

... Bovr. Chem.

Eadem Obs: in colicâ.

Foeminis hystericis affectibus ... summum Remedium est ... ut et ... Baineos ... Sydenham ... 521 ad 527. et Gull. ... p. 50. in marg.

& De Lorei: Chirurg.

salso & acido fixo scatentes. 3o. Artuum dolor et gravitas, quia in iis ob distantiam à corde, et ob poros in cartilaginibus inflexibilitatem et distentiam facilius intercipiuntur partes sang: circulantis. 4o. Tumores in parotidibus et maxillaribus, scyrri in pancreate, Liene, &c. Carbunculi etiam in axillis et inguine, ob poros glandularum sero stabulando idoneos. 5o. pulsus inaequalis et formicans, nunc debilis, nunc magnus, prout materia morbi nunc sanguinem, nunc habitum corporis vexat, et prout sanguis majore vel minore solutione praeditus est. 6o Ulcera palati foetorem exhalantia, ob materiae corrosionem. 7o. Maculae rubrae, deinde lividae, et nigricantes, extremitates praecipue occupantes, quia in iis humores mixturam facilius amittunt, et circulationem aegrius absolvunt: Quae tamen maculae ob febrem scorbuticam erraticam supervenientem, novas coalitiones et compositiones ineunt; Unde dolores incerti à particulis se incertâ lege implicantibus et extricantibus, praecipue in iis locis ubi vis motus est minor; unde Arthritis vaga scorbutica, et aliquando Lethargus scorbuticus, respiratio difficilis et sim. ob quam etiam causam, alvus nunc stipata, nunc soluta, nunc tormina intestinorum adsunt, appetitus est frustratus, nunc fauces saliunt, nunc odontalgia vexat. 8o. Urinae maxima ex parte sunt rubrae, ad instar Lixivii, cum arenulis rubris et friabilibus; aliquando etiam tartareae, et atramenti instar. 9o. Sitis adest ob salsedinem; quâ etiam de causa, scabies saepe vexat (quae male repressa, paralysim, caecitatem, et sim. infert) et aliquando ulcera Elephantiasim Arabum referentia. 10o. Tumores et Varices, praecipue in cruribus, tibiis et haemorroidibus, ob motus in iis languiditatem; quâ etiam de causa, pedes sub noctem intumescunt.

Pulsus naturali tardior. Dissc. 186. nisi adsit phlegmon, & Arthritis vaga &c p. 189.

Causa. & Boer. de scorbuto.

Ex his evidens est Causam esse nimiam sang: fixitatem, et aliqualem ejus corrosionem, & 1o. ob aerem crassum et fixum libero vento non perflatum, & 2o ob regionem paludosam (quâ de causa Galli Narbonenses scorbutici non sunt) & 3o. ob parentes scorbuticos, & 4o. et praecipue ob victum sale, aceto, et fumo conditum; qua de causa mare Septentrionale incolentibus Endemius est, & forte 5o. ob salinos vapores ibidem ex mare elevatos, qui ibi forte magis acres et fixi sunt quam alibi; Mercatores enim notant differentiam inter salem Gallicum et Lusitanicum, cum alter altero durior comperiatur, et hoc carnes salitae diutius asservantur. Alii et sim. De

& etiam ob esum nimii liquoris fortioris.

In Scorbuticis artuum humerorum, dorsi, natium et lumborum doloribus. Equisetalis, Elixir, &c Ettm. Full. 274.

Phthisi et Ischijs Donna Britannis,
de caetris. Bronchocele Alpinis, Phthisis Lusitanis, Podagra Latinis, Catarrhus parisiensibus, Struma Hispanis, Rachitis Anglis, et Lues Venerea Floridae incolis Endemia sunt; ut et Scorbutus Belgicis, et maris [illegible] incolis.

Obs: Dari, Dr Willisius, Scorbuti speciem sulphureo-salinam dictam, quae vere Scorbutus dici debet, si velimus Scorbutum esse morbum ab affectu Hypochondriaco diversum. ✠ Pitc: 697 4 1077

Cura fit omnibus sanguinis fixitatem infringentibus, et secretionem partis ejus impedientibus, ut 1º. Comitatis V. S. ne sang: mole inde diminuto, secretiones et excretiones fiant majores, nisi in robustis et sanguineis) Vino et Cerev: medic: ex rad: Helenii, Raph: Lapath: acut: Imperat: rad: polyp: sassafr: calam: aromat: rad: Bard: Sem: ejusdem, Absynth: Cent: min: Agrim: Cochl: Nasturt: aq: Becabun: bac: Junip: et cort: Aurant: ✠ in magna quantitate ex Congijs duabus Cerev: recentis, ✠ in parva ex purgantibus additis, ut et amaris. Nott. Me in sanguineis, ✠ ijs calidioris temperamenti, moderate Attenuantibus frigidis dictis, solummodo uti, ut Oxylapath: Cichor: Tarax: Agrim: Scolopend: Hepat: Becabunga, Polypod: et sim: ex Antimonio crudo, ✠ limat: martis, ex ✠ sine purgantibus. 2º. Dieta lactea, ✠ potus ex ejusdem sero, praesertim chalybeato, quae acrimoniam diluendo, et per Urinam educendo operatur. 3º. Dec: ex Lignis. 4º. Omnibus ex libris; sic plurimi Nautae corpus suis fricando, et succos eorum interne bibendo, seipsos curant. 5º. Acetario Scorbutico pro omni cibo, ex fol: cochl: ℥iij sach: ℥vi. salis cochl: ℥j et succi Aurant: ℥vi. 6º. Frequenti usu Aq: Antiscorb: 7º. Sero Scorbutico, ex sero lactis cocto ex fol: cochl: acetosae, cichor: et sim(+) 8º. Sp. cochl: ✠ Raphani. 9º. Succis Scorbuticis. 10º. Antimonialibus, quibusdam et Martialibus. 11º. Balneis. 12º. Transfusione sanguinis. 13º. Salivatione per mercurium, praesertim si morbus rebellis, ✠ [illegible] fulcra.

[illegible] ℥ij: De Podagra vide infra [illegible] et Baglivi.

De Arthritide fixa, vaga, et Rheumatismo.

Cum Arthritis fixa nihil sit aliud quam Articulorum Catarrhus, sive ab arterijs sive à nervis: Cumque Arthritis vaga sit affectus combinationis et debilitationis ✠ secretionis partium sang: circulantis, nunc in una parte corporis haesitantis, nunc ad eadem absorptarum, et in aliam partem, quasi in momento, depositarum; Cum Rheumatismus nihil aliud sit quam Catarrhus striis, dolore, et aliquando febre, à sero phlegmatico et Cachexia, ut et à Scorbuto, differens, quod nullis ✠ paucis scorbuti signis praecedentibus

---

Bag: 147, 149.

Splenetica: [illegible]
Polonis, Elephantiasis Graecis, Aegyptijs et Syris. Scotis raro febris quartana corripiunt; Hungari morbo comitiali.

Cura: ✠ Pitc: 197, et 199: ✠ De Core Cerv:

Modus calidus pro senibus.

antim. crud. vid. p. 71 in marg.

Nott:

Dec. vel Infusum ex summit: Abietis autumno vel hieme carptis, Boer. Pr. 17. N. B.) in vino ✠ Cerev frigidum pro Juvenibus.

= Ubri 93. ×Succus Raph: rust. Horton: Sylvestr: Aqua Dec: Catapl: Act: Hafn: vol. 4. p. 129.
× pro senibus.

(+): ex 7 Cochl: plant. a my. Becab: Fumar. nast: aq: Acetos: a mj: contus. add e. Ubri 93 Serilact. lib. ij. quo expressus cog: nendo separatur.

Podagra.
℞ Sp. vini cois ℥iv. Sacch. Sinam. pulv. aa q. v. cum pane tosto. Exhibe prima mane et hora somni quotidie. Terraneus p. 102, 103 ex nuyl prax. Chirurg: ration. et Munnicks Chirurg. ad prax. hod. adorn.

Eganica nil agunt; vomitoria prosunt; post illa ℞ Unguentum dat. parti dolenti applic. Bals. mosud. vulgo Guidonis.

Causa

Podagra: Applicetur linteum liquore calido madens, qui ℞ aq. font. ℔iij. ℥viij arsenic. alb. et flav. ℥ij calc. viv. ℥vi. subdatur lentus ignis per hor. XXIV. Usus sit per mensem. Si dolor haereat ventriculo ℞ R. M. cond. Rac. sarss. cort. peruv. et Cinam. condito. Sapius. Pitc. 191.

libus subito et sine causa manifesta invadit; idcirco in sequentibus patebit, nec Causam, nec Curam esse valde diversam.

Causa ergo omnis generalis erit Humoris tenuis et nonnihil corrosivi. et aliquo acidi, ex vasis et nervis effusio, et ejusdem in poris habitus, praecipue in iis ligamentorum et Articulorum, non solum ob plurimas eorum inflectiones et contorsiones (unde fit quod pollicum articuli illorum humoribus refluxuris incipiendo, saepissime doleant) sed et etiam ob consistentiam pororum eorundem; unde fit ut senes, in quibus nec pori sunt obsequiosi, nec digestio bene se habet, nec transpiratio libere procedit, huic morbo maxime proclives sunt, i. e. et podagrae, Chiragrae, Gonagrae, et Ischiadi; et pro ratione partis affectae. Ex quibus omnibus (ut et ob contagium, ut speculos appar. vel et per haereditatem) fit 1°. Rubor 2°. Dolores acuti et ardentes. 3°. tumor cum doloris aliqua alleviatione, ut in Odontalgia.

Obs: 1°. me vidisse Nobilem Chiragra laborantem (quae, ob frigus cui se exposuerat, in momento sese in caput transtulit, cum gravedine apoplexiam minante, et altera vice podagra, cum eodem effectu.

\+ Obs: 2°. me vidisse Generosum Colica stomachi saepissime infestatum, quae superveniente podagra statim cessavit, et hac iterum et minime repressa, redibat Colica: ex hoc malo convaluit usu Som. sinap. inconlu. tota lenni plenior tempore.

obl̄mac. aq. R. Hung: et sp: C. C. immersis. toliis capiti applicatis, redditu a.

Ol. auros Benz. ad ℥i. pro orif. ext in Doloribus Ischiadicis. Tournef.

Cura. Arthritides plerumque senes (quoris etiam aliquo Juvenes) mediae aetatis, sed mali habitus infestant, quia in iis sanguis partibus salinis et acidis fixis magis abundat et fermentationes in iis languidiores, et quia pori in iisdem non sunt tam obsequiosi ac in Junioribus; idcirco evidens est Arthritidem omnem esse scorbuto interno comitatam, licet non omnimode ejus effectus (essentia enim scorbuti, ut dictum est, consistit in fixitate acida seu salina in sang:) Cura ergo erit eadem cum ea scorbuti, i. e. 1°. Comitta V. S. nisi in Plethora, ne ob sp: dispendium sanguis magis fixus evadat; Vino et Cerev: Arthritica ex Chamaed: et Chamaepit: (quae specifica dicuntur) ut et Salv: Sarsapar. Guaj: et sim. et cum et sine purg: 2°. purg: repetita ex Caryocostino. 3°. Externe usurpentur nunc Ung: ex Ung: Virid: ol: Spicae, et sp: ... nunc Catapl: nunc sp: ex aq: reg: Hung: camphorata et ... ex pane et Lacte cum camph: et opio, et ex Saponis nigri ℥iv, ol: Spicae ℥ij et vitell: ovorum N°. 2. et ex Sale, pipere, et butyro. 4° Empl: ex opio cum sapone et pice navali et ex Tacamahaca; et ex Ranis cum ☿ quadruplicato. 5°. Balneis ex Ebulo, Sambuco, Chamaed: Chamaep: et sim. ex quibus etiam conficiantur pilulae et Electu cum paucis aliis

Cataplasma ... ⁊ ... cum plumacula lini albumini ovi oblinita: * ... ⁊ ...

Arthritis vaga ... corporis universi ... Hamb. p. 17, 18.

Cura

℞ Bibl: 10. ad V, π.

et Obs: 2das.

Pil: ... in podagra ...

Ex: ... quo ... potentes ... podagricos: Bac.

pulv: Chamaepityos internè specif: in podagra.

Sem. sinap: ficus, aa ℥ij contund: et applic. ... ex affecto in Ischiad.

... Burrhus.

in Pharmacopœâ Bateana inveniendis. 5°. Diæta ex lignis per mensem continuata. 7°. Salivatio per ʒiv. d: per 20 dies protracta.

In Rheumatismo eadem conveniunt, sed præcipue Dec: Stercoris equi, ut in pleuritide. ut et Serum lactis chalybeatum, ut et V. G. quia sæpe ~ sang: fixitas ut in Scorbuto non peccat. ¤ Salivatio, pt. 68.

obs. 1°. Arthritidem aiunt esse permanentem in Ischiadem et Podagram degenerare, præcipue in Bacchi et Veneris filiis, ob partes tenues amissas et tartareas remanentes, adeoque hæc species Aulicorum comes, Rusticorum osor, et Medicorum opprobrium est, nisi sectione partes eximantur. Dantur tamen exempla Arthriticorum solâ Lacti potiâ curatorum, quidam solâ urinâ potiâ, et alij solâ urinâ vaccinâ potu.

obs. 2°. purgantia in arthritidi obnoxijs paroxysmos sat sæpe inducere, etiam incepti esse asseverant; quia exinde multa in latibulis hærentia in sanguinem vehuntur, multisque in membris simul dolorem excitant, nisi repetitis purgantibus ea omnia ex sang: eliminemus. obs. 3°. Externa prædicta, ut et omnia alia specifica dictorum aliquibus dolores in initio augere quam diminuere, ob motum inductum ob ipsi in humores acres in obstructionibus pertinacibus stagnantes: et quam causam plurimi hunc morbum solis frigidis in: vationibus, ut Embrocatione repetita aq: frig: et Sper: Ranarum, et sim.

Cap: 3tiu

De Hydrope, Ascite dictâ, et Anasarca.

Hydrops est morbus in quo nunc in unâ nunc in aliâ corporis cavitate, sed maximâ ex parte in Abdomine, colligitur humor serosus et aqueus, 1°. sensim partem distendens (si enim confertim fit, ut ab ulcere et vom. ruptis, Hydropis nomen non meretur) 2°. sitim inducens ob defectum humiditatis in sang: 3°. Dyspnœam, præcipue si sit in pectore ob abdominis, ob denegatam pulmonum inflationem. 4°. Fluctuationem, si cavitas non sit omnimodo aquâ repleta. 5°. Crurum et Scroti tumorem de die intumescentem, et de nocte detumescentem, ob diversas tunc temporis corporis positiones; sed hoc solum fit in abdominis Hydrope, in Anasarca simplici, in qua cavitates internæ possunt esse liberæ, et externæ solummodo partes, ut in Cachexia Leucophlegmaticâ afficiuntur.

Causa. Omnis Hydrops est effectus 1°. sang: nimis viscosi, unde non solum fiunt obstructiones in parti. tubulis, sed et etiam in vasis secretorijs; interdum tamen ob perpetuam à corde pulsationem partes aliquæ hujus seri viscosi in Lymphaticorum oscula coguntur, quæ tamen ob eorum viscositatem et motus diminutionem, quo magis

---

¤ Bacon et Whitehill.

¤ pt. 68, 72, 8.

In rheumaticis lumborum doloribus potus lacti, cocti ℥ij. aq: decoct: Hord. ad ℥ij: mane, valde modest. Bagl. 92

¤ Salo: ℳx. contun: Dentibus cum Butyr: recent: ℥ij. coquantur per spatium quadrantis horæ, colentur, et pars affecta inungatur calidâ.

In Rheumat: scorbutico Equisetum et maxime Idem efficit potus Vini rubri Gallici.

potio ex vin. alb. ¤ cordis ℥xij. et Lact. ferv. ℥iv. ad. bacc. oxyacanthi ℥j. coq. per horæ ½. Dos. ℥j. mane et vespere. Pitc. 181. pro podagra.

Lirung. ad long.

In Leucophlegm. multus est undosus, mollis, et albior; In Ascite parvus, crebr., durior, subdurus, tensus; in Tympan: tensior, et rarior non imbecillis, subdurus, ac tensus.

In Anasarca, Leucophlegm. Rheumat. ...

Causa maxime ... sang. dissolutio, & circulationis tarditas et impeditio; ob quam ultimam Gravidarum ... tumefiunt. Vang. Clari

a motu fonte recedunt, non solum salivantes in ipsum Lymphaticis admittunt, sed et transitu sero à tergo venienti impediunt, unde illic adeo ut Lympha transeundo per fibrarum ... vasa Lymphatica non solum distenduntur, sed et etiam rumpuntur, sicque serum suum in locum quem respiciunt effundunt. Hoc modo operantur omnes Diætæ crassæ nimis et refrigerantes, ut et omnes nimiæ evacuationes sanguinis, sive per V. S. sive per vulnus, sive per Menstrua, sive Lochia. Exinde etiam est, quod Hydrops morbis valde chronicis superveniens, sit lethalis. Vel 2°. Est effectus suppressionis evacuationum consuetarum, per compressionis viarum circulationi necessariarum, sive à calculis Renum, ut serum suum non admittant, sive à potu frigido inter sudandum. antiqui sero omnes exercitia commendant. v. Tull. 237.

Cura ex Hydropis et Anasarcæ eadem est, et sit 1°. purg: moderatâ quamvis enim juvare videntur pro præsenti, agrorum tamen sæpe moriuntur, quia cum ut aquas educunt, sic etiam vulnera Lymphaticorum augent. ex succ: rad: Iridos vulg. per Ebuli ad ʒij per 3. ex Syr: de Spin: Cerv: ℥j pro unâ dosi; per ex pulv: et Resin: Jallap: per ex magister: Gutt Gambod: sed præcipue ex Elaterio ad gr: IV per V. Sed hæc, nisi in valde moderatâ dosi et sæpius repetitâ, ob causam prædictam, præferimus 1°. Vinum per Decoct: medic: ex rad: Brion: Ebuli, Sambuc: cort: cappar, tamarisci, fraxini, sambuci, agrim: Soldan: Gratiolæ, cort: Esulæ, Millepedis cineribus Genistæ, bac: Junip: et sim. ex per sine purg. 2°. Dec: Marrubij albi ex aq: paratâ, averuntque omne genus Hydropis. 3°. pulv: Bu: fonis: tart. vitriol: ââ ʒß per cineribus Genistæ et Limat: martis ââ ʒß singulis diebus à purg: vacuis. 4°. Gelatinam Bufonis integri. 5°. Infusio decocti ex Mart: ℥IV. Summit: absynth: Abrotan: ââ Mj: Cort: mm: sambuci, ââ pij. Cinam: ʒij ex vini albi ℔IV. 6°. Balnea, ut et omnia moderate sudorem moventia; ut Diætam ex Lignis. 7°. Clysteres penetrantes, ex Urinâ, et sim. 8°. Epomenta ex eadem, per Catapl: ex fimo bovino, per anserin: ex aq: calcis et Urinâ, per Ung: de Arthanita, et ol: bufonis. 9°. Aq: Lumbric: terrest. 10. ... [illegible]

Sunt qui curam solis aromatis crestallis et ... ad gr: 3. pilulis commistis aggrediuntur. Dant etiam Empirici qui suos ægros ... linteo non tenui, in Dec: absynth: Ruta, Lavend: Salv: ex tanta quantitate salis com: ut Muriam dicat, faciat, immisso per madefacto infusunt, ... et ... ut sic in lecto pro 5 per 6 horas sudent, usque dum saliva illis effluxerit Muria similis, tum ægros, linteo exemplo, alio lecto calido immittunt, ut per 3, quatuorve horas sudent, et interea vinum Hisp: degustandum præbent, et secundâ vice

Not. α. Sunt ventri tumefactio, transparentia et fluctuatio: ac. Respirandi difficultas, febris, pulsus debilis et frequens, gravitas corporis, sitis insatiabilis, difficultas urinam emittendi: Atque ubi explicatur singulatim.

Contrariâ salivatio, sudorif. et purg. fortiora ... sanguis ... dividendo ... purg: mitiore bona sed ... sunt Diuretica in maj: dosi. ex Equitatione, vectione in Rheda, vel ... sal succini ... in magna dosi. Tull: 118. 237. Diæta sit siccans, ut ... ubi alii.

Cura.
Diuretica, sudorifica, et aperientia propria ... in ... ad initium hujus libri. Chalybeata, ex exercitio. Dorhiely cura 2. ex pilulis magnitudinis viciæ, ex Elaterio et farinâ triticâ, dein ... tibiarum. Dec. caulis ... Salvest: dein exhibitione ... Blanc: ... in ... vini albi ad p. 8. ... horas bibatur ... Continuatio hoc modo ad diminuatur tumefactio.

Rad: Brion: ... ad ʒß.

Remedia specifica sunt per Diuret. per perspirationem insensib: promoventia. Diuretica fortissima, ut rad: ... Gratiol: ... omnia infusa in ... vini ... Rad. Brusci ... vini ... in vino ... Sal: Rum: ... et ... in ... mirabile est. Charr. 56.

... in: ex ... et ... Cerio: ...

addunt etiamq vaccini in satis magnâ quantitate.

His omnibq non proficientibq, ad paracentesim, & postq partium extremarum scarificationem deveniendum, & Chirurg. et Tumores cy obsoro[?]

Obs: Hydropem partem, v. g. Ascitem, nisi caute curari quia quacunqz de causâ aquæ educantur, tamen ruptura lymphaticorum morbum renovans semper fere remanet; siqz habemq in hoc morbo Indicationes contrarias, viz. obstructionis remotionem, et lymphaticorum consolidationem.

Cap: 4^m.

De Scabie.

Tanta est similitudo inter aliquas scorbuticorum eruptiones et Scabiem, ut revera, si ulla sit inter illas differentia, non facile distinguam, ut revera, si ulla sit inter illas differentias non facile distinguere quæant; interdum tamen hæc distinctio à multis necessaria judicatur, eo qd remedia externa, sulphur et sim. acida admittentia, non tam in scorbuto qm in scabie (si omnino) proficua reperiantur. & contrà, omnia scorbutica scabiosis prosunt.

Differunt ergo 1º. Qd scabies p contagium communicetur, aliàs ac scorbutus, forsitan ex eo qd illiq m̃ãa non solum sit acris et corrosiva, sed etiam nonnihil volatilis; hujq m̃ãa è contrà est salis fixa, et volatilitate orbata. 2º. Qd in scabie pustulæ sunt non solum pruriginosæ, sed et etiam purulentæ, nunc latæ et expansæ, nunc elevatæ, variolarum instar, qd rarò aut nunqm scorbuticis accidit. 3º. Qd Juvenes infestet sæpiq qm adultos, in quibq sanguis salsedine et aciditate fixâ adhuc laborare, ut in scorbuticis, vix est contendum.

Concedimq tamen scabiem dari siccam, nunqm certè à scorbuto distinguendam, quæ idcircò solum scorbuticis, Refrigerantibq dictis, externè et internè pro maj: certitudine tractanda venit.

Causa. Ex prædictis patet causam non esse tam intemperiem aliqm sang: salinam v corrosivam in nimiâ copiâ, ut volunt Authores, sed præcipitationem salis sang: ordinarii, & ejusdem à sang: quacunqz de causâ separationem, ut sic in habitu corporis harenco. rigiditate et punctione ulcuscula fiant.

Cura Scabiei a scorbuto diversa, sit purg: unâ & alterâ, deinde una. coi ex nitro fixo et sulph: & Ung: ex pomat: ℥ij fl: sulph: ʒß nipperis sp: salis, aã ℥j, ol: sassafr: gtt. 2. pro tribq noctibq, in singulis sumendo lautis corrdi: ex viperæ et Z Z. & om: Hisp: sed si ullam habeat scorbuti suspicionem, fiat ung: ex Helen: Lapath: et Imper: pulv:

℞ Mercur. dulc. gr. iv. Resin: Jalap: gr: 10. syr: de Rham: ℥j non proficit post oia frustra tentata ac cathart: ℥j & ℥j ex manna opt. purgat. Fr. Lanuf:

Cinnabr. in omni polus & st. enim maxime fit, cum sedans qd natura novit. Hall. 95.

extr. lap: Dulco-amar: Rad: Rub: tinct. Helen: Lapat: Bar: aã ℥ß. Cort: aristol: aã ℥iij. herb: agrim: et Samone: aã m j. Nasturt: m j. flor: sem: ℥ij. Sal ℞ ℥ij. Sem: barc. ℥j. Calam: arom: ℥ß. Sassafr: ℥ij. M. pro potu. Cave à rebus frig: lacte, piscibq.

℞ Calom: Crud: pulverisat. ℥ij. fig. sacch: ring pounder blood Dat ej corrd: in Anthquant; acrdl in ordinaris mane & vespere. m. s. Sr: action: pro eruptionibq arieti. pruriginosis in scabie, Lepra &c. Cyst.

In Infantibq cy imbro: edit ex hiodi Pulv: Laid: robor. et ung: Hisp: Croc; postea Calomel: C. B. angel. Cinam. Cont. Alkermes, aq. Cinam: prim Variolis Cautq. Sulfur sal est quid acre muriaticum. vitriolo aut sormi in Lavy sueco. Bart. 229.

Cura.
& ung: ex ol: Ploisnemodt fl: sulph: præcipitatâ parandâ fl: sulph: diebus p dies aliquot.

℞ Succo fumariæ et Lapath: acut: cum pauco aceti in Ung: facies. Bl:

Item, ung: ex rad: Lapath: acuti, ex [illegible] tutissimus pro infantibus.

pulv: ʒj. et pauco Sir: et crudi, præmissâ tamen Conserv: Scorbuticæ, pro calida et frigida dis temperament: agri. Quæ ultima methodus semper observanda est in Infantibus, et in omnibus est admodum secura, quod si lædio sit, sumatur Ung: Imperial: ʒj. et: Sulph: ʒiʒ. sp: [illegible]: x. pro duabus noctibus.

Cap: 5. De Rachitide.

Engl: MSS. 87. — [illegible] maladies des os. opt. ℞ annotata ad Chirurg.

℞ obs. — hoc signum certum Rachit: — [illegible]

Est morbus pueros invadens, in quo ossa curvantur, articuli paulatim tumescunt, et grandescunt, costæ subsidunt, sternum carinatur, pectus angustatur, cartilagines sterni, et aliquando etiam dorsi nodantur, totum corpus fit debile, infans aliquando ut collum caput sustinere nequit, et denique totum corpus monstrosas induit formas.

Causa. — Causa est inæqualis nutrimenti in partes distributio, procedens à debilibus et indomitis sang: et stomachi fermentationibus, unde ob accidentalis [illegible], in hac vel illâ parte corporis, humorum stagnationes, et obstructiones, in hac vel illâ parte corporis, humores stagnantes, et obstructiones etiam forte nervorum versus illas partes tendentium, nutrimento debito etiam negato, partes illæ vel emaciantur vel jacent admodum [illegible]: interea aliæ partes ab obstructione liberæ, nutrimentum debite et forte etiam plus solito (quia sanguis in maj: quantitate eas perluit quam facerit, si nulla darentur ejus motus in aliis partibus impedimenta) accipiunt; sicque corpus inæqualiter crescens, variis incurvationibus sese ostendit.

Cura. — Cura fit omnibus moderate aperientibus, et humores incidentibus, et obstructiones in partibus incurvatis et non nutritis, i.e. in parte concava, removentibus. Dec: rad: aper: polypod. Glycyrr. [illegible]. Caso: [illegible] marite: et gemella in magnâ quantitate, cum pro [illegible] inæqualibus. 2o Syr: Lim: ℞ aceto: [illegible] quotidie assumpto. 3o Bals: spinali exsting. Martial: ol: Laurin: Lumbric: et Millip: cum ol: [illegible] pauco. 4o. sp: Millip: et E.C. 5o Enus Veneris gr: iij, pro primâ dosi, deinde 4, et sic procede, addendo singulis dos: gr: j. pro 8 vel 9 vices, deinde dosem decrescendo in [illegible]. de detrahendo gr: j. ex unaquaque dosi, donec ad gr: 3. redierit. 6o Dec: rad: filicis. 7o. Lectulo ex filice facto. 8o. Indusijs immersis ung. ex ij Bom. ex quibus Ung: Nervinum componitur. 9o. Limaci [illegible] Cochl. Black Snails specifica. ℞ 3a. [illegible] et Annot. Chirurg.

Marginal notes: Spermace albumen lab: xij, contundantur, et inde misce Cinton: [illegible], pondo, et brodii [illegible], et [illegible] ad ulg. Inungantur Articuli hac liniment mane et vespere coram igne [illegible] tempus. — Flores martis. Boer: proc. 154. — Frictio continua partis affectæ, si morbus non sit inveteratus. Fuller 215.

Lib: 5tus. De Febribus.

Boerh: — [illegible] — Præfatio.

Omnis de Febribus communiter per [illegible] intelligatur velocitas sang: circulantis, tamen hæc variè in variis

℞ Boerh: ad 213. 58. 59. 101. 102.

variis sese ostendit simptomatis, & respectu causarum eam producentium, & respectu sang: et temperamenti aegrorum; ideirco numerus specierum hactenus observatarum non solum magnus est, sed etiam in infinitum augeri potest, cum inde non solum externorum actiones, sed etiam corporum nostrorum variorum temperamenta. Omnes tamen species quae adhuc sunt, & esse possunt concinnamus. Sunt & 1o. Simplices sive legitimae, & exquisitae et unius tantum periodi, in quibus nihil praeternaturale supponimus (i.e. nec vitium pravum in sang: aut corpore, nec contagium aliquod externum) sed solummodo celeritatem motus, sive sit ab obstaculo, sive ab iracundiae, sive ab inflammatione, sive ab exercitio nimio, sive a frigore, sive ab aere profundo, sive a sang: nimio motu et sp: animalium numero [illegible] ut sic validiores et frequentiores sint cordis contractiones, sive a cohibita perspiratione et sim. Et 2. Compositae, quibus augmento motus vitium aliquod & sang: & partium solidarum adjunctum est; Unde pro variam adjuncti hujus naturam fiunt species & Continuae Periodicae, & Continuae Erraticae, & non continuae sed Intermittentes, & Hecticae, & Colliquativae, & Malignae quae nisi ut fieri potest ejus causa ab externo contagio, ut in specie pestilentiali, proveniat) & Variolosae, & morbillosae, & Erisipelatosae. omnes hae febres, quamvis in diversis differant, tamen ex eo quod in velocitate circulationis aucta omnes, nisi aliquae Maligna et pestilentiali, forsitan ob lentorem et crassitiem sang: adjunctam conveniant. Erit 1o. Pulsus in omnibus frequentior, & ex eo quod sp: frequentius decidant in Musculos cordis et aliarum partium, & ex eo quod motus ipse sanguinis celeriter transitionem motus ejus efficiat. 2o. Caloris sensus et aegri et astantibus molesta excitabitur, ob partes sang: parvas, in organa tactus perspirando, caloris sensus excitantes. 3o. Dolor in capite, quia vasa et pori plus ob motum et rarescentiam sang: quam solent distenduntur, cum qualibet continui solutione; ob quam causam Dolor in Dorso et Lumbis, ob Aortam in iis sitam, saepius contingit: sed praecipue quia in eorum parte medullari arteriarum nimia distensio a musculis superstratis nullo modo impeditur, vel quia partes illae minutissimis poris sunt praeditae, qui sang: transitui in cerebro non ita se conformant; quod de capite multo magis intelligendum. 4o. Vigiliae vexant, ob continuum fibrarum et nervorum ... motum, nisi sang: textura sit vitiata, i.e. nisi crassities ... aliquis morbus accesserit. 5o. Jactationes membrorum a ... adsunt ob sp: in musculos: unos quam alios inflatione opportuniores demissos; sed hae jactationes. et multo minus Convulsiones, vix adsunt in febre legitima, ubi supponitur motus solummodo uniformiter auctus, sed in febre cum alio ... conjuncta multoties. 6o. Haemorragia sang: aliquando accidit, in iis

Nota: in his ... numerus pulsuum, seu acceleratio pulsus a motu aucto sang: ut plus sang: transibat cor et vasa quam in statu sano; cor enim frequenti quidem, sed non tantum ita amplo se dilatat in febre ac in sanitate. Gene-

revie: omnes praesertim Maligna in vitiata mixtura sang: seu coagulative consistunt, itaque volat: et sp. vi sua in iis motum ad naturam ... non promovendam, sed ... eam prorsus ... Sam. V. S. tamen etiam in iracundiis et inflammationes ... nisi potest quamvis compositione sit qua omisso pauco sang: vasa se motus ... restringunt ad motum ejus accelerandum etc Gene.

Pathognomonica omnes febres sunt ut pulsus ... frequentior ... omni, et ... semper comitem ... Febri.

Vide Spectrum omnis omnia symptomata ... explicata, Pitc. prax. 86, et seq.

ijs præcipuè locis in quibus ejus motus minus resistitur. 7º. Placide rubet, corpusque languescit ob vasa faciem extremasque corporis penetrantia. 8º. Difficultas adest respirandi, ob plenitudinem valorum à rarescente sanguine. 9º. Linguæ siccitas et sitis vexat, ob discussionem Lymphæ. 10º. Appetitus prosternitur ob pressionem tunicæ nerveæ ventris: à vasis distentis, eo = dem ferè modo quo alimenta ingesta premere solent. 11º. Urina erit saturatior et parcior, sine ulla aliâ mutatione; si motûs augmentum hic solum culpandum sit, ob exhaustionem humidi diluentis et pelluciditatem conservantis.

Causa. Quamvis à Nobis causa febris generalis et vera non promittatur, tamen ut opus susceptum perficiamus, veniam petimus ut hac in re ex aliis Authoribus hallucinemur. Non quod de causâ febris simplicis ullo modo dubitemus, ex evidentes in illa dantur introductionis motus in sanguine causæ, uti prius dictum est, de potu, etc. Quorum effectus in sanguine diu durare nequit, et si supponamus aliquam aliam mutationem abesse in sanguine quàm motus inferri; adeoque si causâ sublatâ non diminuatur motus ab initio introductus, per esset febris, necessario sequitur aliquam causam continuationis quàm ab initio introducta fuerit in sanguine: exstare, cujus varietatem omnes orientur febres, talem denominationem merentes.

Quær: ergo 1º. Quænam potest esse continuationis motus hujus causa? Sunt ex liceat ex effectu rerum visarum et evidentium determinare, [illegible] rerum invisarum et non evidentium, i.e. cum per saltem conjicere, de effectu rerum [illegible]. Hilla videmus quod 1º. Inflammationes (præcipuè illæ quæ ROSÆ dicuntur, si illæ quæ critice fiunt) refrigerantibus tractatæ febrem producant, 2º. Quod lactis in Lac ultra profunda febrem ferè continuâ associentur, 3º. Quod Lactis in Lac [illegible] circa puerperium et paulo post, reaffusione (ob prægnantibus, præcipuè circa puerperium) per repercussione à frigidissimis in = motus per alias animi gravedines per repercussione à frigidissimis in mammis applicatis, febri satis molestâ, et sæpissime diu durante comitentur, 4º. Quod Lochia iisdem infortuniis subjecta, eadem dant symptomata, 5º. Quod omnes ferè eruptiones et evacuationes intropulsæ idem faciant, etc.

Resp: Continuationem motûs esse effectus peregrinæ et insolitæ materiæ in sanguinem introductionis, sive ab extra sive ab intra corporis; qui motus idcirco durabit per brevius per longius, donec naam mater, donec per uno per alio modo expellatur. Nec obstat si dicas, hac in prægnan = tis sang: semper esse sine febre, adeoque ejusdem reaffusionem non posse febrem non potest quàm per aliquid extraneum introductum. Sane.

Causa.

Baal: 58. Febris oritur non ab dudo sed potius ab alteratis variè alterabilis provenit, et nullo solo diluen = tis ejusque alio liquo = rioris empiralis, curantur, ut in Eidem quibus patet. Quam = obrem non possumus non summopere laudare eximias vires Chinæ Chinæ, cujus substantia virtute nulla Febres ex acris muta = tione producta, alias aq. ardentiores tan = quam in ovo suffoca = t.

Frumtum, aliquid introducitur esse in sang: per ex [illegible] bulo [illegible] solidarum intra; per ab vero extra corpus, patet per pro = cessu maturationis [illegible] in Flog. Lo = ludique expectando tanquam sanitas, vel li = mat. [illegible] à venis exsiccata, et fermentatione [illegible] ebullitio obrigescens concitata, durat [illegible] dies [illegible] non potest quàm per aliquid extraneum introductum.

℞ Rad. Oxylapath.
Taraxac.
Bardan.
Helenij aa ℥j.

Herb. Agrimon:
Becabung.
Chamædr:
Hepatic:
Cichor:
Scolopendr. aa Mij.

Cort: Aurantior. ℥j.
Flor: Sambuci. M. ij.
—— Chamæmel: pug. iiij.
Sal. absinth. ʒij.
Fol. Sennæ —— ℥ij.
Limat. Martis in nodulo ligat. ʒij.

Incis. et contus. infund. in Cerev. ℔ xij. vel XIV.
vel vini albi Gallici, (aut Rhenani) ℔ XIV. vel XVI.

℞ Herb. Cochl.
—— Plantag. a Mij.
—— Becabung.
—— Fumar.
—— Nast. aquat.
—— Acetosæ — a Mj.

Contus. adde Seri lactis ℔ij.
liquor expressus coquendo depuretur.
vel Serum lactis coquatur cum fol. Cochl. acetos. Cichor. et similibus.

posse eam producere (qd de multis alijs, deque ac de Lacte dicere po-
teris) Agnoscimus enim continuam Lactis et sim. sine ullo lati effectu cir-
culationem, qd nunqm tamen intelligendum de Lacte vel ullo alio liquore
extra circulationis aream aliqmdiu permanente.

Sed Quaer: 2º Quomodo, concessâ praedictâ mâa, sang: motus ab
eâ augebitur? Ex consideratione qd in nullis vasculis determinabilis
excrementis sorie puri, et vaporibus acribus tanta suspicanda sit vel volati-
lita, quae sanguinem subtilitando, vel acrimonia quae fibras lancinando, vel
quantitas? Saepissimè enim simplex afflatus sol: calpando esse quae ullus
talem effectus, et multò minus ejusdem continuationem producat. Resp:
Motus iste esse effectus turbationis sorici concinnae partium sanguinis
qd facilius in sang: nostro sit qm in eo Bestiarum et Rusticorum, uno sorte
alimento vescentium, ob majorem ejus compositionem. Sim. est qd sic in Hyp.
catharsi, qm in debilitâ purgatione, sang: motus sit multo celerior, quia
sanguis veram fermentationem amittit, adeoque citior, et fermentationem
debitam restaurantias restituta, desinit Hypcatharsis; qd etiam de mul-
tis Diarrhaeis dicendum. 3º. Qd in debilibus effluxus menstruus nimius saepius
observetur esse sorie comitatus qm in Robustis, qd solummodo sang: [illegible]
homi attribui potest, &c.

Quaer: 3tiò. Quomodo, praedicta mixtura sang: turbatione concessâ,
febris oriatur? Resp: vel ex eo fieri, qd sanguis magis fluidus qm antea de-
veniat, et exbricationem partium spirituosarum facilius admittat; prius enim
omnes sang: partes erant Homogeneae et multis alijs partis composi-
tae, quae omnes in unum et eundem motum conspirabant, sc. à Centro ad cir-
cumferentiam; Nunc verò diversa partium genera, qualia sunt
aqueae, terrestres, &c. guttas integras vel se componunt eodem sorie
modo ac videmus in Cerev: post tonitrum, et in vino turbido et motum
magis rectiliniem et celerem induunt, adeoque nisi unio vera iterum re-
stituatur, vel mâa eam impediens expellatur, mors necessariò sequitur; De-
[illegible] majorem vel minorem hujus mixturae turbationem, vel levior vel desp-
ratior est.

Huic si in auxilium adstras mâam aetheream, guttas Homogeneas
et parvâ vel nullâ resistentiâ permeantem, sed Heterogeneas difficil-
limè, ob partium diversitatem, diversos vel diversos poros aetherem ad-
mittentium, Accelerationis motus praedicti, ejusque continuationis, donec sanguis
ejus transitus uniformem admittat, intellectu multò facilior erit. Sed haec
omnia melius intelligentur per exempla subsequentia; Sit ergo Cap:

Turbatam hanc in Feb: sang: mixturam probat, qd in malignis Diarrhoeis à purg: excitantur.

Cap: 1mr.

De febre Ephemerâ

Alia est intra 24 horas finiens, alia secundaria, tumoris apertionis Paracentesi, et sim. succedens.

Causa. Causa sunt passiones Animi, Mora in radijs solaribus, potus nimius, a ingurgita[illegible], alimenta insolita nimiâ quantitate assumpta, et sim. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Boer:

Signa. Signa sunt, pulsus Color, Calor aeris Capitis dolor, faciei rubor, et aliquando sitis. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Boer:

Signum pathognomicum seb. remiss. dici durationis est Urina non mutata.

Nott: 1º febrem hanc non esse subjectum Medicinae, eo qd debilitas animi qm Medicus ei occurrere debet. Nott. 2º. febris simplicis solum moveri non; si enim 2do, et multo magis si alio die non cessat, et interdum non sit symptomatica, ab inflammatione, [illegible] et sim. dependens, [illegible] causae praedicta recensita, quae morbum induxerant, erunt tantum procatarticae. et nullo modo Continuantes seu continuantis motus causae, de quibus in Cap: seq:

[illegible] Cura [illegible] facilis, abstinentia, quiete, diaetione. Boer:

Cap: 2dr.

De febre Synochâ seu Continuâ ardente.

[illegible] Boer: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Febris haec nihil aliud est qm Ephemera pluris dierum, cum siti, pulsu magno, celeri, frequenti, capitis dolore, tempore pulsu, Urinâ saturati, et aliquando (si obstructio adsit) tenuis, vigilijs perpetuis, calore acri, corporis jactatione, et aliquando cum pulsu inaequali et inordinato; febrem hanc distinguunt Authores, in Putridam et Non-putridam; sed vere aequalitas et inaequalitas dependent à guttis sano: eodem aut diverso modo compositis, ita ut inaequalis quandoque possit esse sine febre et in satis sanis, et sic non erit signum diversitatis febris, sed diversae texturae sang: in uno subjecto qm in alio.

[illegible] [illegible] ephemera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Boer: [illegible]

Causa procatarctica, ut in priore Cap: Continens vero est mixturae sang: perturbatio, ut in praelato.

Nott. 1º. febrem hanc Legitimam ab Authoribus appellari, eo qd in ea consideretur solummodo augmentum motus, sine ullo in sang: vitio.

Nott. 2º. febrem hanc in locis orientalibus Crisim 5to 7mo die, sed semper subijsse. Hic vero dies Critici magis incerti sunt, et ideo Medici eos praeveniunt, medicam suis mixturis et attenuando; sed revera dies 7mo Criticus pluribus observatus in hac ipsa ut aegrot; aliquando etiam 9no. sed rarissime undecimo; postea Morbus hic Chronicus evadit. ad Calorem internum et sang: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ham 237. 242.

Cura fit 1º. V.S. 2do [illegible] 3io [illegible] sed [illegible] in 4to. et multo minus [illegible] [illegible] nisi dolores Rheumatici eam omni tempore postulent, ne [illegible] [illegible] [illegible] 2das.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Epac [illegible] [illegible] Paracentesi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

per:

Arcanum: ... in initio 2 mittitur ℥j ... Laud: opiat: in delirio ...
... expendi super alvum pro ... Polv: et vesicat: et empl: suppedalia.
peccantes attenuat, jam menoata et in frectin vergens, retardetur. 2o.

Cassi: in alvo induratâ. 3o. Emulsione in primis diebus, ul et ptisanis ex sp: nitri, ul et pulv: ex sale prun: sach: sat: et camphr: āā gr. 4. ul et oxyrhodini capiti, ul et columbis et sim. plantis pedes applicatis, ut in Cephalalgiâ calidâ. 4o. Die 4to et 5to inchoetur usus Cardiacorum diaphoreticis, aliorumque humorem ad Crisim praeparantium, qualia omni Doc: Boria ex Card: B: et Scordio, et ptisana ex Eryngio et Scorzonera, et Mixtura ex aq: Card: B: papav: cinam: hord: ocul: cg. Bez: Miner: Sale C: B: Syr: papav: et laud: et Lirii, Diascord: Quibus humoris comminuti his signis apparentibus, et agro ad sudorem paulatim inclinante, ad eadem in maj: et fortiori dosi propinanda ... Interdum Epithemata ex Diasc: et vino rubro non negligantur ...

De Febre Synocha Continua Maligna dicta:

Febris repente invadens ... capitis, cephalalgia ... anxietate circa praecordia ... spirandi aliqua difficultate, nausea, et aliquando vomitus, viris aliquali prostratione, rigore, et aliquando nervorum et tendinum subsultu, facie aliquali collapsu, pulsu aliquando celeri, aliquando tardo et oppresso, sed semper debili; Quibus primis diebus apparentibus, sequuntur oculorum rubedo, dentium et linguae incrustatio, maculae petechiales, nunc rubrae, quod melius, nunc lividae, quod pejus, nunc nigrae, quod pessimum ... eruptio, stilla sang: aliquando e naribus, etc; aliquando spasmi et convulsiones, imo et urina et faeces nigredo.

Differt à febre ... Rheumaticis ... sudoribus ... sed verior distinctio ... Febris Maligna vix unum certo cognoscitur ante petechiarum eruptionem. Sed nobis distinctio haec non tam necessaria ... Febre Maligna ... tuto potest administrari, omni saltem tempore ante eruptionis apparitionem ... sanguinem immediate mixturâ convenienti exagitare non negligemus, sine quâ cautela numquam in hoc morbo est administranda.

Causa est solutio et turbatio sang: aliquando ... spiculi venenata volitantia per aerem, et similes causas nobis incognitas.

Cura. ... nisi ex cautela praedictâ ... diarrhoea ... primis diebus Vomit: praecipue si adsit nausea 2o. Epithem: ex Diasc: et ...

Margin notes: Shivering. Purple spots. Causa. Cura. Aër purus frigidus ... Epithemata blanda ... Purpur febr.

℞ Hi: bran: ℔ Sp: vini | ex vino rubro; ʒo. Ex: ex scord. C. B. rad. et sem: Angel. Scorzon: petasit: Contrayerv: melisi: fl: Calend: 4o. Mixt: ex aq: melis: Calend: et Theriacal: ℥ppa croci, castor: Margarit: Bez: min: Antim: diaph: Sale absinth: conf: alker: troch: de vip: sale vip: Diasc: syr: papav: Gariophi et Laud: si opus sit, 5o. Syr: Gariophi: ex aq: cinam: hord: 6o. applicatore praecipue si adsit deliria & stupiditas & nervorum subsultus; interea collutio oris non negligatur, et sal prun: in parva quantitate saepius in os immittatur.

℞ pulv: Rad: serpent: virg: Contray: Camph: M. f. pil. ex Diascordio. & ullen

℞ Serp: virg: ʒvi. Cochi: nel: ʒj. Coq: in aq: lbjss. adde Ther: ven: ℥ Diasc. ℥. Decoct. & ullen.

Sunt qui acida non adstringentia, volatilia dicta, in hoc morbo commendant, qualia sunt omnia ex nitro, Citris, Aurantijs, &c. sed sitis, calor, partis utere, nisi sitis aut similia symptomata ad modum vexent. Dr Wilson in Fundo. & p. 74. in marg.

℞ Regul: p[illegible] malignae oriuntur a coagula[ti]one, & dissolutione humorum, unde proveniunt varia [illegible] curat[ur] modo cardiaca, spirituosa, et sanguificantia profunt [illegible] [illegible] acida temperata, [illegible] gelatina [illegible] temperata [illegible] Rust. [illegible] inflam: matorij sang: [illegible] curant.

Acida coagulant & liquefaciunt vitam et sal: volat: sanguinis, ideoque magni usus in febr: quia nimirum rarefactionem & inflam: ingruentibus fluxis: p. 80.

Cap: 4um.

De Febre pestilentiali

Eiusdem ex Maligna comitatur signis, ut dolor, subita virium prostratione, sine manifesta causa, syncope frequenti, Anthracibus, Parotidibus, Bubonibus, et sim. carbunculis. In posteriori incipiente frigo, tumores, proinde calor maxime. Febr: p. 134. & etiam 128. 4.

Causae sunt & cadaverum exhalationes, & alia venenata temporum pestis; quae pro diversitate variarum inficiunt hominem [illegible] [illegible] simul.

Cura sit eadem ijsdem ac in febre maligna. & annot. obs: 2das.

Cap: 5um.

& obs. 2das. De Variolis Morbillis et Mal. [illegible] et 3. water pocks or Blebs

Medico prudenti [illegible] et sagax.

Omnino Sydenham Variola

Ad oculos conservandos mitte paucos croci in aq: plantag: et instilla in oculos.

Variolae sunt fermentantis & turbatis maturae sanguinis ebullitio, ex contagio & effluvia ab aere et aegri corpore, in adultis praecipue infantibus; unde tubercula rubra 3o & 4o die ab invasione circa [illegible] praecipue apparent, quarum tamen eruptio tota, nonnullis in diem diei sexti perficitur; interea tamen quae primo [illegible] versus maturationem sentim vergunt (ut quae serius erumpunt subsequentibus) et maturationem die nono ab invasione attingunt. Hoc ex maxima numero tuberculorum ante finem diei 4i & multis 5i [illegible] ostendit, [illegible] dies perfectae maturationis ab Authoribus considerantur, est ordinario undecimus; ideo ut [illegible] a Mulieribus dicatur. In variolis dari [illegible] [illegible] priusquam erumpant, quibus durantibus aegri subitem, quasi [illegible] expergefacti, maxime febricitantes capitis dolore, et aliquo [illegible] vexantur. [illegible] [illegible] et insomnia, et aliquo etiam vomunt, [illegible] [illegible] priusquam tota erumpant, [illegible] [illegible] militante [illegible] omnino [illegible] totam eruptionem [illegible] [illegible] [illegible] dies [illegible] maturationi, [illegible] [illegible] [illegible] erupti:

one

ome, quibus durantibus febris secundaria ob resolutionem mali puru-
lenta expectanda erit.

Signa ergo Variolarum bonae indolis sunt 1º. Subrubicunda rubra. 2º. Ro- | Signa
vata, pyramidalia, dolorifica in initio, praecipuè in manus et pedes vo- | Bona.
lis, quia in illis cutis est valdè densa, et non facilè cedit pustulis erum-
pentibus. Hinc est, quod his in locis Variolae semper sunt planae et expansae.
3º. Dispersa. 4º. In extremis alba. 4º. Pruriginosa. 5º. Mala benignae
lactea, non spissa.

Signa Variolarum malae indolis sunt 1º. pustulae numerosae in unum | Mala.
coeuntes. 2º. Violaceae. 3º. Crustosae. 4º. Subvirides. 5º. Horridae. 6º. Maxi-
mè fluidae. 7º. Membra corporis, praecipuè oculos depascentes. 8º. Subitò
erumpentes et subitò retrocedentes. 9º. Surditatem et sim. inducentes.
10º. Haemoptoe et micto sanguinis, fluxu hepatico comitatae. 11º. Urinâ viridi associatae.
12º. Planae. 13º. alvo [illegible] conjunctae solutâ.

Morbilli sunt maculae rubrae, planae, expansae, et contiguae, fe- | Morbilli.
bre, cephalalgia, siti et [illegible] erumpentes, quae post eruptionem
mitigantur; alias malum. quod in Variolis accidit. [illegible]

Crystalli sunt pustulae pellucentes à Lympha, quae ob suam | Crystalli.
crassitiem, et cutis densitatem dissipari nequit, nec à Lymphaticis exci- | A. H. P. [illegible]
pi, et resorberi, quae aliquando ob sanguinem commixtum, ruborem prae se ferunt:
in initio.

Cura sit, vomitus ut, quamvis circulationem liberiorem et eruptionem | Ad foveas praeveni-
promovere in plethoricis observentur, nisi: sanguis post modicè sudorifero moveatur; ex aqua C. B. exprimo [illegible] ex croco, | endas. Imbuatur
et paulo croci, fiat. Sic 1º. bolus, ex sp. Calend: | pluma ol: amygd.
ferè morbi decursu. 2º mixt: ex aq. C. B. Calend: anal: cinam: cord: | dulc: per exp. ??? et
āā ℥i. Bez: Min: gr: IV. antim: Diaph: ʒß conf: Alker: ʒij. syr: Cariophyl. | inungantur Variolae
℥i et papav: si febris sit maxima, et diast: si alvus ullo modo sit solu- | dum erumpunt per
ta, cum in casu usus vini rubri et Dec: C. C. maximè prodest) et laud: | spatium quatuor dierum.
si vigilia vexent, et Spa. Catt: si pulsus ullo modo sit languidus et | Contra Pitt.
eruptio non benè succedat; quo etiam in casu Dec: ex fimubus, stercor | Crocus cum Theâ.
e ovillo, cicere rubro, et C. C. plurimi commendant. Hisce continuatis | Pulv: ocul: Cancr:
ad ... et ... ab invasione noctem, incommoda febris secundariae à | comp: ʒj x ij. sem-
... vastatione puris expectandae, praevenienda erunt Mixt: involvente | bis, ter, quater in
et acrimoniam diluente, ex aq. papav: ℥ij cinam: cord: ℥ij et syr: Dia- | Die. Tinctura Diale:
cod: ℥j singulis noctibus exhibita durante febre secundaria; sed si | gargarisma 2. vino:
... sit languidus, mixt: prior et addendo pulv: Comitis: et lap: | ad fauces defenden-
... in syr: Gariophyll. loco tamen Lapidis Goa. | das in initio vario-
... continuanda erit. Inde 3º. Per totum morbi decursum lac- | larum, et in fine
cum ex croco et aq: ros: et mussilag. sem: psyllij et cidoniorum circa | emplastrum; utatur
fauces tenendus est, ut et etiam, si vis, sup oculos, pro quibus etiam | Salivatio semper mo-
lac muliebre non parum prodest. 4º. Spatium post pustularum ruptionem | movenda, quorum
per ... ex: ... albi et ... Coli. ℞ ol. amygd: dulc: ℥ij | probibus Dec.
Sperm: coli ℥ij Ol: Stillat: Rhodij gutt. 4. M. f. Ung. S. A. ad foveas delen-: | noctibus. Decoctum
das praestanti simus remedii. Bael. | aqua si non ...
D. ... | dat, nec alia ...
| fica, sed Sympton:
| gravia ...
| ... ʒij ...
| ...
| ... Dolore:
| ... ol. amygd. ... ponat:
| āā ℥ß. post variol.
| ... D. 2.

Pro deliriis, ... vid. p. 77. ad initium. ... Erysipelas, seu Phlegmon, ... si ... calido ... Gangraena ...

Partium externarum conniveant, ostiata satis bene promovens; et salivationem.
Diluentia, ut Dec. pector: Dec. Theob, &c. Ham. 237. & Obs: (mar.

Obs: Variolas crustosas egredi ma... purulenta impedientes, adeoque eam totam in corpus reffundentes, posse aliquantulum, si ullo modo, sublevari inunctionibus repetitis ex ung: martiato pro toto corpore; ut et antelitu ovis vivi, capite suo infra stragulas versus aegrum locato; ut et vaporibus malv: chamom: et sim. aqua in coctis converiente sub stragulis ab aegro receptis; ut etiam fabucula ung: ... immersa, et qua aeger involvatur.

> ... in ... ... erunt morbi..., ... febr. dysenteria et alia, ... fiat ... larga, semel, bis, ... &c. Et Diarrh: Morbillos sequens ... ...
>
> Dec. Cancr. Margar: ... et sim. cum diluentibus febris accensionem & calidorum usu reprimuntur ... & Hordeo. Ham. 237, 242. & Boer. p. 158.

Cap: 6tus.

De febre Erysipelatosa, scarlatina, Scorbutica, et sim.

Febres hae quocunque modo invadunt, nunquam certo cognoscuntur, i.e. nullo modo a febre ardente & maligna distinguuntur ante varias eruptiones, quae inflammationis more, totam & maximam partem cutis occupant, ... inflammationis symptomatis. Et hi febris Erysipelatosa & Scarlatina nuncupantur. Si vero morbillorum more sese manifestant; ... parva & nulla symptomata febris miliaris, hac febris ... Scorbutica a quibusdam appellatur, et ab aliis inter malignas recensentur, et non inepte, cum maxima ex parte, eadem habeant symptomata.

> ... plerumque ... ... dolore

Differunt hae febres respectu materiae in sang: introductae, & respectu diversitatis sanguinis in quos introducitur, i.e. suppositis respectu diversitatis sanguinis in quos introducitur, i.e. suppositis ... sang: scorbutico & non bene coherente, et motu in eo introducto, et ... rejectilia multo potiore jure erunt non solum distincta ..., ... sed etiam saepissime magis decolorata, quia ea sang: magis ... harentis.

Cura omnis talis febris componitur ex ea Ardentis et Malignarum, prout ... et alia in iis symptomata, relationem ad unam aut alteram habere indigitant. In genere tamen febres omnes eruptionibus comitatae, ut Malignae ab Authoribus tractantur.

> ...re.

Cap: 7mus.

De febre Hectica, ...

De hac habetur in Phthisi et Tabe tractatus est.

> Cort: peruv: opt...

Cap: 8vus.

De febribus Continuis Periodicis et Erraticis.

Si nullum sit tempus a morbo immune, et periodi stato tempore invadunt, sit Continua Periodica; sed si periodi incerto tempore redeunt, sit Continua Erratica.

> Heart-sweeds.

Febres hae ... modis variis observantur; aliquando enim sunt Quotidianae continuae, i.e. semel in die exacerbationes admittentes; aliquando Tertianae continuae; aliquando Quartanae continuae; aliquando in uno die

die varias exacerbationes et remissiones admittere observantur.

Causa. Cum haec febris ex Continuis et Intermittentibus sint composita, idcirco earum causae ex utrisque deducentur. — Causa.

Cura fit 1o. et 3. ob febrem continuam 2o. Vomitorio, ob Intermittentem. 3o. Dec: amaris cum et sine Senna. 4o. Omnibus aliis et in febre Continua et Intermittente, prout materia morbi ad primam vel secundam magis vel minus accedit. 5o. Infusione Chamaedrios cum sale febrif: et si vis aliquid cum Sennâ. — Cura.

Cap: 9num.

De Febribus Intermittentibus.

Aquae. Vet. Boer: praesertim in curatione singulares gradus, et recidivinae post curam.

In Quotidianâ paroxysmus quotidie redit, et eadem fere horâ, in qua distinguitur à Tertianâ duplici, in qua 3tius dies respondet primo, et 4tus secundo exacte. In hac humor pituitosus ab Authoribus culpatur, et lingua non est arida, sed insipida.

In Tertianâ parox: tertio quoque die redit: adest oris siccitas, et urina et vomitus sunt biliosi, adeoque Bilis ab Authoribus culpatur.

In Quartanâ parox: 4to quoque die redit, in quâ materia crassa et austera culpatur, adeoque saepe in Cachexiam degenerare observatur.
Helmtug: Riverij ad Quartanas. Cent. 3. appendix.

Dissolvatur vitellus ovi in poculo vini, et bibatur in initio parox: frigidi.

In Hemitertianâ seu Semitertianâ tertius dies respondet primo, in quo duo sunt parox: et 4tus 2do in quo unus tantum est paroxys: ita ut sit morbus compositus ex Tertianâ et Quotidianâ. Hoff. p. 51, 388, 534, 570. Tertianae duplices Baglivo dicuntur Mesentericae. Hinc etiam observanda triplices, et quartanae duplices, quae cum judicio distinguendae.

Infunde Sal. absynt: in aq: per x horas, colatur: cinq: ad medies Drachm. Zi v sudet, et sinitur, cum sit.

In omnibus paroxysmi invadunt cum lassitudine totius corporis, respiratione difficillimâ, anxietate, pandiculationibus, frigore in extremitatibus incipiente, pedetentim ad rigorem, horrorem, denique strepitum, oris collisionibus, oscitationibus, et saepe cum cephalalgia, nauseâ, Vomitibus; post quae subsequitur calor intensissimus, Cephalalgia, Delirium nonnunquam et Siti, respiratione ... dein sudor paroxysmum solvens: remissio omnium symptomatum, urinae crassitudo, sedimento ... et denique sudor paroxysmum solvens.

[illegible marginal notes]

Causa. Causa est astutio materiae ex latibulo aliquo corporis in sang: quae per variam ejus texturam vel citius vel tardius intra sua latibula digestionem acquirit, et ob latibuli angustiam foras prorumpit, unde ob ejus crassitiem aut lentorem, oriuntur frigoris symptomata; et inde tractu temporis, attenuatâ illâ materiâ, subsequuntur febris symptomata, et tandem adhuc ob majorem attenuationem, fit sudor paroxysmum solvens.

Causa proxima consistit in viscositate ... arteriosi ... et ... vide Boer.

Cura vide in ... materia.

N.B. vomendum esse statim à paroxismo finito — 22. Δ ... paroxismo Boerh. 758. 9. 3. 4.
Et statim post cessatam emetici operationem, ... se semper novit Boer:
... exhibendus Cort. peruv. ... ʒj ...

... quod constituit ... paroxysmi: et ... crassiti ... quod constituit ... principium: nam sang: mistio crassitiem imminuit. 2º vomit: ... febris ... in Hamoptoem sit pronus; quia hac crassities ... à sumptis ... provenit. ... ex primis viis sæpe derivat. 3º Dec: amaro ... sale ... pro pulv ordinario, ... sine sennæ pro 2bus ... 3bus dosibus ... pulv ex rad: Gentian: cort: Sassafr: et fl: chamom: quæ eadem dosi, vel majori exhiberi debet, qua cortex peruv: 5º. pulv: cort: peruv ab ʒß ad ʒvj. intra ... paroxismos exhibito, ... divide pulv: in 6 aut ... doses, ... exhibe primam immediate post paroxismum, ... Limon. ... papav: et gtt: aliquot Laud: imo ... paucis ... doses, ... paroxysmi, ... quatuor horas ante ... sequentem paroxysmum, ... sperandum ... tamen ... omnis paroxysmus ... corticis in vino ... ad ... ʒj ... mode operantur ... et 2 ... Dos: aq. ... ʒj ...

Hæc omnia media sunt aperientia et attenuantia ... morbo nunc à lentore producto opponuntur. Non ergo morbi fomitem intra latibula, ubi credit, figunt; Omnis enim purgantia ... corticem exhibitam morbum redire faciunt, non tamen ex ... obstructionem, uti volunt, à cortice ... solvant, sed quod educant partes sanas: magis liquidas et aquosas, ut sic reliquas magis crassescant. ... 2das.

In Quotidiana dosis minor corticis ordinario sufficit, quæ satis facile inter duos paroxysmos exhiberi potest.

In ... tertiana duplici et sim. ubi paucissimæ horæ à paroxysmis sunt liberæ, ... est ut corticem denique omni tempore, nisi in paroxysmis ipsis. FINIS.

In fine parox: ... 4 pulv: ... ʒß laud. gr. j ...
ffl. camom: anlim. diaphor: sal absinth. morton:
... intermitt: semper vomend: et purg: ... Cort: peruv ... martialia ... hydropem ... peruv: ... corpore ... et circulando ... sang ... pulv: ... sana: ... fermentis subjugat. Stournef. de Cort: peruv:

... fermentis ... absorbendo, ventric: confortando, et ... tumorem ... exhibebatur ... Laud: ... adstringentibus ... ante ... à paroxysmo ...

ʒiv. singulis binis horis.

... Paroxysm ... quotidiani ex China China pulv: ʒj. ij. iij. & iv. ex aq: hordei ... Hofft: ... p. 27. ... gr: XV. vini albi ʒiij. exhibe patienti 2 horas ante parox: ... 3 aut 4 horas ... eodem modo ... paroxysmi. ... tertiana Sydenh:
℞ Cort: peruv: ... ʒj ... Caryoph: ... Sydenham.
... clyst: ex cort: peruv: et pulla ex eodem corpo appli... alii alligant ... corticem ... infantibus ℞ ... corat: nig: vini Rhen: ãã ʒiij ... peruv: ... ʒiij. syr: Caryoph: ʒj ... Sydenham.
℞ Dec: Cort: peruv: ... Cort: peruv: ʒij ... ʒß ... Sydenham

ʒj. Ther. Venet. ʒj. Syr. Lim. q. s. ut f. Elect. divid. in 4. doses, cujus cap. j. omni tri=horio, sumpto jusculo tem=pore intermedio. Dr Gurry.

Potus sit, tenue limonadium, [Limonade] vel Ptisana ex rad. Acetosæ, fragorum (Strawberries) fol. Dent: Leon. & rad: Glycyrr:

alius.

℞ Cort. Peruv. opt. pulv. ʒß. infund in vini [Burgund.] veteris ℔j. vel ℔ß spatio 12. hor. sæpius conquass. cap. omni trihorio unam quar=tam partem dictæ mixturæ. sumat jusculum intermedio tem=pore.

vel

Cort. Peruv. opt. pulv. ʒij. infund in vini [Burgund.] veteris ℥ IV. V. vel VI. [un bon verre de vin vieux] Mistura ponatur in Phi=ala vitrea optime obturata, sæpissime conquassando. post horas octo exhibe (nulla am=plius existente febre) & post duas horas, exhibe alimentum ægroto.

Prenez deux dragmes de bon Quinquina bien pulverisez, jet=tez dans un bon verre de vin vi=eux dans un bouteille, qu'on bouchera, & qu'on aura soin de remuer frequemment pendant

si le [illegible] [illegible] opérera pas à la
premiere fois, il faudra pratiquer
la même chose une seconde fois.
mr Collin, à Dijon.

Index praxeos.

Lib: 1. De Morbis Capitis.

Lib: 2dr De morbis pectoris.

Lib: 3tius De Morbis Abdominis.

Sect: 1ma De Morbis Ventriculi.

[illegible] heures que [illegible] in[illegible]
infus[illegible]. Quand l'accez de la
fievre sera passé, il faudra tirer
de nouveau [illegible] de la bouteille
et verser dans un verre le vin
[illegible]llé de Quinquina, que le ma[lade]
[ava]lera. Il faut demeurer
[illegible] l'espace de deux heures
[illegible]

In [illegible] intermitt. [12]

℞ [illegible] Peruv. opt ℥ß. sal. absinth

ʒj. syr. capill. Ven. q. s. ut f.

[illegible] [illegible]. in 4. doses,

cujus capiat j. omni bihorio

sumat jusculum Gallinaceum

intermedio bihorio. [illegible]

al[illegible]

Lib: 4us De Morbis in habitu Corporis.

Lib: 5us De Febribus.

[illegible] [illegible] narium

Curat[illegible] vel V. S. in brachio, evacuando vasa et diminuendo volumen sanguinis; vel usu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; vel [illegible], quae habent fere eundem effectum; vel [illegible] in [illegible], ut Lino vel [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] Oli, bufone siccato et appli[cat]o naris radici [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. n. 24.

Luis Venereae Cura in Gravidis

Si sit in primo gradu, et gravia Symptomata non causet, curatio eradicativa differenda, et tantum palliativa tentanda usque ad ~~tem~~ partum, regimine convenienti, leviq[ue] purg. subinde repetita. ~~[illegible]~~ Si etiam in ultimis graviditatis mensibus corripiat[ur], similiter differat[ur] cura ad partum. Sed si primis mensibus tentet, et Symptomata sint continua et urgentia, tunc aggrediatur Cura placide et circumspecte; non [Mercur]io d. per os assumpto (quod cavendum) sed Ung. [Mercur]iali superioribus tantum partibus inuncto, cavendo Diarrhoeam. Salivatio sit parcior, sed longius continuata, quam ordinario fit. Cave a Balneo, et ejus loco ptisana, et aqua ad salivationem facilitandam. Mauric. l. 1. c. 25. exempla ib. et in Observ. et Haldan. cent. 5. obs. 97. Sanchez Obs. Varandeus l. 2. c. 4. de morb. Mul.

Observationes Practicae

Abdomen. Cujq in omnibus morbis extenuatis prava. 3. In omnibus inflatio superveniens ac. ... imminentem mortem infallibiliter ...

Abortus. 1. Ex mamma subita extenuatio praedicat, et si dextra, marem, si sinistra, foeminam. 2. In corpulentis accedit ob nimis mucorem. 3. Splendens ex saepe causat. 4. In promptu est ex impotentia nutriendi ex aquo ... et ... gerendi. 5. Ex ore aphthosa praesagiunt. 6. Eum gravitas quaedam insolita lumborum et coxarum, ex frigiditas quadam ad modum praedicat; ut et vagus in abdomine dolor. atque 7. sang: aquosi aut liquoris aquosioris eruptio. inde conceptio. Sterilitas.

Aetates. 1. partis inferioris finem morborum afferunt. 2. partis superioris ... ... raro morbos solvunt, nec a ... nisi noxa. 3. parti eminentes acuminati ... in vomica pulmonum omnia ... sunt ... duo ... sordo modo ... expurgari

Aetates. Primò Infantia, illis 1. oris ulcera, vomitiones, tusses, pavores, umbilici inflammationes, auris humiditates, sunt familiares. 2. ad dentiendi tempus accedentibus, fiunt gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia maxime ex dentes canini erumpunt, et iis praeter ... qui crassissimi sunt.

Secundò Pueritia. ... tonsillarum inflammationibus, vertebrarum luxationibus, asthmatibus, calculis, lumbricis, verrucis, strumis, et aliis tuberculis. 2. difficultas ... 3. In ventrem saepissime jacent. 4. De nocte excutiendi ad mingendum. 5. Non tentantur ... ...

Tertiò Pubertas. 1. ... ... fere comitantur ad mortem ... ... et alii morbis si circa ... ... non solvuntur. 2. His si alvus sit humida, in senectute siccatur, et è contra. 3. His sang: expuitiones, tabes, febres acutae et similes praecipue accidunt.

Quartò Virilitas. 1. His fiunt asthmata, pleuritides, febres ardentes, lethargi, cholerae, dysenteriae, lienteriae, haemorrhoides.

Quintò Senectus. His 1. febres raro fiunt acutae. 2. His morbi qui in juventute rariores, sed ex accidunt diuturni sunt, et plures qui moriuntur. 3. His fiunt spirandi difficultates, destillationes ex tussi, stranguriae, dysuriae, arthritides, nephritides, vertigines, apoplexiae, vitiligo, cutis pruritus et humiditates, visus hebetudines, auditus graves, mali corporis habitus, raucedines. 4. His inediae sunt tollerabiles. 5. His calorisque ... alvus est sicca. Vide Senectus, Pueri. 6. alvus adstricta juvat.

Alvi fluxus. 1. Prodest in ophthalmia, ut et in leucophlegmatia. 2. Balbis est familiaris. 3. Superveniente surditate cessat, et è contra. 4. In eo lac malum. 5. In gravidis abortum minatur. 6. In tabidis lethalis, si simul capilli defluunt. 7. In pleuritide malus. 8. Solvitur vomitu sponte superveniente. 9. Si febri ardenti supervenerit molestior. 10. Rigor morbo extenuatis superveniens, perdit ... mortem indicit crisim et malè maturationem impedit nisi die critico accidat.

Marginalia:

Bagl. 125. non procedit illud ab uterò, sed est ... ... affectionis utriusque nim intemperies aliqua corporis.

vide Animi path: 50.

vide Ulceq.

vide Sang. enim videm et ... ... donotaq. Bagl. 126.

vide quia humoribus pluribus abundant.

vide ob ... ... acquisitam, et ... ... à poris ...

vide de Stranguria in Praxi.

Bagl. 127.

vide ... enim ... ...

vide ... ...

vide ... ... morbi curam ... ... si ex eâ ... ... impedit. Bagl. 127.

indicat. 11. Rubor in omnibus morbis malus. 12. In eo sanguinem & Gingivis effluere malum. 13. In sensilis et involuntariis, ex tamen Patiens alid sit apud se, malum, ut et ex purgantis Medicis quae pro firmando et adstringendo adhibentur. 14. Juvenes ex alvo humido, exsiccantur in senectute, et e contra. 15. Liquida insensibiliter ferri, quamvis patiens alid sit apud se, pestiferum. 16. Horriduli, anxii, fastidiosi, membris dolentes, et fasti; profusione tandem sunt alvo. vide Diarrhaeas speciem. 17. In morbis capitis salubris, in morbis vero pectoris perniciosus. 18. alvi laxitas cutis densitas; cutis raritas, alvi densitas. Hipp.

Angina. 1. Si in ea mali ad pulmones fit conversio intra 7 dies est mortifera, si hos effugerint, purulenti evadunt. 4. Si in ea tumor oriatur in collo bonum; foras enim morbus vertitur; bonum etiam si tumor in pectore supervenit. 3. In ea omnia sunt mortifera quae dolorifica mala foras non edunt. ideoque in ea faucis aequalitas, sputa subalida, glutinosa, et difficultas excreandi et spirandi potius etiam frigidi pessima. sunt pessima. 4. In ea tumores in lingua clam evadens emes mortiferi; ut et dolores sine causa sedati; ut et rubores intro recurrentes. 5. In ea si repente et involuntarie stercus excernitur, desperandum est. 6. In ea si vergant dolores ad caput ex febre, pessimum. 7. In ea, qui cocta non cito expuunt sunt desperati. 8. Ejus in Hypochondrii dolorem translatio clam necat, quamvis videatur tutissima. 9. In ea [illegible] tubi expressus, malus. 10. Si in ea ex Stranguria[?] Sputa circa aspirationi, saepe ... 11. Sit saepe a mensium & hemorroidum suppressione quod animadvertendum. 12. Si vinct [illegible] Angina vero inflammatoria ad incurvitatem ex scarificatione, & cauteria, & scarificatione recurrendum, & vesicatoria. 13. Seriis si supervenit dolor faucis, tussis magna ex parte, circa colli et fauces dolores, et difficultas spirandi.

Animi pathemata. 1. In maerore fiunt ventriculi languores, inappetentia, oris amarities, bilis circa mane, cruditas acida et nidorosa, flatus, tensiones hypochondriorum, indigestio, morbi chronici, obstructiones, tristitiae, scorbutus, affectiones hypochondriacae. Diarrhaea. 2. In eorum cura blande procedendum, et a nimia remediorum copia quam maxime abstinendum. 3. Maeror nil frequentius producit quam Diarrhaeas, quae supervenientes febre erratica et atrophia, fiunt mortifera. — Secundo Ira, quae 1. Diarrhaeas saepe causat, et si non illas, febres malignas. 2. Ira moderata convenit Cachecticis; ut et in mensibus obstructis: 3. Ex Ira & terrore Nutricis, Infantes Epilepsia sunt obnoxii. 4. Terrore Haemorragiae periculosae saepe sistuntur. 5. Si pathemata graviora sunt, & abortus in gravidis causant. & vitioso charactere infantes notant. 6. Metus solvit alvum militibus non valde animosis: 7. Maeror et reliqua animi pathemata immediate producunt febres malignas, ut observatur in urbis obsidione.

Fauci[?] Generatio. Primo in Genere. 1. A Comitiali morbo Juvenes mutatione aetatis, regionis, victus, liberationem accipiunt. 2. In pert=

* signum enim est fluxus hepatici.

& ad finem.
Bag. p. 53.
ib. 66.

i. e. maerorem purulentam mala: [illegible] in ulcere [illegible].
Bagl. 25. versio: phago non affi: ... in larynge.
[illegible] scapulas.

Bagl. 131

134.

ab Intestinos laxitate ... potissime ab Intestinos irritante et humores fundentes.

... etiam immediate ... in eq: & in eq: ex ... maeror in ... ex improviso fiat.

Bagl. 134.

[illegible marginal note along left edge] ... Hipp. Foriendo.

perturbationibus ventris, et supra et infra, si qualia fieri decet purgentur, confert, et facile ferunt; sin minus, contra. Quocirca considerare oportet anni tempora, regionem, ætatem, et morbos in quibus expedit, vel non. Secundo Ver, est 1. saluberrimum, et raro exitiale. 2. post hyemem pluviosum. Ver siccum in causa est quod mulieres quibus partus in ver incidit, facile abortiant et infirmos infantes edunt; in causa etiam est, quod Dysenteria et Ophthalmiæ sint frequentes, et senibus Catarrhi perniciosi. 3. post hyemem siccam et aquilonium, ver pluviosum febribus acutis comitatur. 4. In eo fiant dolores podagrici.+ Tertio Æstas. In ea 1. senes optime degunt. 2 Cum est similis veri in febribus multi dantur sudores. Quarto Autumnus est 1. tabidis malus. 2. In eo morbi acutissimi et perniciosi. 3. In eo febres intermittentes sunt longæ. Quinto Hiems. 1. Bona est ætate constantibus. 2. In ea pueri facile tolerantur. 3. Pleuritides, peripneumoniæ, tusses, pectoris et lateris dolores in ea abundant.

i. e. vomitionibus et purgationibus.

Nowaer under foot ....

quia corpus humiditatibus replet, et verus calor eas agitat

+ humores fixi hyeme a veris calore agitantur, sed nonnunquam ut circa sanguinem ... in æstate in autumno recurrunt quia ... minor et ... hyemis ...

Hipp.

Apoplexia. 1. Nutritur pituitosa ab Hyeme et pluvijs. 2. Si vehemens sit, est incurabilis, et quamvis sit levis, non facile curatur. 3. Fit a cerebro vehementer percusso. 4. Si frigore et sudore frigido comitetur, est mortifera. 5. Febris ei superveniens est salutaris, ut et hæmorrhoides supervenientes; sed si febris sit solummodo lenta et languida, mortifera est. 6. Si repente sudoriatur est sæpissime solubilis. 7. In ea si post A. S. respiratio et pulsus sint liberiores, salutem prædica. 8. Si vertigo ei succedat, novos fervores in tullo experta. 9. Iis clysteres exigua quantitate injiciendi, ne cito iterum effluant; et si non obstante effluant et prorsus retineantur, malum. 10. In ea spuma oris lethalis est. 11. Ab ea raro fit evasio sine alicujus partis paralysi; et si paralysis sit in multis partibus, fit cito mors. 12. Ei et paralysi obnoxij, et jam ijsdem correpti, Borborygmis et Inflationibus ventris molestantur. 13. Si ei et vehementia morbi Apoplexia superveniat Gutta serena, plerumque mortis signum est. 14. Si illa aut alius morbus somnolentus morbo acuto superveniat, periculosum admodum censetur. 15. In senibus plerumque lethalis. 16. Si ei aut alio morbo soporoso superveniat Phrenitis, sanitatis signum est; et e contra. 17. Arcanum in sanguinea in initio est A. S., in pituitosa Emeticum, et purgans expulsivum: Urina Chinæ. 18. Si ex consensu partium inferiorum, vel a vaporibus ex visceribus, originem ducat, nullo modo periculosa habetur. 19. In ea mortui ante tres vel quatuor dies non sepeliendi. 20. Abstractio sang: in magna portione generanda, malum. 21. In ea fluxus alvi salutaris, ut et in omnibus capitis morbis. 22. Si pulsus ex parvo magnus sit, et magnitudine crescit, mors patienti ... 23. oblivio post eam, pessima.

i. e. Lame inder ver.

Bagl. 75.

... Hipp: in eisdem ... ejus ...

118.

T. 1. 2. 71. 75. 227.

et infus: croci metal: in vino.

vi. Sutton.

70.

Wall:

Aqua. 1. Ea quæ cito calefit, et cito refrigeratur, est levissima. 2. Pluvialis etiam levissima. 3. Aq: multa quamplurimis pestifera.

Brog-wort.

Arom:

[illegible] mulierbria educit, saepe tamen ad alia utilis est, nisi capitis induerit gravitatem.

Arthritis ejusque species 1. Pedes cum sint praecipua sedes maa arthritica, si eos dereliquerit, et si ex iis alias partes invaserit, signum est periculosum; podagra vero fomitem ingenter adauctum, et ejus manus, cubitos, genua, manillas, et invaserit, ratus fuisse in cura, et corporis vigorem imminutum esse. 2. [illegible] humor invadit, casu tentatio quasi ponderis ingentis ei appensi, absque tamen doloris vehementia; si exinde ad genu descendit, motus ejus propemodum inhibet. 3. Foeminae raro podagra afficiuntur, nisi viragines sint et senes, et rheumatismo aut hystericis affectibus plurimum obnoxiae. 4. Si derepente eruperit, et exsiccatur, nec per alias vias materia sit eliminata, ad interiora remigrat, et colicam et stomachi dolores, et vomitus, et lethargum [illegible] aliquas stagnantes producit. 5. Temporis progressu calculum saepe producit; saepe etiam stranguriam, dysuriam, pruritus scroti, mictus sanguinis, et sim. 6. Qui pane hordeaceo vescuntur raro sunt arthritici. 7. Non ob podagram, sed quia ad articulos non defluit, moriuntur aegri. 8. Arthritis in hydropem, anasarcam, et ictericos degenerat. 9. Ante invasionem paroxysmi urina, sputa, et sudor parcius procedunt. 10. Eam [illegible] solito vehementior excitare solet; 11. Varices doloribus his supervenientes solent [illegible] ad [illegible]. 12. Qui saepe calcat uvas, aut in musto balneat pedes, rarissime podagra afficitur. 13. Qui vehementer exercitantur post cibum in articulorum morbos disponuntur, et jam factos adaugent. 14. In ea fonticuli saepe prohibiti. 15. In tumoribus pedum ante et post podagram, nullum exhibe medicamentum nec internum nec externum, praecipue in senibus, ne materia [illegible] translationem et apoplexiam et asthmata, et pejus producaris. 16. Ischiade correptus, eadem hora et paucis elapsis a doloris invasione, si purgans dederis (ut Syr: de Spina) vix absoluta hac, et ad summum altera purgatione, aeger certo sanabitur; non ita vero si morbus ad plures dies fuerit protractus. 17. Articulorum dolores et tumores in junioribus frigida largi effusa levantur et solvuntur; saepe etiam casus et supervenienti urinae crassa multa alba, et haemorragia narium. 18. Ischiade diu vexati luxantur, claudicant, et crure contabescunt, nisi urantur. 19. Eunuchi non fiunt podagrici nec pueri ante veneris usum, nec menstruantes. 20. Podagra vix ultra 40. dies durat. 21. Arthritici non raro fiunt colici, et e contra. 22. Arthritis fere semper incipit a pollice pedis. 23. Veneri et Baccho [potu] indulgentes ad salicitatem, et arthritidem, et calculo, et utrisque corripiuntur. 24. Podagrici si aliud exercere non possunt, exerceant vocem, sc. et libros alta voce legendo, [in amicis colloquendo, cantando,] et acid. 25. [illegible] omnia remedia erunt inutilia, nisi vinum, venus, otium et crap=

Margin notes:

... menstrua, et ... Ideo ea rari ... [illegible] reducunt.

Bagl. 187. et morbi.

188.

191. ... excitatem

190. ... [illegible]

190. 191. ... [illegible]

... [illegible]

194 ... quia ...

... continet ...

... et ...

vaulquorum pedes humectantur ...

195.

Ratio.

Nott.

Xiott.

... [illegible] ... 378.

Bagl. 82. 195.

35. ... 56. ad ...

ꝑ crapula, temperantia utuntur. 26. In Arthritide vaga, scorbutica conveniunt omnia ex pino, ut essentia pini, aq: pini, dec: pini, ext: pini, &c. 27. Podagræ obnoxii crania habent grandiuscula, habitus corporis ut plurimum plenior, humidus, salacem, et robustus. 28. Urina podagricorum primis 14 diebus rubicunda est, deponitque sedimentum rubrum, et quasi arenulare, et vix tertia pars potulentorum assumptorum urinam excernitur; alvus idem primis diebus inobediens est, et appetitus languet; quæ omnia, morbo ad finem tendente, paulatim ad statum pristinum redigunter. 29. Genuum gravitas et lumborum dolor, in non febricitantibus, purgationem postulant. Vide Calculus. 30. ꝑ superveniente Colicam aut Diarrhœam solvitur. 31. Melopeponum comestio, et potus aquæ ab iisdem prius destillatæ, podagricos ꝑ sanat ꝑ sublevat. 32. Post Spasmi et Coffee podagricis excellunt. 33. Laborantia quædam venarum loco affecto circumpositarum est signum veluti characteristicum jam jam advenientis paroxysmi podagrici. 34. Cui intestinum Colon in dextra primo dolebat, articulari morbo correpto qui olim erat; postquam vero hic curatus fuit, intestinum magis dolebat. 35. Dysenteria sanat podagram et alia, aliqua vero valde prosunt, quæ ad inferas sedes vocant. 36. Purgantia et Diaphoretica fortiora non ita bene cedunt ... sed optima ... notabiles instituta diæta, necnon remedia stomachica, omnium ... magis in podagricis et arthriticis. 37. ... podagram faciunt sanant ... post ... lac et ... ꝑ festis.

Asthma, 1. Convulsivum, ab humorali distinguendum, ut succedat cura. 2. In omni prodest V. S. 3. Ei si pleuritis ꝑ peripneumonia supervenerit, pessimum. 4. Ei si aposthemata excitentur in cruribus, sæpe solvitur morbus; magnus enim est contentus ind tibias et pectus. 5. Ei Dysuria superveniens, bonum; ea enim cessante, recurrit asthma vehementius, ideo nãa monstrante, dantur diuretica, nec salina nec acida (nam tussim movent, et morbum exasperant) sed ex pulv: millip: terebinth: bals: peruv: syr: alth: decoct: rad: aper: et sim: quibus membranulis non infensis. 6. Asthma post tres ꝑ quatuor horas somno impensas, derepente invadens, hydropem pectoris indicat, præsertim si manus aut pedes tumere ceperint, et faciei à nativo colore recessus, et post calores si succedat torpor brachii. 7. Asthma in senibus perdurat usque ad mortem. 8. Asthma aliquando in pulmonis inflammationem membranis, ideo eandem remediis volatilibus promove. 9. In eo prodest Spir: Coli a 37 ad 41 in jusculo calido. 10. Asthmate humido, subito cessans expuitio, remanente tamen asthmate, pessimum. 11. Asthma in febribus malum; convulsionem enim significat ꝑ mortem. 12. Ex asthmate aut Tussi qui Gibbi ante pubertatem fiunt, moriuntur. ꝑ Tussis.

184.
186.
Bagl. 66.
83.
185.
Cons. 192.
195.
196.
Ratio. 224
V. B. Chin-cough ꝑ Croup, in quibus vid. Bagl. 69.
Vid. ... in Bronchiis, et in quibus ... volventia præstant; et ... humorali in quo ... pituita vit... ubi ... pectoral: et expectorantia præstant ... translatio.

Remedia Lubricans optima, mira præstant in Humorali ... vel ... in ... movendo.

Auris affect. 1. Aures sibilat auster, exacuit Aquilo. 2. Aures aestate praecipue dolent. 3. In senibus auditus gravis. 4. Surditas in febre continua, imbecillo jam corpore, malum. 5. Surditas in febre, haemorragia, et alvi fluxus tollitur. 6. Ut surditas superveniente biliosorum per Diarrhaeam dejectione finitur, sic haec contra superveniente surditate cessant. 7. Aures frigidae, pellucidae, contractae, lethales sunt. 8. Auris dolor internus et intensus cum febre acuta, cum cephalalgia, dementia, urina pravâ, vel albâ, vel praerubrâ juvenes 7mo die aut citius interimit (nisi pus excernatur, aut naris fit haemorragia, aut alvus sponte solvatur, aut aliud fiat doloris remissio) seniores autem et serius et rarius tollit; sed tamen plerisque horum morbus revertitur et fit periculosus. 9. In acutis Bombus, i.e. murmur, et Echo in auribus maculis ominosus. 10. Surditas in acutis cum gravitate capitis, hypochondrii tumore, lividione, et oculorum splendoris offensione, haemorragiam significat. 11. Surditas cum tremore, et aliquali linguae paralysi, pessimum. 12. Surditas in acutis cum urina praerubrâ turbidâ nunquam residente, phrenitidem praenunciat. 13. Surditati supervenientes Parotides non contemnendae. 14. Aures gravidis admodum morbis obnoxiae, et in ipsis quam in oculis, majus periculum. 15. Surditas in febre cum signis coctionis, non est mala. 16. Surditas per intervalla crescens et decrescens, curabilis. 17. In auris suppuratione sub ulcere ... dolor gravis incurabilis. ... 18. Surditas quae in acutis critice fit, bona; mala, quae per intervalla in acutis observatur, et quae circa crisin evenit. 19. Sonitus et tinnitus aurium in puerperis, pessimus. 20. Qui citra febrim auris tinnitibus, capitis doloribus aut ... vertiginosus, et vocis tarditate, manuum stupore tentantur, in iis aut ... aut morbus comitialis aut oblivionem expecta. ...

vide tumores aurium, sicut et parotides ob humorum commotionem.

walsh.

Hip:

B.

Bubo, 1. Ex buvonibus febres omnes malae, praeter ephemeram. 2. Sunt mali qui statim initio febris acutae efflorescunt. 3. Sunt lethales cum alvo liquido, aquoso, et crudo. 4. Quo citius in peste apparent, eo melius; nam illa interna partes a veneni labe praeservantur.

vera est haec obs. in omnibus tumoribus et inflammationibus.

Bagl. 120.

Bagl. 127.

Bilis, 1. Ambo in morbos acutos, et diuturnos aut vulnera, aut quemvis alium morbum ... nigra Bilis, ac velut sang: niger per inferiora supervenerit, postridie moriuntur.

Cachexia 1. Senibus familiaris 2. Saepe in Anasarcam degenerat 3. Si concurrat Schyrrus hepatis aut lienis, aut si sequatur morbus acutus, nullam ferè admittit curationem. 4. Si supervenerit mulieribus quibus ordinarie menses deficiunt, ij difficulter et admodum lente curantur, sit vero phthisis, habes. 5. Si color faciei mediocriter bonus, repente mutetur in lividum et plumbeum, aeger repentina morte moritur paucis elapsis diebus aut mense ad summum.

Bagl. 117.

Calculus. 1. In Urina sabulosa Calculus indicant. 2. In Dysuria et Ischuria à Calculo, Mutatio corporis ut Calculus in Urethram non procidat, mictionem facilitat, aliud ac in hypersarcosi Urethrae, in qua nulla positio prodest. 3. Foeminae Calculo Renum laborantes, si gravidae reddantur, facilè moriuntur. 4. Dolori Nephrit: supervenientes sudores frigidi, aut frigus extremorum, cum omnimodâ urinae suppressione, mortem indicant. 5. Si Urinae antea tenues excernantur crassae, cum arenulis, bonum. 6. Lapis Renum certus quasi observat periodum, ita ut si modus sit circa renes die quarto, die septimo solet ut plurimum prodire, si lapis non magnus sit. 7. Difficilius in Senis quam in Foeminis curatur. 8. Calc: vesicae membranae inclusus incurabilis.[x] 9. Calc: haereditar: et in Senibus incurabilis. 10. Cum Ulcere Renum, incurabilis, quia enim lapidem frangunt ulcus exasperant; ulcus exasperantia negari potest & urinam purulentam 11. Vinum, Venus, Otium, et Crapula, sunt primi parentes Calculorum; Lactis usus, aq: potus, sobrietas, exercitium, et Temperantia lactis, et moderatus. 12. Sero lactis in Calc. est haustus aq: calidae, ad libitum, statim ante prandium; sit post excretum calc: est optimus praeveniens novi calculi generationi. 13. Dolor Lumborum rheumaticus à Nephritico certo distinguitur, ex eo quod aeger in terram incurvatus, in primo cum difficultate erigatur, et quasi in medio scissionem sentiat, aliud ac in secundo.[x] 14. Melopeponum comestio, et ab ovorum pulpa destillata aqua, calculosos et sanat et sublevat. 15. Millip: ppti. praestantissimum remedium in Urinae suppressione, calculisque frangendis. 16. In Nephr: sensus tensivus vel pungentis in ureteris, in haec parte sensibilis signum certissimum calculi. 17. Facto Seminis exspuo, si dolor quieverit, et postea eadem vehementia diei sequentis revertatur cum vomitu, dolorem esse Nephrit: pro certo habeto. 18. Urina cum plurimâ hypostasi apta est ad calculi generationem. 19. Si frequenter mentula contrectetur, et mictio desidendi voluntate comitetur, et si divaricatis cruribus, sit obambulatio, ex his tribus de Calculo vesicae certus sis. 20. potus Thee et Coffee maximè prosunt. 21. Qui saepe ve-

Margin notes:

... ex gr. Ammon: et Ol. ...
Empl. ex gr. Ammon. opt.

[x] ... Calc. ... sicca ob ... difficilem ... ... viris.

[x] In Infantiam ... Baur 82.

Ballio 224.

... Balli ... opt. { Bott. Zwecking.

[x] ... operatur ... utilis

[x] ... Lumborum ... curvat ... mictus, ... vatus, ... putores

mant et alvum lubricam habent difficilis calculosi. 22. Dolor fixus in regione renis, et vomitus continuus, calculum renis denuntiat, vagus non. 23. Aq: destillata persicariæ est [illegible] calculus hæreat, tum ruinæ corpus. 24. Calc: vesicæ adamussim mentitur schyrrus vesicæ. 25. Urina crassa, putrida, malula adhærens, est calc: vesicæ signum. 26. Signum omnium certissimum calculi vesicæ, est ejusdem contactus a cathetere. 27. Omnes calculosi facile fiunt Ictorici, et è contra.

Cancer. 1. Occultus non curandus; citius enim interimit quam non curatus. 2. In eo ulceratio prohibeatur, et suppurantia fugiantur; exulceratus enim lethalis. 3. Cancer suppuratus cor approximat, id est opprimit.

Capilli. 1. Eorum lapsus in tabe lethalis, et eo certius si sputum gravius erit, et fluxus alvi supervenerit. 2. Eunuchi non fiunt calvi, nec varicosi. 3. Calvi si deveniant varicosi, capillos recuperant.

Cardialgia. 1. Ei superveniens frigus, malum. 2. Si febribus malignis supervenerit, malum.

Carus, Catalepsis, et sim. vide Apoplexiam.

Catarrhus. 1. Senibus ob frigus est familiaris, et si post hyemem pluviosam et ver siccum accidat, sit sæpe lethalis, et præcipue si in pectus defluat; movet enim ad fortem tussim ulceris. 2. Ejus mansio diuturnior periculosa, et pulmonem prius laborantibus pestifera, præcipue si sit cum tussi siccâ; degenerat enim in phthisicam et phthisim. 3. Catarrhi à causa externa minus periculosi quam qui internam habent fomitem. 4. Cum fluit per nares, per os minus periculosus, magis suspectus qui asperam art: infestat. 5. Si facile fluat mat. catarrhalis res periculo vacat.

Cephalalgia. 1. Ver austrinus caput gravat, auditum hebetat, corpus humectat; Aquilonius in sanis omnia firmat, sed pectore dolentibus, dolores exasperat. 2. Qui valentes capitis doloribus repente corripiuntur, et protinus muti fiunt et stertunt, intra 7 dies intereunt, nisi febris eos prehenderit. 3. In urina jumentorum in febribus dolor capitis pus ... prodest. 4. Lac capite dolentibus malum, nisi ab acrimonia sit, tum enim bonum. 5. Occipiti dolenti sectio venæ frontis prodest. 6. In eo pus, sputa crassa, aq: vel sang: per nares, os, aut oculos, ... aut aures effluens morbum solvunt. 7. Dolor capitis prægrandis cum acut-

Sotte: ... Nihil Calc: fuit extra ... sed non ... ; ... , nisi ... et aq: 4. ... vini ... Hipp: Fabricius.

postea caput.

acuta febre, vel alio signo difficili plerumque mortifera. 8. Quibus cephalalgiæ frequentes cum vertigine tenebricosâ et tarditate vocis et manuum stupore, hos vel apoplecticos, vel lethargicos, vel epilepticos fore expecta. 9. In eâ cum delirio, alvo constipatâ, oculis volventibus, facie rutilâ, expectanda convulsio. 10. In percusso capite cum delirio et oculorum rubedine, nisi hæmorragia vel abscessus pone aures supervenit, fit citò mors. 11. Cephalalgici cum oculorum rubedine sanguinem profundunt, vel dolor ad cervicem vergit, et hæmorrhagiam ciet. 12. In cephal: vomitus æruginosi cum vigilijs, insaniam brevi denuntiant. 13. In cephal: grandi cum gravitate, et sic interceptio convulsione studet finiri. 14. Cephalalgici surdastri, qui manibus contremiscunt, nigra et aspera vel mejunt vel vomunt, planè sunt desperati. 15. In vehementi capitis dolore cum febre acutâ si urinæ conspiciantur crudæ, sc. albæ vel claræ, pessimum est signum. 16. Dolor capitis fortis subitò desinens, non sequente alteratione per crisin, est lethalis; signum enim est gangrenæ cerebri. 17. In cephal: si frigent externa, pessimum. 18. Quibus ex morbis partium inferiorum convalescentibus dolor cap: supervenit, sine excretione manifesta, ijs in cerebro futurus est abscessus. 19. Qui in febre cum cap: dolore queruntur de cardial: sc. de morsu et angustiâ præcordiorum, ijs subinde vomitus biliosi supervenire solent.[x] 20. In gravidis doloribus cap: soporosi et graves, sunt mali. 21. Cephal: quæ à principio morbi non erat, sed à corpore deturbato orta est, crisin vel à naribus hæmorragia, vel à vomitu futuram ostendit. 22. Si partem cap: anteriorem magis afficiat, stomachum affectum esse significat; si vel occiput, uterum vel flatus et vapores in culpa esse.[x] 23. Dolor pertinacissimus Zi pulv: de guttetæ cum decocto Zhoc optimè tollitur, ut et balneationibus pedum, ut et sternutamento ex rad: betæ ejusque succo. 24. Quibus cum sudatiunculâ caput dolet, alvo suppressâ, convulsione tentantur. 25. pulv: cornachini pro purgan'o in vertigine et capitis affectibus præcipuus est, nisi vehementer caput. 26. In pertinaci remedijs resistenti, suspicare de lue venerea. 27. pulv: fol: asari, gr: iij, 4, vel 5. ... somni, eodem servato regimine defluunt nares, opt. ut et in surditate. Whitehill.

Cervix. 1. Ejus durities et dolor, et maxillarum coarctatio, et jugularium pulsus fortis, pessima. 2. Ejus dolor in febre in ijs qui sunt in metu insaniæ, pestiferus. 3. Ejus tumores dolorifici citò vanescentes, pestiferi.

x his signis apparentibus vomit: exhibere, quocunque morbi tempore accidant.

Bagl. 78

x ad vomit: exhibendum.

v hysterica et antiscorica utenda.

fol: et succ: calend: et Betonicæ

Bagl. 80.

...

Mayern. p. 55.

Chlorosis. 1. Mulieres quæ diu vexatæ aut steriles fiunt, & prolem morbosam et parum vitalem edunt. 2. Salus speranda ex ei menstrues supveniunt. 3. Inutilis quibuscunque medelis solo curatur matrimonio.

Green-sickness. Bagl. 131. Panarolus.

Cholera: 1. In principio feb: malig: malus; ut in declinatione, si fit per modum criseos, bonus. 2. Quo magis patitur ventriculus, eo periculosior est Cholera. 3. Quo magis à statu naturali recedunt excrementa, eo pejus. 4. Talis cholera sicca flatulenta et acerrima, clysteribus pinguibus, Balneis, [et unctionibus pinguibus] et Narcoticis curanda. 5. Cholerici facti dysenterici omnes judicabantur.

Cholerick passion [ouerflowing Gall]. Bagl. 192. Hip.

Cibus. 1. Sano robur, febricitanti morbus. 2. Hyeme sit plenior. 3. Sit tenuis in acutis, et intermittentibus paroxysmis. 4. Qui in morbi initio cibos capiunt, et nihil exinde proficiunt, ij tandem cibos aversantur, è contra, qui cibos in initio fastidiunt, et postea bene appetunt, ij melius evadunt. 5. Impura corpora plurimo cibo lædantur. 6. Extenuata corpora sensim sensim reficienda. 7. Si in morbo bene edenti corpus non proficiat, malum. 8. Cibi fastidium in morbo diuturno malum, ut et in longis dysenterijs ex febre.

& Pursalio. appetitus. vel ex panatis seu panatellis, panadas or water-gruel, jusculis, &c. Walsh. Hip.

Cicatrisatio. vulc.

Cœliaca 1. Diu perseverans atrophiam & hydropem causat. 2. Si morbos acutissimos consequatur, lethalis.

Colica. 1. In ea si dolor sit vagus et per vices intermittens, bonus; si è contra sit fixus, cum vigilijs, alvo stipata, vomitu, singultu, delirio, refrigeratione extremorum, pessimus. 2. In colicâ biliosâ succedit frequenter aphonia et vox rauca; in doloribus à bile ortis apparere etiam solet, unde numerari poterit inter Diagnostica morborum a bile [frequens aphonia in colica non raro esse solet pro omnibus convulsiones epilepticas]. 3. In colicâ pertinaci si sudor copiosus et urtica supveniat labefactis viribus, brevi paralysin expecta. 4. Inæqualis distensio et constrictio ventris, rigidorum musculorum contractio, denotant nervos potius quam intestina in colicâ affici. 5. Nil facilius colicæ supvenit quam paralysis [vide below], cave igitur ne opiata copiosius exhibeas, ne sequente magno sudore [et syncopes] fiat paralysis. 6. Antidotus omnis colicæ est Chamædrys. 7. Ex opiatis utoris adde castoreum, nam ejus narcosim corrigit, et doloribus medetur. 8. Colica sero semper semicupio mitescit. 9. In Convulsivâ, et spasmodicâ, et aviis non omittatur [illegible]. 10. ~~Zeamentia~~ ~~nudas~~ [illegible] vomitus Anodyna, anodyna, et morosiosa. & Bagl. [illegible] p. 210.

Bag. 65. 231. Nott. in postdis, Clysteribus; Narcotica maxime vota nociva est. non recte v. Bagl.

Ip. A ego Respiro obstructio ex Arthrit:, [illegible] in [illegible] 3 i, [illegible] vij, [illegible] 30: [illegible] [illegible] opio [illegible] [illegible] vide [illegible] Fils. 177.

10. Dolor ventris à dram onia^nd nivos pedes q super pavimento frigida facta, apposi=
tis lateribus calidis: plantis pedum statim sanatur.
~~pedibus sup frigido pavimento, dein appositis lateribus calidis ad plan=~~

228. ~~tas pedum, sæpè sanat~~. 11. Colici sæpè fiunt Arthritici. 12. Dolor diu=
turnus quoque transit in abscessum, quoque in hydropem. 13. post fæces et
flatus emissionem, si dolor remittat, bonum, licet redeat. 14. Humora=
115. lis à convulsivâ rectè distinguenda. (vide not. 4. ante) 15. In colicâ pertinaci exercitia
Nott. equitatus, etc. prosunt. 16. Secretum est pulv: fol: ficus sylv: et fol: Ulmi;
prosunt etiam pil: ex rutâ et sale gemmæ, ut et tinctura succini, pil: Ma=
thei, etc. (pil: opiatæ) 17. In eâ cum siti potus aq: concedendus. 18. Excrementa non
retineri, dolorem locum mutare, nec non et intermittere, salutem brevi promittunt.
19. In colicâ cum vomitu, sudore frigido, etc. tinctura succini et præ[illegible] mortem sanat.
præcavet à futuro. 20. Diaphoretica cum opiatis mista felicissima in colicis. 21. Ante
usum opiati semper enema injicias. 22. Colica convulsiva pertinacissima, et voluti [illegible]
226. simo [illegible]: producta, [illegible] et remediis anodynis maxime dilutis brevi ac feliciter sanatur.

Hip: l. 5. 61. | ## Urina Mulier. | Hipp. 41. | Gravida. | et Mauriceau, 404. et seq. | Hipp. l. 5. aph. 59. | Hip. 51. | Hip. 42.

Conceptio. 1. De ea cogita, si maritus sint horrore aut febre
supervenientes menses substiterint, et simul adsit cibi fastidium (et vomitus aliqualis). 2. Aq. mul=
sa dormitura data, si tormina ventris excitet, conceptionem significat, aliàs
non. 3. Concipiendi capacitas noscitur per odorem suffitus (vel assæ fœtidæ galbano piceæ mixtæ) ad nares et os to=
tum corpus pervadentis. 4. In conceptione os uteri connivet. 5. Mulier
gravida si marem gerit, benè colorata, si fœminam, decolor. 6. In
gravidæ lac copiosè fluens fœtus morbidum significat, at firma esse docet
mammæ status valentiorem. 7. Gestans marem dextra uteri parte, fœminam sini=
strâ magis gestat.

p. urina gravid: p. 52. De lac in mammis ante partum non habent. Hip. 47.

Convulsio. 1. Si fit vel ab hæmorragiâ magnâ, vel ab Ilio, vel
ab helleboro, vel à superfluâ purgatione, vel à vigiliis, vel ab æstu vehementi,
vel in fluxu muliebri, vel in tumoribus subitò evanescentibus, vel in febribus acu=
tis, mala; in ebriis, apoplecticis, vel ab inanitione, et à vulnere, letha=
lis. 2. Spasticis supervenientes febre vel acuta vel intermittente, vel fluxu; mi=
tigatur calidâ et etiam frigidâ affusione. 3. Urinæ fluxus (ut et alvi) eam solvit. 4. In
eâ diu obmutescere malum; parum per obmutescere, paralysin linguæ
aut brachii denuntiat. 5. Convulsiones pariter sæpè ad veniunt mensibus
primò apparentes. 6. In hystericis febre vacuis, faciles. 7. Convulsio
febris initio superveniens, vel ejus prænuncia, metuenda. 8. Convulsio in=
saniæ consectaria, pessima, ab ictu, mortifera. 9. Eam testes et pu=
denda contracta mortiferam denuntiant. 10. Qui septem annis pro=
vectiores sunt, convulsione non tentantur in febre, et si fiant, sunt
lethales. 11. In quovis morbo convulsio vel labii vel linguæ, vel palpe=
brarum mala; nam aut mors aut insipientia portenditur. Vide epilep: spasmus sanatur. Cura fit sanguinem ducendo, urinas ciendo, et hypnoticorum usu.
[illegible] 72. 523.

a. i. e. ruptura vel strangulatio Ilei.

vide Epilepsia. | Urina. | Fetanus. | Hipp. 57. 4.

Ex convulsione aut mortem sæ[illegible] à cerebri, à vi: [illegible] in [illegible], et à sa[illegible] ligamentis [illegible] 5. 512.

Convulsionem à repletione fieri et inanitione; sed ab inanitione vix curari; à vero repletionis convulsiones et similes [illegible] à liccinste

Solanum, &c. 12. Omnes ferè convulsiones infantis fiunt à stomacho, vel ab intestinis; unde usus infusum Rhabarb: sæpè morbus solvit. 13. Urina crassa et turbida bona, tenuis et alba mala. 14. Cinnabaris nativ: Pisc: Succ: et ungula Alcis, sunt cæteris præstantiora. 15. Infantes quibus crustæ scabiosæ in capite sunt, rarò fiunt convulsi. 16. Ex abortu mulieres convulsæ rarò evadunt. 17. Viola est specifica in morbis convulsivis. 18. In infantibus convulsis cave à Sp: Sal: ✳ci; hæc enim in stomacho coagulat. 19. Observatu dignum an eo tempore quo infans convellitur, Matri vel Nutrici menses fluant nec ne. 20. Si ebrius derepentè obmutescat, convulsus moritur, nisi vel febre corripitur, vel ad horam quâ crapula solvitur, vel vomit, et vocem recuperet. 21. Si convulsio in febrem cadens, eodem die quiescat, datur aliqua spes. 22. In ... maxillas luxari funestum. 23. Pulv: de Guttetâ specificus est. 24. Balsam: paracolsi est potentiss: remedium ad quasvis convulsiones vulneribus superv... 25. Convulsio quæ phrenitidem sequitur, letha... nervorum, &c. 25. Convulsio quæ ... curatæ sunt ... lis. 26. Convulsiones abdominis musculorum ... Ol: amygd: dulc: cum Syr: papav: ... in longo brodio dissolutis. 27. Quæ plures partus, et imprimis cerebro viciniores occupat, ... non difficilem reddit et ipsam raptam, periculosior est.

Ott. 11. 519 Signa 1. vel Hæmorragiam, sunt spectra rubra ob oculos versantia, oculorum Rubedo, lachrymæ, rubor faciei, hypochondriorum tensio, dolor capitis, cervicis, temporum gravitas, pruritus naris, pulsus altus et inundans. 2. vel Vomitus sunt nausea morsus circa ventric: orificium, terror, jactatio, vertigo, discoloratio faciei, umbrosa oculis obversantia, labij inferioris tremor, linguæ amaror, saliva multa et tenuis, pulsus durus et inæqualis. 3. vel Sudorem, sunt pulsus undosus, cutis inflata, rubea, et roridus, Urina die 4to tincta, et 7mo incrassata, excrementorum aliorum imminutio. 4. vel Urinam, sunt gravitas vesicæ cum ardore, pruritus pudendi. 5. vel Secessum, sunt imi ventris tumor, gravitas, punctio, rugitus, cruciatus, color lumborum, urina tenuis et alba, pulsus parvus et frequens. 6. vel Menstruas sunt fervor et gravitas lumborum, dolor circa uterum, et tensio. 7. vel Hæmorrhoides, sunt dolor et pruritus in ano. 8. vel Abscessum, sunt perturbatio corporis, vigiliæ, deliria, urinæ crudæ, rigor aliquando, æstus aliquando, sitis, inquietudo. 9. Qualis die quarto inventus urinæ vel sputi vel mentis altera°, talis etiam crisis die 7o. sive bona, sive mala, expectanda: sic, si Urina die 4. rubram ostendit nubeculam, die 7mo bona erit crisis. 10. Ad Crisin progrediens, crassescere debet excrementa. 11. Somni arctiores firmissimam crisin denuntiant; è contra, tumultuosi mortem et instantem crisin ... 12. Lingua ad mediam lineam albâ salivâ et crassâ madida, febris dimissionem eodem die denuntiat; sed si tenuior magis

Bagl. 79.
valet enim contra lumbricos et cavitatem viscidam.
Nott:
Nott: sim. Dec: syrup: &c.
Nott: ... tunc enim mutari debet Nutrix.
Bagl. ib.
208.
Walth.
vide Spirit: aul: ... 510.
... præcordiorum contentio sine doloris sensu. Boer:
...
Die: enim 4to est indicatoris 7mi.

12. 8. cum patiens male cum sudore, statim rigore corripitur, et urinam emittere non potest. | magis sit, postridie. 13. Sudore critico fieri in propinquo tollatur Urinæ suppressio rigorifera;

D.

Vesicantia. | Delirium. 1. Vix accidit ante elapsos 40. annos. 2. Si peripneumonia supervenerit, malum. 3. Si in eo albæ et pellucidæ sunt Urinæ, malum. 4. In eo potio Saphenæ et Salvatellæ prodest, et usus emulsionum. 5. Lingua nigra in acutis fere semper post se trahit delirium. 6. Delirantibus in febre acuta vesicantia plerumque sunt noxia, et magnæ ex parte omnes, qui moriuntur; et contra, Sectione frontis et emulsionum ex sem: frigidis, melon: [illegible] usu sanantur. 7. Delirium superveniens, præsertim morbo ad coctionem tendente, est salutare, et idcirco si non supervenit, promovendus pulv: Cornachini, eodem superbibendo emulsio ex aq: Hordei, et sale prunellæ, cornu: cervi limati, et aliis sedulo dulcificantibus, non neglectis. 8. Malum si phrenitis mutetur in Lethargum, non è contra.

Bagl. 68. | aut deambulationem per cubiculum, et Balneis, cum Lactuca, somnifero et aliis herbis frigidis.

quod fit à translatione Bilis, per Authores. | 9. In acutis, si urinæ quæ coloratæ esse debent, sint tenuiores, cum vigiliis, oculorumque perturbatione, prognosticato brevi futurum delirium. 10. Si in acutis adsint Urinæ sanguineæ cum propensione in somnum, et sine coaguli signis, Lethargum infallibiliter prognosticato; si verò cum talibus Urinis vigiliæ sæviant, et adsint dolor capitis, lingua arida, et viscerum ardor, prognosticato delirium. 11.

Mr. Helmidig | Blandiora acida, sp: nitri dulcis, sal prunellæ, et pulv: Cinnab: cum emulsionibus omne ferunt iuvamentum in phrenitide. 12. In phrenitide, quæ membranarum inflammationem [illegible], boni sunt omnes. 13. In delirantibus floccos carpentibus, festucas avellentibus, stragulas et vestes supra tegentibus, omnia sunt

In febr. Mithrid. ℥j et ℥iß. Sp. [illegible] ℔ sinff. Rom. ℥ij [illegible] extend. super alutam pro plantis pedum. Londini. | officina. 14. Si à somno compescatur non moluendum, aliàs maniæ. 15. Phreniticorum facies saturato rubore est perfusa, et a sudore clare terribilis, oculi sunt exerti et truces. 16. Phreniticis omnis alba dejectio mala. 17. Phrenitici sputatores sanaliter, et tremore

quia Bilis delirium [illegible] corpore [illegible]. | trem

tremuli. 18. Diria cum risu, et somno laetiora, cum studio adhibito, et cum multa potatione, et cum sang: profluvio, et ex ileo, et ictu capitis, et ex vigiliis, periculosiora. 19. Phrenitici parum aut raro bibentes, idque cum strepitu contremiscunt, aut etiam convelluntur. 20. ... loco ... applicentur ... exhibeantur copiose emuls: cum aq: ... violarum ... temperata. 21. ... 22. Omnia mala, sed non aeque periculosa. et post ... significant.

Ulcus: 1. in senibus periculosa. 2. Si accidat post moderatum laborem, aut exercitium nimium venereum, aut post febres chronicas malum.

Diarhaea. 1. Spontanea cum debiliori excretione et sine molestia, aliquandiu relinquatur, quia fortasse tendit ad salutem aegri. 2. Symptomatica est plurimum mala. 3. Excrementa liquida crassiora evadentia bona. 4. Excrementa liquida sine dolore ejecta ... 5. Diarhaea Leucophlegmaticis superveniens, aegro non multum debilitato, salutaris. 6. Excrementa vitellos ovorum referentia, viridia, et nigra, et livida, et varios colores induentia, et citra modum fetida, summe mala. 7. Diarhaea variolarum confluentium comes, est salutaris, in distinctis noxia. 8. Diarhaea orta ex animi pathematis est fere incurabilis, si causa perstiterit, sic enim supervenire solet hectica et atrophia. 9. Sudor superveniens salutaris. 10. Perniciosa in morbis pectoris, et febre maligna correptis. 11. Cura non incipiatur per astringentia, ne viscerum obstructiones introducas. 12. Cave a carnium esu: augent enim morbum. 13. Nil magis alvum stipticam reddit quam ubique venderit. 14. Masticatio frequens ... optima. 15. Diarhaea cum bilosa ... 16. Si Diarhaea croceâ, ferrugineâ et laterilia, est plerumque lethalis. 17. ... supervenerit bona, alias enim supervenit febris. 17. ... multis morbis chronicis, ut Phthisi, et vita Diarhaeâ finitur. 18. Spontanea ... salubris. 19. Aquosa in hydrope morbum solvit. 20. Diarhaea diuturna salvos facit. 21. Diarhaea diuturna sine ... 22. Blandiuscula ventris, hydropis pronunciat. vide Alvi fluxum. 23. ... sal ... et ... fluxum sistit.

Vide Bagl. p. 82.

v. enim intestinorum gangraenam, et ... interit.

Bagl. 71.

Diarhaea solvit sudorem, et ...

Nott: ad ʒ ß in die, ut etiam in ... profluvio ...

Bagl: 66. 72.

Febr. 1. Qui neque medelis neque ... curantur, ad suppurationem ... diligentius in aliquo loco sino crudo, inveniendo. 3. Bezoardicum ... in Jovi ... pyramidalem ...

vide Bagl. 77. Lumbr. 180. 166.

Pitcairn. Nott: sal Jovis.

Joviale, in omnibus est optimum remedium, nisi in podagrâ, lue venereâ, et nervorum et capitis morbis, ut apoplex: paralysi, etc: stannum enim poros et cordia nimium: sed in hystericis est infallibile. 4. In doloribus omnibus externis, caustica ex foliis Ranunculi, et inflammata, vel ex mixtura calcis vivae et saponis, sunt optima, ut et sp: ✱ci cum ol: amygdal: 5. Quamvis dolor mammarum, aut coxarum, aut genuum, foeminas fatigaverit, tamen si mammae sint durae, spes est non abortiendi. 6. pil: Matth: vulgo dictae Starkij, summopere [illegible] doloribusque in tomendis quibuscunque doloribus partium internarum et externarum. 7. Dolores provenientes à [illegible] ambulatione nudis pedibus super frigidum pavimentum facta, appositis calidis plantis pedum statim sanantur. 8. Dolores qui sine signis levantur, [illegible] 9. Dolores periodici in quacunque corporis parte, leni purgante vicibus ante invasionem horis [illegible] apposita [illegible] sanantur. 10. Dolores [illegible] in [illegible] Pil: opiata; et ung: opodeldoch cum opio [illegible] solummodo in progressu.

Vulneratis plumaceolum ex lino seu cottone, oblinatum ungu: calc: alb:

Bagl. Nov: et [illegible] in [illegible] sp: volatilia ut sp: ✱. ol: amygd: dulc: Arthrit: in obs. spis: Bagl: 72.

plumaceolum [illegible] sp: C. C. cum Ung: nerv: ✱ et ap: [illegible] eodem modo.

Dysenteria. 1. In ea vomitus biliosus in principio, malum. 2. Omnes fere ex sphacelo intestinorum pereunt, quod biduo ante mortem patet, extremorum frigore, pulsu exili, inaequali, sine siti et dolore, et nonnullis, paucis ante mortem horis, fit delirium. 3. Si singultus accedat, lethalis, ut et si angina, linguae inflammatio, et difficultas deglutiendi. 4. Si statim post dolorem excretio non fiat, intestina tenuia sunt laesa. 5. Differt ab haemorrhoidibus; quod in his semper sang: praecedat faeces, ubi et post, vel una cum faecibus, alias ac in Dysenteria. 6. Si post opiata, altero mane color oculorum aegri est mutatus, morbus non superabitur, et è contra. 7. Rad: Hypopecoanae est [illegible] et post ejusdem pulv: [illegible] 8. Si [illegible] qui prius non decrant, per inferiora exire incipiant, brevi sanitatem expecta. 9. Si tenesmo cum hiatu ani comitetur, ut clysteres retinere nequeant, et è contra si [illegible] anus nimium astringatur, [illegible] mortis signum. 10. In ea si frustulata carnis, ob ulcus intestina corrodens, ejiciantur, lethale. 11. Meri sanguinis ejectio mala. 12. Gravidis ante partum utplurimum salutaris, nisi maligna sit, et longè ante partum. 13. Diuturnior desinit in [illegible] [illegible]. 14. Si incipiat cum atrâ bile, lethalis. 15. Quae intempestivè sistitur abscessus facit et in visceribus et in articulis. 16. Lienosis Dysenteria superveniens, bona, nisi ob aetatem nimiam, hydropis sit timor, et ob nimiam Dysenteriae moram. 17. Dysenteria sine febre, si aliis remediis non cedat, deveniendum ad usum aq: [illegible] s. a. datae, et infallibiliter sanabitur, ut bis terque mirati sumus. 18. Si ab usu adstringentium inflatio ventris et major in egerendo difficultas et labor superveniat, Rhabarbaro frequentius utendum, interpositâ tamen mixturâ aliqua anodyna ex sp: [illegible] aq. viol. [illegible] Nitrol: crystal: mont. etc. 19. Serum lactis [illegible] [illegible] Dysenter: sanat, ut et per clysteres injectum, et [illegible] multis. 20. In Dysent. remedia sint pauca et simplicia. 21. Rhabarbarum tostum, [illegible] et Nux mosch: [illegible] laudantur in Dysent. [illegible] 24. procedente Dysenteria, crepitus fiat materiae, quae antea non erat, sanitatis principium est.

Waldschm.

Nott. vel vomend: in dosi tanta ac exhibetur in Dib: Interimitt: praecedit, si vis, Rhabarb:

Hipp.

Bagl. ibid.

p. 242.

Waldschm.

Ebrius. 1. Si sponte obmutescat, convulsus, moritur, nisi febris excipiat. 2. Syr: uvar. immaturi ... 3. Epithema ex fol. ... applicatum ebriis ... Bibl. 405.

Empyema. 1. Sanguinem aut pus facile excerni melius. 2. Si febres periculosae interdum superveniunt, necnon Gangraena partis internae. 3. ut plurimum Phthisim causat. 4. Si potissimum supersunt quos febris post eruptionem puris dimiserit. 5. Quibus ob copiam puris totus thorax attollitur, celerrime suffocantur. 6. Pus utramque thoracis partem occupans, periculosius; item quod sinistram potius quam dextram. 7. In sectione lateris si pus fluxerit album, bonum; si subcruentum, faeculentum et foetidum, malum. 8. Si pus per alvum per urinam copiose excernitur, viribus aegri consistentibus, salus expectanda. 9. Quibus specula et exploratoriis sequentes pure, volunt ab igne coloratum, mortem prognosticato. 10. Empyici ... melius se habeant, tamen si sputum sit foetidum, et recidivam incurrunt. 11. Supervenit saepe Pleuritidi. 12. Latere uno calido, si et in opposito decumbit aeger, grave quidpiam sentiat, Empyema significat. 13. Empyicis quibus concussis humeris multus fit strepitus, parcior est pus; at quibus exiguus et nullus strepitus, multo major; et Dyspnoea et unguibus lividis, sunt desperati. 14. In eo pectora rubris maculis sparsa, mortifera. 15. Si ex sectione lateris pus universim effluxerit, lethale. 16. Sudilas ei superveniens, dejectiones nigras denuntiat.

1. Dicitur Empyema sit a sang: extravasato per ictus gladii, et nomine aliud Phthisis praecedit Empyema.
7. v. p. sectionem lateris
x. quod fit per circulationem sang: et secretionem per renes, et absorptionem, translatione sua forma vapores per poros diaphrag. ... poros ... venas inter ... vesica ... et ... condensatum
aut fit in dolio repleto et vacuo
Nidis parco ... extrahendum est

Epilepsia. 1. ante annum ... talem mutationem recipit; post 25 annos plerumque ad mortem durat, nisi fit a menstruis suppressis. 2. Epileptici ... Hydropi supervenientes salutares. 3. sunt ut plurimum melancholici. 4. Hydropi superveniens, funesta. 5. Apoplexia superveniens, sperabilis. 6. In infantibus et juvenibus, et a vermibus, et a dentitione, et ab excrementis viridibus corrosivis, et a ... sperabilis. 7. In gravida ante partum raro ... 8. Si Epileptici sternutamento non afficiuntur in paroxysmo, malum. 9. Juvenes mutatione aetatis, regionis, victus, saepe liberantur. per ... Convulsio. 10. Si infans ex ... fiat epilepticus, erit et ex ... convulsione et ex variolis, et si variolae post insultus venient, erunt ... signum morbi ... et raro confluunt. 11. Si ei supervenerit ... post eam. pessima est, et excrementis ...

v. Convulsio.

Bagl.
113. p.

Faciês, vide post Febris.

Febris. 1. In principio aulaes cave à purg: et nimis volat. 2. Ante ymi diem purgantia vel diaphoretica vehementia non danda. 3. In valoribus urgentibus si nisi sit &c. in principio. alid si adsint signa malignitatis aut coagulationis, omittatur. 4. In conatu vomendi in initio semper vomendus, ne diarrhoea gravissima superveniat, uti solet. 5. In initio si Urina sit rubicunda, et excrementorum copiâ satura, et dein mutatur in pallidam et tenuem, pessimum, præsertim si pulsus evadat celerior, debilis, et ferè vacillans, et si sit loquacitas, somnia horrenda, et sim. ut Delirium, vigilia, Comata. 6. In initio si pulsus robustus, quamvis delirias convulsiones, &c appareant, bene sperandum; è contra, si pulsus debilis sit et vacillans, quamvis reliqua Symptomata sint bona, timendum. 7. In febris acutâ frigg. sudores frigg: lethales; in milioris morbi longitudinem significant. 8. In acutis suspiria mala. 9. Lac in iis malum. 10. Sudor morbum non finiens malus; prorogatur enim inde morbus. 11. Febri ardenti rigor superveniens morbum solvit. 12. in acutis Urinæ subjugales cephalalgiam pronunciant; et si sint cum pulsu debili, inclina ad somnum, gravitate cap: soporosi aliquem affectum prognosticant; è contrà, si vigiliæ, sitis, linguæ ariditas, ardores viscerum, &c cum tali Urina vigeant, et delirium, et convulsiones, et similia prædicito; sed si Urinæ illæ in Chronicis sunt, ut rheumatismo, arthritide, &c bonum est. 13. Febrium principio Febri superveniens, semper malus. 14. Cave à Sacharatis. 15. In acutis lingua sordida et manus tremulæ, semper malum. 16. In omnibus malignis ante eruptionem humoris noxii expellendi, semper adest dyspnœa laboriosa, ingentes præcordiorum anxietates; facta expulsione paulatim decrescunt, ideo in petechialibus, variolis, &c. Petechiis expulsis, nihil in primis viis movendum, et quo tardius erumpunt, et ferè circa morbi statum, eo meliores. 17. Ex Petechiis sanguinis fluxus semper malus, ut et sang: missio in malignis, si non sit ex pedibus. 18. Quo magis febris ad statum vergit, eo minus utendum refrigerantibus; in initio verò liberalius diluentia et humectantia in usu sunt. 19. Si in feb: tumor magnus perinæum occupet, ischuriam aut alvi suppressionem producens, lethale. 20. Semper inspice faciem, nam si multum recessit à naturali semper malum. 21. Sputatores in omnibus feb: sanatici, etiamne tremuli. 22. Ex urina prius clara devenient turbidæ cum nubeculâ et sedimento, quo copiosior eo melior; sed quamdiu cruda sunt, tamdiu morbus est suspectus. 23. Urina quanto rubicundior in initio eo melior. 24. In initio alvi fluxus debilitans, periculosus. 25. Dolores circa dentes fortes febris significant. 26. Facies turgida longitudinem morbi pronunciat.

27.

Bagl. p. 56. 80l. 112 et seq: vel impelg. sang: ad caput, pulmones, aut alia membra, imminet, si phrenitis adsit, rubentes cal[...] de temperies, &c. Bagl. 117. Verant etiam Biliosi ab Auctoribus appellant.

Coma vigil hic intelligitur de quo in Regio.

Crisis, Urina, Delirium. Al. 8, frigg. cum [...] dis intus et exterius, et cum pullis aq: calida repletis, &c.

118.

119.

Amortuilo, lis, Scarificatio, &c.

122.

127.

142. Bagl.

27. Pulsus parvus et debilis et similis sano, cum alijs pravis signis, malignitatem portendit. 28. Surditas in initio mala; in statu, salutem portendit, praecipuè in malignis. 29. Tensiones, scintillationes, pruritus in manu et carpo, imminentem convulsionem significant. 30. Atrae bilis in initio evacuatio, lethalis. 31. Si post sanatam aliquam febrem supervenit dolor lateris, et dorsi, et alterius pectoris partis, difficilis ac non nisi recta cervice respiratio, tuberculum ad inflammationem et suppurationem significat. 32. In feb: dulcia mox in pulmonibus [illegible] caveo igitur quantum potes à saccharatis in eorum curatione; nam ipsa exacerbantur; praesertim si hypochondriacis, hystericis, et pueris praescribantur. 33. [illegible] feb: suspiria supervenientia cholera statim prodit ac [illegible] non ita appa[illegible] [illegible] sudoribus, aut urina; caute ergo danda Diaphor: et Diuret: 34. In ardentibus [illegible] vehementes [illegible] circa ventric: et cordis morsus [illegible] 35. [illegible] 36. Si post feb. inappetentia maneat, recidiva metus est.

Febris Maligna. 1. Quae ante signa coctionis aliqua erumpunt maculae, plerumque recurrunt, et malae. 2. Fractis viribus superveniens delirium, pessimum. 3. Ex dolore viscerum hypochondriacorum nata, sunt terrifica, praecipuè si sopor accesserit. 4. Qui absque ratione languent, inopinatò moriuntur. 5. Est Malignae proprium, rigore in initio febris; vertigo etiam in initio cum tonni et crudâ urinâ, et venis capitis micantibus, severitatem aliquam praenunciant. 6. In malignis [illegible] [illegible] supervenions, [illegible] mortem praenunciat. Bon: cons. 2. obs. 52. 7. [illegible] axsella circa [illegible] 8. [illegible] praecordia, convulsio partium; mortem certò futuram indicant. 8. Appar[illegible] [illegible] ortibus petechijs nil amplius in primis vijs movendum; siquidem ipsa etiam [illegible] mala eo tempore maximè suspecta sunt. 9. Petechiae quo tardius, et sero circa morbi statum erumpunt, eo meliores; ad crisim enim et coctionem jam vergit morbus; et tunc cum apparent bezoarticis et diaphoret: promovendae; vitandus interea alvi fluxus: Contrà si appareant in principio morbi, mala sunt; insignem namque sang: fusionem et dissolutionem ostendunt. [illegible] 11. Cum petechijs [illegible] 10. In ea praecipuè considerandi oculi, lingua, et manus. 11. [illegible] qui salutarem viderunt haemorrhagiam. 12. [illegible] in brachia, toto morbi impetu [illegible] in caput, unde delicia soporosa. [illegible] contra [illegible] in pede aeger melius [illegible]

Febris cum Rigore. 1. In acutis Rigores sexto die invadentes sunt mali. 2. Si à Rigore cum cephalalgiâ vires prosternuntur, funestus. 3. Post Rigorem si nil criticè exsudarit, indeque febris exacerbarit, malum, et praesertim si diebus criticis id fiat. 4. Febri ex tumoris rigorum, cum citâ caloris vicissitudine, permolesti.

Febris acuta. 1. Si in ijs cum extenuatione aegri, atra bilis, [illegible] sang: rigor subierit, postridie moriuntur. 2. Qui in feb: multum sanguinis evacuant, cum reficiuntur, alvum liberam habent. 3. Qui per

Bagl. 52. Dodonaeus.

119. [illegible] continua [illegible]

120. [illegible] interna [illegible]

128. [illegible]

[illegible]

V. febris supra.

Bagl. 114.

119

V. febris ad 11.

V. Rigores.

[illegible] obs. 7. 21.

V. febris supra.

per febres lassitudinem sentiant, iis ad articulos et juxta maxillas potissimum abscessus fiunt. 4. Si suffocatio supervenit nullo in faucibus apparente tumore, lethale. 5. Sudores diebus inaequalibus boni, iis enim morbus judicatur; et e contra, morbi longitudinem et recursus significant. 6. Quibus tubercula post febr: diuturnos fiunt, ii cibariis plurimis utuntur. 7. Si Rigor frequenter aegrum jam debilem invadit, lethale. 8. Si labrum, supercilium, oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, aut audiat, imbecillo jam corpore, pessimum. 9. Lachrymae involuntariae malae. 10. Quibus sicca tussis, non admodum siticulosi sunt. 11. Febres senibus raro acutae. 12. Libera a sine rat. [illegible] 13. Corpus nimium sibi constans, ne contingens, non multum fidenda. 13. Corpus nimium sibi constans, ne contingens, non multum fidenda. Aut etiam plus aequo colliquefieri, malum; illud enim morbi longit: hoc imbecillitatem significat. 14. Si in acutis velis purgare, fiat eodem die in quo materia turget, differre enim in talibus malum. 15. Si post convalescentiam pars aliqua laborat, eo abscessus fiunt. 16. Si partes externae algent et internae uruntur, lethale. 17. Est lethale. Si partes externae algent et internae uruntur, lethale. 17. Est lethale. Sit dexter frigidus convulsiones mortiferum esse; ut et ungues nigri, ac digiti manuum et pedum frigidi et contracti; ut et labia livida contracta; ut et aures frigidae. 18. Vertigine tenebrico sa laborans, lucem aversans, et somno et ardore multo dolens, desperatus est. 19. Iteratio die 7mo post ea superveniens, bona, ut et qui ventre inflatur. 19. Iteratio die 7mo post ea superveniens, bona, ut et qui ventre inflatur. 20. Vehemens aestus circa ventriculi dextrum hypochondrium durum sit. 20. Vehemens aestus circa ventriculum, et stomachi morsus, malum. 21. Qui post rigorem et sudorem denuo incandescunt, malo sunt loco. . Qui sudatiunculae et rigoris crebra viciss[it]udine fundunt; ulcerationem enim internam monstrant. 22. Qui continenter sudant et modice, diu aegrotant, sed non moriuntur; sed si copiose sudent vires resolvuntur. 23. Qui immemoriae et sine voluntate fundunt urinae, pestiferae. 24. Grandi impotentia somnus malo est loco. 25. Ardor ventris ingens ex cardialgia, malus. 26. In alvo inflatus, si flatus exitum liberum non habeat, malum. 27. Sitis immerito sedata, mala est. 28. Proterva moderati hominis responsa mala. 29. Ex strepitu et murmure bibentes, et difficulter deglutientes, timendi. 30. Manus et pedes rubores magni, mali sunt. 31. Qui dormiendo efflat, et aeris multum jactitat, malo est loco. 32. Qui ex silentio e potestate mentis exeunt, nec voce sunt capti, pessimum habent malum. 33. Lividitas magis quam nigredo, mortifera est. 34. In morbo tractis, ex visio aut auditus perierit. Coria, corpora, et nares pervertuntur, mors instat. 35. Si voce capti, arcus mittantes, insomnia ex naribus profluvio, vocem non recuperent, et aurem in [illegible] difficultate spirandi, cui mors venit. 36. [illegible] et somno convulsitica deveniant. 37. Quibus ex rubore [illegible]

Marginal notes:

- fiunt enim a convulsione musc. oculi.
- ψ Crisis. aures a frigidus, Delirium, Urina.
- aut si sint borborygmi, tormina et dolores ventris circa 7mum diem. et Crisis non appareat.
- vicissitudo.
- [illegible] ... ante mortem et ... foemina ... semen effundit.
- [illegible] ... quae ... post ... non continuant et ... debilitant.
- venientes
- [illegible] recuperent.

Faciei hypochondriis non est molle; iis fluere sang: è naribus fit soler. 38. omnes ferè ab oculis evadunt, in quorum sang: extracto crusta alba aut chylosa supercrescit: è contrà, quorum sanguis rutilans, et superficiè nimis rubicunda, moriuntur. 39. si lingua frigida sit, brevi erit mors. 40. pulsus intermittens in una pulsatione, praesentaneam mortem denuntiat. 41. frigidus ex ore et naribus spiritus, lethalis. 42. Dolores circa lumbos et partes inferiores, ad pectus transeuntes, sunt pestiferi, et in suppurationem desinunt. 43. Acuta in pueris, in vigiliis, alvo stipata, caloribus, ne... et colore mutato, convulsionem quid habet. 44. Febr: continuae tertio quoque die ingravescentes supra modum sunt periculosa. 45. In Diuturnis, dolores in articulis, aut apostemata, non sunt inutiles. 46. Micantes in collo venae in ... in adolescentibus haemorrhagiam, in senioribus dysenteriam venturam, denotant. 47. facies cadaverosa, oculi concavi, mortifera, nisi à causis ... orta sint. 48. sputa livida, nigra, biliosa, mala. 49. In ... risus, et ... frigore, et ... semper mala. 49. lingua nigra ... post ... lethalis ... 50. Febr: acuta ... curantur: ... enim supervenit sudor ex ... Patientis.

Febres Intermittentes. 1. In pueris modesta per os respuentibus, clysteres cum melle, carpo alligandi, ... et cort: peruv: prosunt. 2. Cort: peruv: in initio non dandus, ne crudis adhuc humoribus, morbus recurrat, et in pejus ruat. 3. tertiana vera saepè septem circuitibus finitur. sed si mitis et lenta sit, eò longior et periculosior et ferè ad 14 paroxysmos se extendit. 4. In copioso post paroxysmum sudore. si urina sit sine sedimento, morbus est facilis; sed si urina illa sit sine sudore, diuturnior erit febris. 5. Iis supervenientes ... mali. 6. Quartana quo inconstantior, eo melior. 7. Quartanae ... anni aequinoctiis solvuntur. 8. In quartana appetitus dejectus malus. 9. In Quartana urina nigra, bona, aliter ac in omnibus aliis morbis. 10. Intermittentes supervenient ... solvit. 11. In Quart: raro fiunt convulsiones, et si ... supervenient Quart: liberantur. 12. In Quart: sanguinis ... è naribus fluxus, malus. 13. A Risore incidens ... et obstructio ... partes inferiores, et morbus ... maximè ... 14. Si accedit inflammatio his vis. ... pulmonis, ut ... peripneumonia. 14. Si ... 15. febres intermit: nullis nec ... peruv: non est admittendus. 15. febres ... febrifugis cedentes remediis, ... in salivatione, frequenter ... 16. Si secundus paroxysmus sit vehementior primo, et tertius ... circa quartum parox: ... si vero maximè mitis, ... febrem circa quartum parox: ... ruo 4us parox: vehemens fuerit, 5us verò magna ex parte remissior, in 7mo parox: integra febris solutio expectanda. 17. Omnes qui feb: intermittente extinguuntur, circa initia parox: moriuntur; raro in augmento, ... 18. Urina est ... rubra, et colorem lateritius ... et ... urina signum ferè pathognomonicum, et maximè familiare talibus febribus. ✠ post

Bagl. 140. Doll.

Bagl. 127. Galen.

Biliosos vel Pituitosos.

Bagl. 20.

Bagl. 126

105. Rolic.

...

11 5. Rolic

Bagl.

115.

✠ Urina

177.

Faeces. 1. Crassiores debent ad crisim. 2. Spumantes in acutis malae; malae etiam sunt cruentae, spullaceae, et admodum biliosae. 3. Pilulis caprarum similes, malae; item glutinosae, albae, multum fermentatae, purulentae, lividae, nigrae, variegatae, friabiles, rubrae, virides, et nimis liquidae, oleaginosae, sine sensu emissae. 4. Aquosa dejectione in febr. et

Walk. morbis infantum mala. 5. Omnis copiosa dejectio in morbis pectoris mala. 6. Dejectiones cruentae in variolis aliisque acutis periculosissimae.

Ferrum. 1. Quaecunque medela non sanant, ferrum sanat, et quod ferrum non sanat, ignis sanat, et quod non ita, incurabile.

Fistula. 1. In partibus cartilagineis, carne vacuis, saniosae, et in quarum orificio caruncula adnascitur, sunt malae.

Flatus. 1. Flatus absque sono excretio optima; cum sono tamen transire meliusque eum sursum revocari. 2. Flatus faetidissimi sunt tormina saeva.

Foetus. 1. Ex excitat sternutatio, etiam copiarum comestio, si piger est in exeundo. 2. Prodigiosi et gravitas uteri mulieris, factor oris cadaverosus, conversio ejus tam inde ad altera, fieri mortuum significant; sed prae caloris imminutione etiam si negat, demisimus supervenientis pobl. Das. ad l. 3. sect. 4. c. 6. item si faeces exeunt, si laborat syncope, convulsionibus, colore livido, si diu elapsis aquis nondum prodiit, si cutis ejus flaccida et facile separanda, si ossa mollia et mobilia.

Aurel: 202.
Bagl: 119. Holl:
Boerh.

Fluor albus. 1. Sterilitatem, uteri prolapsum, cachexiam, hydropem vaginae exulcerationem, inducere solet. 2. In juvenculis cura facilior, in vetulis vix curabilis. 3. Inde menstruantes evanescit, et menstruis finitis regreditur; sed si inde menstruandi perseverat, signum certum gonorrhoeae gallicae.

Bagl. 202.

Fluxus hepaticus. 1. Cursus ad cachexiam et hydropem disponit. 2. In juvenibus nonnunquam, in senibus fere nunquam curatur. 3. Ex febribus fere semper lethalis.

Fractura. 1. Quo amplior eo minus periculosa, quam exiles et angustae. 2. Illis calidum amicum: dolorque prunas admovent | praesertim in capite

Frigus. 1. Frigida cuti et artubus funesta. 2. Ex Rigore non incalescens, malum. 3. Extremorum potius quam totius corporis. 4. Cum livore conjunctum, lethale. 5. Signum in doloribus mortiferis inflammationis. 6. Frigus maximum ex haemorragia critica, lethale. 7. Si purgationi redundanti cum sudore fiat, malum. 8. Ex frigore urinae suppressio, postilentia. 9. Frigidum nervis inimicum, ut et ossibus. 10. Frigida [volunt enim placentae] pectori inimica, tussim movent, Hip: et sang: fluxiones et distillationes movent.

Furor Uterinus. 1. Si diutius perseverat, in veram maniam degenerat. | vel melanch: 2. Balneum aq: frigidae opt.

Gangraena et Sphacelus. 1. Quae oriuntur à causa interna incurabiles sunt. 2. Partes nervosae et facile corripiuntur et difficile curantur; sanguineae vero difficilius corripiuntur, et difficilius curantur. | facilius 3. Cerebri intra tres dies interimit, alias speranda salus. 4. Mel rosarum ei optime resistit. [illegible] aq. vitae. 5. [illegible] candenti ferro facta | Bart. Hist. 1. 32. in incipiente gangraena [illegible] incipientibus sed sordidis ulceribus gravissima damna inferunt.

Dysenteriâ, et fluxu hepat. laborantibus

Gingivæ. 1. Cruentæ Scorbuticis familiares. 2. Erosæ in pueris lumbricorum indicia. 3. Ulcerosæ ^Lienosis familiares. 4. Cruentæ ex alvo liquido pestiferæ.

v. fluor albus.

Bagl. 242
Heurn. 143

Gonorrhœa. 1. Diu continuans, febris hecticæ similis supervenit, quam tabes letthalis sequitur. 2. In Gallica [illegible] radix [illegible] infallibilis. 3. ℞ Lig. Guaj. in scobem tenuem redacti ℥j. Cort. ejus ulw. ʒß, [illegible] ʒj. Syr. de fonicho q. s. f. pil. XXX. Sumat iij. pastam ineuntes. Longo usu recidivam luis venereæ impediunt, etc.

v. Mulier, Conceptio, Puerpera, Partus, Uterus.

1. Rhabar: tosto, et des: in [illegible] cor: ment: et ros: rub: ex cinnam: et sachar:

Gravida. 1. Prægnantes purgabis, ^si materia turgeat, quadrimestres, et usque ad septimum mensem, sed nec ante, nec post, nisi admodum caute. 2. præcipui harum morbi à suscepto frigore, et animi passionibus, et à victu oriuntur. 3. In iis ora aphthosa mala. 4. In iis fluxus aquæ ante partum malus. 5. Quæ ex suspirio fit respiratio, et una immodicè est colliqualio, in gravidis, abortum denuntiat. 6. In iis sopor et gravitas, cephalalgiæ incidens, est pessima. 7. Gravidam acuto morbo tentari, est pessimum. 8. Stillis in fauces fluxio acris est pestifera, et ad minimum denotat multa incommoda à partu ex albis mordacibus. 9. In iis ora aphthosa liquidas reddunt alvos. 10. In iis prius ægrotantibus, ante partum supervenit rigor. 11. Ipsas crebro rigere est pestiferum. 12. Ipsas male habet hypochondrii dolor. 13. Quibus puellis Orthopnoica sunt in promptu, iis de utero gerunt, mammæ suppurant. 14. In corpulentis si abortus sine occasione manifesta accidat, fit ob acetabula uteri mucoris plena.

v. Orthopnœa. Nott:

Habitus Corporis. 1. Athleticus periculosus, in melius enim tendere non potest. 2. Crassi et pingues brevioris vitæ, Graciles longioris. 3. Carnosi – Nott: per inferiora, graciles per superiora purgandi. 4. Magnitudo in Juvenibus elegans, in Senibus inutilis, et deterior parvitate.

Hæmorrhagia. 1. Quibus in febris principio è naribus stillat Sanguis, siquidem Urina quarto die hypostasin habeat albam, febrem per hæmorragiam septimo dissolvi ostendit. 2. Echo aurium, visus hebetudo, Narium gravitas, hæmorragiam indicant, et si non accidat, fit delirium. 3. Frigiditas eximia in hæmorragia quævis critica pessima. 4. Ab hæmorr: Nigrorum dejectio, pessima.[^] 5. Hæmorr: consueta vi suppressa, per statis temporibus non recurrens, nonnunquam adducit convulsiones, quæ phlebotomia curandæ. 6. Ex Venis in febrium initio quidsunt. 7. Radix Hipecacuanhæ Specificum, ac fere infallibile remedium in hæmorrhag: Sanguineis, dysenteriis, colliquationibus hæmorr, etc. 8. In acutis, quæ larga quidem, non tamen nimia, et cum symptomatum mitigatione fit, et morbi indoli respondet, bona.

[^] quia non à tono vigente, sed dissolutione seu vaporatione provenit. Bagl. 74. Walth.

Hæmorrhoides. 1. Criticæ aut Spontaneæ sunt salutares, præsertim in melancholia. 2. Et fiunt loco mensium, salutares. 3. Si nimiæ, Tabem aut Hydropem post se trahunt, et Veneri inimicæ sunt. 4. Si inflammatæ sint, non semper resecandæ, ne in ulcus degenerent. 5. Moribundis parum aut nihil prosunt. 6. Ne curentur si per Hydropem, per tabem, vel simile quid timeatur. 7. Hæmorrhoides internæ dolores mentiri solent dolores calculi in vesica latentis: hi tamen multò sunt atrociores et frequentiores quam illi. 8. Qui hæmorrhoidibus laborant ii neque ulceribus, neque peripneumonia neque ulcere excedente, neque furunculis, neque tuberculis à ciceris similitudine, ... 9. Apertio venarum ... dictis, ac forte, nec lepra, aut vitiliginibus capiuntur. 9. Apertio venarum hæmorrh: prae aliarum apertione magnam utilitatem afferre solent iis, qui hypochondriacis morbis, doloribus et calculis, renundem, gravitate lumborum, flatibus, tensionibus, borygmis, aliisque hujusmodi laborant. 10. Cavendæ purg: in eorum fluxu. 11. Sanguinis etiam similium non excedens in quocunque morbo beneficus fluxus est.

Bagl. 83. 124. Hipp:

Walth.

Hæmoptoe. 1. Ex vasis pulmonum pejor quam ex iis pectoris. 2. Quibus pleno ore, longum vomitus Sanguis Spumosus erumpit cum febre, et dolore circa pectus et dorsum, pessimum.

Hernia. 1. Superveniens singultus, periculosus. 2. Supervenientes febre pauci evadunt.

Fit enim ab excrementis suppressis.

mvara. Bag. p. 87. Hydrocele. 1. ea discussa, symptomate sanata, supervenit Hydrops pectoris.

... ob vitalis diversitatem. Hydrops. 1. Anasarca minus periculosa. 2. facilius in rusticis quam nobilibus curatur. 3. Morbo acuto superveniens, malus; non enim morbus sedat. 4. a durities lienis minus periculosus quam à duritie hepatis. 5. Eo incipiente superveniens alvi profluvium morbum saepe solvit. 6. Urinae paucitas mala, ideoque si augeatur, sperandum. 7. Urina pauca turbata, cum febre, lethalis. 8. Abscessus et maculae in Hydropicorum cruribus erumpentes, lethales. 9. Ejus recidiva desperata est. 10. Dejectio nigra, quae non fit à Medicis, lethalis. 11. In eo sputis mala. 12. Si color faciei bonus derepente mutetur in lividum et plumbeum, intra mensem de symptomate brevi mortem prognosticat. 13. In Anasarca sine febre, unice praestant stupha sicca, sive sudatoria in lecto. 14. Subitanea dyspnaea et suffocatio, cum pedum intumescentia, suspicionem dat Hydropis pectoris. 15. Hydrops medicinae concedens, si redeat, desperatus est. 16. In eo superveniens Epilepsia, funesta. 17. In eo ulcera supervenientia non facile curantur. 18. Morbis valde chronicis superveniens, lethalis.

Margin: ... quia paucines symptomatica in Liene.
Margin: ... ab frigore ... pulmo ... Bagl: 117. 138.
Margin: ... Baxin. p. 70. ad finem) 202.

Hypercatharsis, et Superpurgatio.

Hypochondriaci. 1. Iis, sine inflammatione, laboranti, febris superveniens, fit solutio. 2. Haemorrhoidum fluxu non parum leniuntur. 3. Mensium suppressione aggravantur. 4. Alvum ut plurimum duram habent. 5. Stomachi ardori obnoxii. 6. Quibus hypochondria inflata murmurant, iis superveniente lumborum dolore, alvi humectantur, nisi flatus inferne erumpant, et urina copiosa prodeat. 7. Illis lac malum. 8. Dolor inflammatorius haemorragia solvitur. 9. Hypochondrii dextri dolor soli ac solvi vim magnam infert. 10. Eorum tumores in febrium initio sunt mali, sed si vigesimum diem superent, manente febre, fit suppuratio. 11. Eorum tumores inflammatione expertes, solvit borborygmus, praecipue si exitus invenerit. 12. Pulsus in hypochondriis cum perturbatione, dementia est, et eo magis si oculi crebro moveantur. 13. Eorum tumores cum alvo suppressa, mali; sed si tumores sunt in veteribus, alvi fluxus erit etiam malus. 14. Eorum dolores, qui in febre sine sudore aut haemorragia solvuntur, sunt mali, nisi dolor ad Ischia transeat. 15. In omni hypochondriorum, et partium sub et circa Umbilicum, dolore, sanguinis dejectio, bona, suppressio mala. 16. Febres ex eorum doloribus ortae, sunt terrificae. 17. In eorum doloribus sanguinem ex opposito latere fluere, malum judicatur. 18. Eorum dolores remanentes, extincta febris ardore, quid mali denunciant. 19. In hypochondriacis ubi ... vel suffocans, ventris tensio, et flatus hinc inde obmurmurantes, fiat V.S. et statim cessabunt haec symptomata, et repetatur V.S. ... recurrant.

Margin: et Melanch:
Margin: Borborygmus
Margin: Bagl. 226.

Icterus. 1. Flavus nigro curatu facilior. 2. Criticus in febre, et qui fit ante 7um: malus febri, facilius curantur; è contra, ex schyrrho hepatis aut lienis saepè incurabilis. 3. Icterici non sunt flatulenti. 4. Febris superveniens [illegible] 5. Icterici facilè per menstrui quid alunt, et rarò illa sunt sine malignitate. 5. Icterici facilè fiunt calculosi, et è contra. 6. In flavo sp: ✱ci audeg specificus.

Bagl. 119. 228. 243.

Iliaca Passio. 1. Ex inflammatione et Gangraena lethalis. 2. Omnis est periculosa, sed ea magis cui vomitus supervenit, primò materiae biliosae, post: quam verò faeculentae. 3. Quibus ex stranguria supervenit, intra 7 dies moriuntur, nisi superveniente febre, urina fluxerit. 4. In eâ singultus, convulsio, delirium, pessima. 5. Si ei spontaneus alvi fluxus aut acuta febris supervenit, brevi fit mors. 6. In ea cavendum ab irritantibus, sive purgantibus, sive clysteribus, nec magis obstruentibus, sed utendum anodynis, et emollientibus, et dissolventibus. 7. Si ei supervenerit urinae suppressio, stranguria, singultus, ventris inflatio, aut convulsiones, lethale. 8. Sudores multi et faetidi pedetentim erumpentes, brevi mortem minantur.

Hippocr. ad: Aricta.

Bagl. 118. evacuatam ab. Ilei, librarii intestinalis, contra: indignem. 169.

Inflammatio. 1. pleurae, intestinorum, vesicae, etc. dolore cessante, si febris augeatur, et reliqua pariter augeantur symptomata, pulsus celer, [illegible] intermittente et debilis et reliqua [illegible] paulo post mors; mors enim adest in [illegible] supervenit Gangraena.

Bagl. 113.

Vertigo. 1. Si vertigine diurna comitetur, est Epilepsiae prodromus.

Ischuria. 1. A vitio renum periculosior quam à vitio vesicae, et nisi ante 7 dies mitigetur, interimit. 2. A sauciata spina, est pessima. 3. Si odor urinae ex naribus et ore aegri emittatur, lethalis. 4. Ei spasmus superveniens, ut et singultus, pessimus.

aquae [illegible] in sang: urina.

sang: [illegible] [illegible]

Labra. 1. Ejus concussio biliosam alvi proruptionem ostendit, et vomitus.

Lethargus. 1. In eo tremor superveniens, malus. 2. Somnus laborem faciens, malus. 3. Dejectiones involuntariae et liquidae, et urinae jumentorum similes, sunt desperatae. 4. In eo ante diem septimum intereunt, alias salvantur. 5. Si abscessus prope aures supervenerit, et si pus ex auribus fluxerit, ex symptomatum diminutione, bonum. 6. A Lethargo quicunque servantur, absque abscessu aliquo, fere semper laborant. 7. pulsus dum ex parvo fit magnus et sensim in magnitudine crescit, mors est via pulsat.

Nota: Baal. 76.

Lienteria. 1. Diu durans Atrophiam et Hydropem causat. 2. Si morbos graviores sequatur, est lethalis. 3. Ex difficili respiratione et lateris vellicatione juncta, saepe transit in Phthisim. 4. In ea si acida fit eructatio, quae prius non erat, bonum.

Lingua 1. Initio rigida, et dein livida et nigra, mala. 2. Mo[illegible] la ex fastidio vomitum nigrarum indicat. 3. Tremula et alvi laxitatem et delirium pronuntiat. 4. Sordida ubique suspecta. 5. Frigida in acutis et aliis lethalibus morbis paulo post supervenit mors. [illegible]

Bagl. 125.

Lumbrici. 1. In pueris semper suspicandi. 2. Ventris contrectatio et tormina eorum signum; subita etiam a somnis excitatio ex trepidatione. 3. Sanguinis stilla e naribus nonnunquam in febribus eorum est signum. 4. Quicunque in subita vitae discrimina sine causa manifesta incidunt, ex pulsu exilissimo, sub specie nunc unius nunc alterius morbi, de vermibus dubitandum. 5. Si vermes in colo latitent, Medicamenta difficulter ad eos perveniunt. 6. Eius crudi ad magnitudinem pisi ex modico in principio et dum ejus infusio, sunt optima. 7. Ab eis gravis morbi, ut febres, syncope, Aphonia, deliria, Epilepsia, Colica, Spasmus etc. 8. In morborum principio vermes et mortuos et vivos prodire, si soli et sine stercore sint, mali; econtra in morborum declinatione ex stercore exeuntes, salutem portendunt. [illegible] Pueri.

Bagl. 50. 169.

fit ab acrimonia vaporum a lumbricis ortorum, simul orientis vasa corrodente.

Merc: XII. dulc: V. scammon: sulph: ex modico, in acutis minores [illegible] in pueris. Bagl.

Lumbi. 1. Eorum et partis inferioris dolores, si ad viscera transierunt, subitoque desierunt, mortem subesse testantur. 2. Dolorifica in lumbis mala grumosam sanguinis dejectionem causant, aliud si excursus fit ad caput, paralysis et convulsionis est metus. 3. In eorum dolore sine febre, purgatio indicatur.

Mania, Melancholia. 1. Vere et Autumno ut plurimum fiunt. 2. Dysenteria, Hydrope, Varicibus et haemorrhoidibus solvuntur. 3. Ad Maniam à phrenitide saeviore facilis egressio. 4. Oculi circumacti instabiles, et è contra omninò immobiles, dementiam mortiferam et convulsiones denotant. 5. Melancholia et Epilepsia se mutuo consequuntur. 6. Melancholia in aquam submersione improvisa saepè solvitur. 7. Melancholicis Oxymel nocentissimum. Nott: 8. Qui ex silentio tales sunt, nec voce capti, plerumque moriuntur. 9. Illis febris superveniens ex sudoribus et somnis non turbatentibus, fit solutio, nisi fortè phrenitis veniat. 10. Illis tremor superveniens, malus.

Memoria. 1. Subitò laesa absque causa externa, imminentis Apoplexiae et Paralysis et Epilepsiae signum. 2. Natalis stupiditas est incurabilis. 3. A morbis et venenis memoriae laesio, indeque stupiditas, ferè incurabilis.

Menstrua. 1. Ex iis suppressis fiunt Cachexiae, Hydropes, Asthmata, Ulcera, et tandem mors. 2. Si in ipso fluxu subitò restringantur menses, [à frigore, et potu aq: frig: et aliter] fiunt sanguinis sputa, cephalalgia, inflamma per vaginam, et plurimi alii morbi. 3. Si velis menstrua sistere, cucurbitulam maximam mamillis appone. 4. Menstruis deficientibus lac aliquando generatur in virginibus.

x māalibq hystericis et purgaāliq.

Virginibq. 5. In decoloribq, nec statis periodis fluentibq, purgar necessaria. 6. In gravidis, fluentes menses fatq imbecilles efficiunt. 7. Siijs fluentibq convulsio, et animi deliquiq supveniat, malq. 8. Sanguinis vomitus ijs erumpentibq, salutaris. 9. Si circuli lividi et plumbei sub oculis appareant, et menstrua, et Gonorrhæam, adesse judica. 10. Ex dorsi nimio fluxu continuato, fiunt pedq tumores, Cachexia, etc. 11. In senectute supveniens nimiq fluxq saepe durat ad mortem. 12. Extra ordinem in acutis fluentes, periculosi: imo si consueto etiam tempore erumpant, ominosi sunt, his enim regionibq raro fluunt critice.

Margin: ° Thoringi Sinam; pulveris Vitriolum; ... magna quantitate remedia opt. Bagl. ... vomitu et sputo ... hysterica ... menagogo ... olei ...

et morbi ad finem.

Morbi. 1. In omni caloris aequalitas expetenda. 2. Qui a repletione nascuntur, vacuatione sanantur, et e contra. 3. Unq altero supveniens, non raro mortiferq. 4. In morbo quovis, qui cito cocta sunt Urinae, sinistri aliquid est. 5. Erit longior et minq tutq si urina diu deficiat, quoque sit pura, et nonnunquam quid albi subsidet et leve. 6. Ubi nāa, aetas, et anni tempestas, morbo cognati sunt, ibi minq periculi. 7. Qui a dolore dorsi principium ducunt, difficilia sunt. 8. Morbi nec pubertatis adventu, nec menstruorum, soluti, longiq producuntur. 9. In omnibq tarduis et pertinacibq morbis, periodum sibi propriam non servantibq, de lue Gallica poteris suspicari. 10. In morbo longo extenuatis, alvq repente sine causa soluta, et tremore mortem infert. 11. Quo in morbo somnq noxam adfert, lethale; si vero prosit, minime lethale. 12. In diuturno, cibi fastidium et sinceræ dejectiones, malq. 13. Acuti morbi imparibq diebq salutariter desinunt, et qui paribq, fere sunt lethales. Bagl: 10. contra Chronici paribq diebq, et mensibq terminantur. 14. In morbis pectoris diuretica et pedilucia utilia sunt, purgantia contra generaliter noxia. 15. In morbis pect: vomit: non exhibenda, ne fiant Ang. flamma, et in de Haemoptysi et affectionem et mollitiem ex temporis vasorum. 16. In ijsdem, praesertim acutis, fluxq alvi perniciosq. 17. In morbis capitis fluxq alvi supveniens, salutaris.

et morbi ad finem.

Margin: x In morbis mulierum semp de vermibq suspicandum. In morbis mulierum de affectione hysterica et sanguine menstruante.

Margin: Bagl: p. 60. n. 3 et morbi ... — i. e. inconcoctae et non feculentae. — Mtt. 2. 82. Bagl. p. 10. — p. 53.

Morbilli vide Variola.

Margin: et Conceptio. Gravida; Puerpera. Bagl. 60. et Uterus. 78. 118.

Mulier 1. Quae praeter naam crassa est, et non concipit, fit ob uteri os, ab omento compressum, et ideirco ante extenuationem non concipiet. 2. In morbis mulierum de affectione hysterica et sanguine menstruante cogita. 3. Mulieres hystericis obnoxiae affectibq sentiunt quondam frigoris in vertice capitis pati solent: estque hoc praecipuum hysteriae diagnosticum. 4. Mulieres Gonorrhaea laborantes, et mon. tardantes, circulos lividos sive plumbeos sub oculis habent, qui inter diagnostica morborum muliebrium reponendi.

Nares. 1. Earum humiditas senibus propria, et argumentum minoris firmitudinis. 2. Earum rubores sunt signa liquidioris alvi. 3. Earum pruritus est infallibile signum synochi simplicis, nec non tenuis mador cutis. 4. Nares pinnae arcuatae, et oculi elevati, cum naso simo, et facie mala, periculum mortis portendunt. 5. Earum stillicidium malum.

169. Hipp. Bagl: 170. Waldschm: 127. Walsh.

Nervi. 1. Viola est specifica in morbis nervosis. 2. Equitatio est in omnibus nervosi generis morbis, et sensus moderati caloris et titillationis (tingling or stuff pricking and trickling) in variis corporis partibus, certum est indicium recuperationis a morbo. 256. Ibid. 261.

Bagl. 80.

Oculi. 1. Quo colore eorum alba pura redduntur, eo citior crisis, et è contra. 2. In morbis, eorum albedinem in somnis apparere, malum. 3. In senibus sunt humidi. 4. Eorum rubor à vomitu malum. 5. Lumen fugere, involuntariè lachrymare, alterutrum oculum altero minorem fieri, aut distorqueri, album intumescere, nigrum diminui, aut sub palpebra superiore occultari, eorum aciem crebrò huc illuc volvere, aut tandem tenuis tenuique pellicula obtectum, esse concavos, aut foras multum exortos, aut ipsos continentè nictare, colorem mutare, aut palpebris inter dormiendum non tegi sunt prava; ut et eorum hebetudo, conversio, et caligo. 6. Lippienti superveniens febris, fit solutio; sin minus, caecitatis aut mortis periculum. 7. Cephalalgia eam praecedens aut in fronte, et firmiùs fixa, periculum caecitatis adfert. 8. morbi oculorum in morbos pectoris mutantur, et è contra.

Bagl. Ibid. 136.

Ophthalmia. 1. Qui oculos habent prominentes huic magis sunt dispositi. 2. superveniente alvi fluxu solvitur. 3. si in uno oculo sit, ad alterum ut plurimum transit.

Os. 1. Oris ulcera infantibus propria. 2. Ejus amaritudo vomitorium exigit. 3. ubi fauces aegrotant, excrementa spectanda, nam si biliosa fuerint, corpus etiam aegrotat; aliàs non.

quia stomachum impurum ostendit.

Oscitatio. 1. solvitur à potu vini aqua diluti.

Palpitatio Cordis. 1. Si supervenerit pulsus remittens & intermittens, imminet Syncope. 2. Qui eâ in juventute corripiuntur, raro ad senectutem perveniunt. 3. Quæ fit à malo hypochondriaco, levior est quam quæ fit à Scorbuto. 4. Si fit à veneno, res est admodum periculosa.

Medicamenta: Martialia, Laxativa, purgantia, Diaeta & pulvis chalybeatus.

Paralysis. 1. Sudores in eâ sensim exsudantes, prosunt; confertim prorupti, et larga sang: detractio, nocent. 2. Ex partis pallore magno omnem curæ spem tollit. 3. Ex luxatione dorsi aut cervicis, ut plurimum lethalis. 4. Paralysis partis in febris periodo, ferè insanabilis. 5. Paraplegia consueta hominem non interimit. 6. Paraplegia superveniente convulsione tollitur. 7. Paralysis cum partis atrophia insanabilis. Si cum stertore, Hipp. vocat [illegible] fortem, et Gal. [illegible] 151. et [illegible] maximam et acutissimam, quam curare sit [illegible] ... per. 308.

& Exc: Bagl. 227.

ob compressionem nervorum continuam unde spirituum influxus omnino impeditur.

Parotides. 1. Febri acutæ ex hypochondrij tensione conjunctæ, sæpè superveniunt, et si purulentæ non fiunt, sunt malæ, & si repentè flaccescant. 2. pravæ sunt paraplecticis. 3. Cephalalgia, coma, et surditas faciunt ut assurgant Parotides. 4. In acutis quamvis purulentæ fiunt, tamen si pus non sit album, leve, et æquale, malum; ut et si Urina crassam hypostasim non exципiat. 5. Urinæ in Parotidibus citò concoctæ, mali sunt ominis. 6. Ex in periculosa febre parotis supervenit, nec adsit magnus dolor, aut suspicio inflammationis, statim urantur forte caustici, quo pacto maligna materia ad exteriora evolvetur, et [illegible] ... ; aliud timendum, ne morbosa fomes denuo retrocedat [illegible] nobiliora interna et mortem afferat. 7. Parotis si symptomatum mitiorum, si ea apparente symptomata urgent, et morbus non mitescit [illegible]; omnes enim moriuntur. Critice si veniat, bona.

semper cancroda aperienda sunt ex materia critica est, ne retrocedant, et recidivam [illegible] causent.

Bagl. 125.

Partus. 1. In primiparis ut plurimum est laboriosior, et si aliàs sit, partus succedentes difficiles fiunt, et sæpè in puerperio moriuntur; et è contra. 2. Virginibus adultioribus est difficilior. 3. Si difficili superveniunt aliquando convulsiones funestæ, nisi brevi solutus fuerit. 4. Si sternutatio superveniens, bona, ut et ad secundinas deturbandas, naribus et ore compressis. 5. Quæ in febribus sine causa evidente extenuantur, eæ cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur. 6. Quæ pariunt faciles, iis

& Mulier. [illegible]

ut

ut plurimum à partu aliqua difficilia. 7. Crebrò ante partum rigere, et indolentèr partu levari, periculum subesse ostendunt. 8. Quæ parturiendo præ corde dolent, paulò post ista pariunt. 9. In doloribus post partum Ess. succini et aq. cinam: extracta, et exigua Syr: cinam: quantitate temperata, specifica.

> *[margin:]* quia pars sang: in totius attenuatis, [illegible] à nimis sunt [illegible] Hoffm. Hagl. 443.

Pectus & morbi ejus. 1. Pectori et intestinis omnia frigida sunt inimica, oleum nix et glacies, tusses enim, sang: fluxiones, et destillationes movent. *[margin:]* Hipp.

Peripneumonia. 1. In ea pus fervere, lethale. 2. Pleuritidi succedanea, gravior est primigenia. 3. In ea si tota lingua sit alba et aspera, totus pulmo inflammatus, aliàs non; si dolor ambas claviculas occupet, ambæ superiores pulmonis alæ laborant, aliàs non; et quibus circa mediam costam, ibi et media, et cæt. vide pleurit: phthis: habem. etc. 4. Si in sang: extracto non apparet crusta alba, nec prima nec secunda vice, pessimum, et etiam abstine ab ulteriore missione, ne ægrum interficias, sang: nimis coagulando. id: idem observ: in aliis pulmonum inflam: 5. Si febris, tussis, et reliqua symptomata exacerbentur gladio quo major exacerbatio, eo certior mors imminet. 6. Qui longo collo præditi sunt peripneumoniæ obnoxiores. Pra.nem.

> *[margin:]* ψ Pulmonis. Bagl. 55. id: 113. Charr. 152.

Phthisis. 1. In ea sputum carbonibus injectum malè olens, et capillorum defluvio, pessimum. 2. Si in aqua marina descendit, brevi mortiferum. 3. periculosior ab anno 18vo ad 35um. 4. Si cui sputa salsa unàque tussis quidsunt, iis corpora fiunt pruriginosa, et velut exanthematis obsita, sed ante mortem evanescunt. 5. Si in ea et febre, fluxio in dentes et gingivas adsit, ingens malum. 6. In ea hypochondriorum tumores sunt pessimi. 7. In ea suspiriosi ex nimio pure, et multa cruda expuentes, sunt desperati. 8. In ea quo melior stomachi constitutio, eo melius. 9. Alvi fluxus superveniens verò & nunquam curatur. 10. pedum tumor superveniens, pessimum. 11. Si continuò sentiatur in pectore dolor, et difficultas spirandi incipiat patiens (et in cæteris benè se habeat) et ad spirandum non sterlat, sicca tussi laboret, nil expuat, et tandem si gena rubent, et febricula adsit, de tuberculo pulmonum certus sis, quo supputato, et derepentè erumpente pure in tracheam, fit suffocatio. 12. phthisi præcipuè accidit inter annum decimum octavum et tricesimum quintum. 13. Si capillis defluentibus, fluxus alvi superveniat, moriuntur. 14. Quibus sputum à pure dealbantibus, fluxus alvi superveniat, moriuntur. 15. In labiis si dolor vehementer obvolutur ... coloratus mortem prognosticato. 16. Si dolores illi lævius ... supervenerint tandem pauci post diutius moriuntur. 17. In ea vomitiones caveantur. 18. Cavitas ... tubis et circumstantiis Obs. 11. ... pulmonis et costis. 17. In ea fluxus ventris colliquativus sunt immediati. 19. Incurvatio unguium, capillorum defluvio et ... ad longissimum vitæ terminum ... Zyp. ... 5. c. 1. act. 8.

> *[margin:]* 203. Bagl. — ... sputa ... — ψ ... Bagl. 204. — Sydenh.

Pleuritis. 1. Per pulsus duritiem, in omnibus partium nervosarum inflammationibus communis infallibile dignoscitur. 2. Bona respiratio semper bonum indicat, et è contra. 3. pulsus intermittens non semper periculosus. 4. Si abscessus in viscere interiore supervenerit, fit solutio. 5. Sanatâ pleuritide, si remanet calor corporis, aut vesperas calor corporis, aut tussicula, et blandus circa vesperas calor corporis, aut vesperas suppurationem prognosticato. 6. periculosi qui nil expuunt, nisi copiosè esse =

> *[margin:]* B. 5. 6. 7. 8. 9. Bag: p. 51. et 113. et seq. Bag. p. 10. Hollg. Hipp. 171.

Stoll
ad ℥ 50. 60, &c.
u Cloriq. 172
x freq. angin. pectus
suiorde.
p. 113. Hipp:

attenuantibus

effluant Urinae. 7. In ea phlebotomia est princeps remedium, cum Diluentibus et Attenuantibus calidis 8. In ea omnia ex camphora pro secreto habentur. 9. A purgantibus, imò et Clysteribus cavendum, ne sputum supprimatur. et idcirco alvi fluxus spontaneus periculosus. 10. Dolore cessante, si febris durat, et augeatur cum pulsu parvo, frequente, intermittente, et sudore frig: fit Gangraena, delirium, et paulo post mors. 11. Recidivae omnes ferè sunt lethales. 12. Cum inflammatio in Apostema degenerat, febris continua excipitur à hectica et putridiana, idque circa septimum diem. 13. Sudores, aliaeque evacuationes, non tam conferunt, ac excretiones per sputum. 14. Si sputum ante quartum apparet, bonum, ne languescentibus viribus, et sputo crassescente, morbus augeatur. 15. In principio Diaphoretica, et dolorem et alia capitis mala producunt 16. Si sputum antea suppressum supervenit, et fit flavo rubescens, non est V. S. instituenda, ne sputum iterum supprimatur, et aeger moriatur. 17. Probè spuitur, deinde ex toto desistitur, cum gravitate et dolore remanente, pessimum. 18. Pulsus summoperè durus, parvus, et creber, semper exitialis. 19. Vesicantia tibiis admota expectorationem promovent, et spirandi difficultatem imminuunt, et fluxus alvi si adsit sistunt. 20. Si in sanguine extracto non apparet crusta alba, nec prima nec secunda vice, pessimum; tum etiam abstine ab ulteriori missione, ne nimium coaguletur sanguis. 21. Si in declinatione, abdomen nunc flatibus intumescat, nunc detumescat, bonum; sanatio enim tum fit, ut plurimum circa decimum diem. 22. Si symptomata exacerbentur quinto die, eo mors certior septimo die. 23. In ea tenuissima diaeta, aut parca, imperanda. 24. Omne sputum non solvens dolorem, malum; solvens, bonum. 25. Potus frigidus nullos necat 26. Suffocatio dolori lateris accedens, purulentum indicat. 27. Per raram metastasim, nunc per nephritidem, nunc per morbos articulares, nunc per tibiarum ulcera, nunc per sang: mictum, nunc per Diarrhoeas criticas, nunc per evacuationes in partu factas, terminatur. 28. Vomitus biliosus et copiosus in principio salutem pronunciat. 29. Ejus in caput metastases ut plurimum funesta. 30. Sputum valdè sanguinolentum periculosum, ut et sputum album glutinosum et rotundum, ut et viride et [illegible] 27. 31. Si Diarrhaea copiosa non sedantur symptomata, malum. 32. Diuturno morbo succedens est periculosa. 33. Corpora robusta et exercitiis dedita citius interimit. 34. Qui tum initio varias sunt respirationes, vel tertio aut quinto moriuntur, aliàs postea incipiunt suppurari. 35. Si in ea dorsum rubeat, incalescant humeri, gravius residendo spirent, et alvus fluat viridibus et salidis, tum vigesimo die intereunt, aliàs periculo defunguntur. 36. Bulla sublivida continuò in linguâ tumescens, difficulter morbum solvi ostendit. 37. Sputum dulce, malum; flavum verò pauco sang: permixtum in morbi initio, saepè salutare. 38. Dolores initio leves, ingravescentes quinto aut sexto, facilè ad duodecimum perveniunt, quo die, ut et septimo, novissimum periclitantur; qui verò bis septem evadunt, periculo defunguntur. 39. In pectore strictis multis, facies maeroris plena, oculi icterici et caliginosi; morti forte 40. Qui purulenti futuri sunt, primò exspuunt salsa, mox dulciora. 41.

41. In ea subsistit sang: è naribus, malum. 42. In ea urinæ primo crassæ, et ante quartum illorum tenues, nihil criticum pro utili præsto ferunt. 43. In ea sang: expuit[us] cum tussi et dolore moderatis, et cum sputo crassiuscu-lo et sine febre, sunt bona; è contra mala. 44. In ea aliquo vesicantia urinam movent, magno cum commodo. 45. Qui acidum ructant, non sunt admodum pleuritici. 46. pleuritici omnes sanati, quibus in interiora [illegible] [illegible] dolor, et exinde suppuratio supervenerunt. 47. [illegible] liquor exhibitus est mihi in [illegible] pro dissolvendis pertinentibus viscidita-tibus in [illegible] epidemicis ad maliora [illegible] in aliis pectoris morbis à tali causa pendentibus. 48. Quibus pleuritis [illegible] sputi multi est in pectore, et facies tristis, et oculi colore auriginis infecti, hi pereunt [illegible] pectoris morbis, [illegible] [illegible] [illegible] -49. [illegible] alvi in ea; et in omnibus pectoris morbis [illegible] ad finem.

+ Pucenda ad vellicia. Podagra, vide Arthritis.

Purgatio. 1. [illegible] educenda, quæ sponte prodeuntia juvant. 2. Quo maxime vergunt, eo ducenda. 3. Cruda non movenda, sed cocta et turgida. 4. Excreta non copiâ sunt æstimanda, sed si qualia oportet exeant, et facile ferat æger, imò quovis sit ad animi deliquium. 5. In acutis raro purgantibus utendum, præcipue in principio, nisi quid [illegible] moveri maxime urgeat. 6. Nunquam in crisi purgandum. 7. Colorib. alimentis colores sunt excretiones. 8. Cibi fastidium, oris ventriculi morsus, oris amaritudo, et vertigo tenebricosa, purgatione per superna opus esse significant. 9. Omnes supra septum transversum molestiæ, evacuatione [illegible] gnificant. 9. omnes supra septum transversum molestiæ, evacuatione significant; quæ verò infra, per inferiores, per superna purgandum esse significant; quæ verò infra, per in-ferna: sic genuum gravitas, lumborum dolor, etc. sine febre, inferna ex-ferna; sic genuum gravitas, lumborum dolor, etc sine febre, inferna o-forna purgatione significant. 10. Qui bonâ sunt corporis valetudine, purgationes difficile ferunt. 11. Qui difficile vomunt, et modice, per inferiora movendi, cavendo æstatem. 12. [illegible] [illegible] sunt carnosi, per inferiora movendi, cavendo æstatem. 12. Elaterii [illegible] cavendum vomitiones. 13. Melancholici vehementer purgandi. 14. [illegible] sub [illegible] et ante [illegible] purgationes difficiles. 15. Qui post potionem medicam purgantur non sitiunt, iis purgandi finis non est, donec sitiverint. 16. Si frigus cum sudore superveniens, malum. 17. Purgantia non utenda in morbis initio, nisi in mala turgente. Bagl. p. 20. 18. Purgantia non danda hæmorrhoidum laborantibus.

Pueri. 1. Ad dentiendi tempus accedentes, fiunt gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, maxime cum caninos edunt dentes, et iis præsertim pueris, qui crassissimi sunt, et alvo sunt durâ. 2. In morbis puerorum semper de vermibus suspicandum.

Puerpera: 1. [illegible] continuâ correpta, si superveniat dyspnæa, semper periculosa; magna namque ex parte tales moriuntur. 2. Puerperis [illegible] [illegible] [illegible] possis [illegible] [illegible]. 3. Præcipui earum morbi à [illegible] frigore [illegible] [illegible] animi passionibus, et [illegible] [illegible] [illegible] frigido. 4. In iis [illegible] et tinnitus auris pessimus.

Bagl. p. 104. 5. 186 Nott.

Hipp.
In quo in [illegible] propi: noli sequens [illegible] 4 [illegible] [illegible] [illegible] diaphor: [illegible]

[illegible] [illegible] 3j. M. [illegible] f. pil: tempora [illegible] sponi.

Sputo attenuans à diebus [illegible] primo exhibendo.

[illegible] pulmonum vomicâ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] laborantibus.

Sudore

Bagl. 119. 148. [illegible] Partus. Gravidæ. Nutrices.

quia Raucitas oritur saepe à magna acri in tracheam fluente (quae cum [illegible] Bagl. 742. [illegible] Primum Bagl. 81. [illegible] asperam [illegible]

Raucitas. 1. Qui pertinaci raucedine laborant, hectici moriuntur, anno vix elapso. 2. Syr: de Erysimo Lobelij valdè prodest.

Renes. 1. Quibus cum Urinâ crassâ furfura quaedam simul mingunt, hi Vesicae scabie laborant; sed si cum Urinâ crassâ exigua caruncula, aut veluti pili unà exeant, hi à renibus excernuntur. 2. Qui sponte sanguinem mejunt, ijs à renibus venulam ruptam significat. 3. Renum et vesicae vitia in senibus difficilè curantur.

Respiratio. 1. Frequens et parva inflammationem denunciat partium spirabilium, at verò magna et rara dementiam. 2. Frigida lethalis; aestuosa item et fumida non bona. 3. Magnus foras efflatus, intrò parvus, et è contra, pessimus et mortiferus. 4. Tarda, velox, obscura, duplex intrò revocata, mala. 5. Spiritus creber et sputum inhibitum mutuas tradunt operas. 6. Respiratio per vulnus lateris, major quam per os, lethalis. 7. Respiratio libera in omni morbo qui cum feb. acutâ infestat. magnam habet ad salutem vim; haec enim cum fere in prognosi [illegible] junctus. 8. magna et tarda delirium et convulsionem indicat. 9. Parva et obscura semper mala.

Walsh.

Suppurat. [illegible]

Rigor. 1. Est penè febris omnis comes. 2. Ut est Urinae suppressio Symptoma, ita Rigoris, Urinae suppressio. 3. Rigor dorsi ab Empyemate pestiferus. 4. Ante diem septimum in febribus malus. 5. Rigores [illegible] mali. 6. Rigores suppurationes manifestant; sed aliquando pulmonum vomica clancu[lum] sine ijs supervenit. 7. Incipiunt mulieribus ex lumbis magis, et per dorsum perveniunt ad caput; viris verò parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti ex femoribus et cubitis. + Mor. [illegible] 24.

Bagl. 125.

+

+ Faciei, Gutta Ros.

Rubor. 1. Rubores faciei, post eius Gutta Rosacea, post Erysipelas, si non purgantibus, cauterio crurib[us] affixo sanantur. 2. Sectio venae frontis etc. Sid. Marc. Donatus l. 1. c. 7.

Bagl. 113.

Ructus. 1. Si ructus acidos abstine à vino et sanaberis; loco vini aq: anisi aut cinam: alteratam sumite, sanatus verò, denuo vinum assumas etc.

... 1 ... principio in ... ℥ij gr. ... singulis noctib. sumpsit, ... eiusdem medici tripla dosi: multa enim medela majori qm par est quantitate adhibita, in efficacia sunt. vid. Rat. Haen. 1900.
... vomitu ... 4. ... pulmonem est ...
... Sanguis in mammis stagnans furor ... 4. ... in omnibus inflammatoriis partis internis, ... crustam quandam albam veluti gelatinosam in superficie habet. ... Bagl. 5 ... 6. ... non sit ... magnam partis ... indicat. 7. purulentus et ad coagulum pronus turbatam mixtionem et lymphae ... innuit.

	... Bagl. 4.42 ... sanat. Wallh.

Secundina. 1. ... retentionem comitantur lypothimiae, febres, ... suffocationes, putrefactiones et sim. mala. 2. ... placenta ... non tamen sistenda (imo sisti non potest), ad contractionem ... removenda ut ex ...

Scorbutus. 1. In eo ... parvus, languidus, ... minus periculosus ... in a ... morbis. 2. ... in Cachexiam, Hydropem, ... transit. 3. ... maculae, quo lividiores et nigriores, eo pejores.

Senes. 1. magna ex parte Juvenibus minus aegrotant; quicunque vero morbi iis accidunt diuturni, pleriq. moriuntur. 2. In iis Raucedines et Gravedines ... coquuntur. 3. Dolores ... in iis ut plurimum lethales, praesertim quia ... expurgare nequeant. — ... Hipp. — Bagl. 171.

Singultus. 1. Nimia purgatione ... periculosus; ut et ... hepatis inflammatione, ... doloribus, ... febri continuus supervenit. 2. ... spiritu diu cohibendo. 3. ... gutter ... lavando. Clerc. hist. p. 249. 4. pessulus salviae et semen Anethi ... probatus. Hamil. 217 pro potu ordinario. 5. ... — ... in cata ... et etiam ... — Hems. — Wallh.

Sitis. 1. Immodica ... in acutis mala. 2. sitire ... non sitire, et non sitire ... sitire ... mala.

Spasmus. 1. In febre continua lethalis. 2. In eo Urina ... clara, tenuis, et copiosa. 3. a vulnere, haemorrhagia, ... pessimus. 4. ... — Wallh.

Sterilitas. 1. nec ulteri densi, nec frigidi, nec nimis humidi, nec nimis ... pinguis, ... conceptioni sunt apti, sed tales qui ex utrisq. moderatam habent temperiem. Par etiam est de maribus ratio. 2. Sterilibus vomitus sang. ad concipiendum prodest; menstrui enim fluxus viam gerit. — Conceptio. Mulier. Uterus.

Sudor. 1. Bonus qui toto effusus corpore. 2. Ubi sudor, ibi morbus. 3. Confertim ... noxius. 4. frigidus ac solus circa caput et collum, pravus. 5. Qui ... 7. ... acuta ... sudor, pessimus. 6. ... — Sudores subsistentes ... Hamil. 206. Bagl. 180. ... 4. 41. 67. 81.

Walth. | tumoris copia, et quasi strangulatio in vasis. 8. Periculosi [illegible] [illegible] in variolis [illegible] in principio variolarum lethalis. 9. Omnes [illegible] [illegible]
Hippocr. | 10. [illegible] post eandem largiorem [illegible]. 1. in forti apopl: [illegible] [illegible] respir: [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] alia [illegible]
v. Auris affectg. | Surditas. 1. Alvi profluvium biliosum superveniens eam tollit.

Syncope. 1. In eâ si spirituosa non suscitent, periculum est. 2. Ab externâ causâ minus periculosa. 3. In eâ sudor quo frigidior et glutinosior eo pejor. 4. Qui frequenter et sine causâ manifestâ animo deficiunt, de-
Hip. | repente moriuntur. 5. In malignis summum portendit periculum.
Walth. |

Tabes. vide Phthisin.

Dry-Flax. | Tenesmus. 1. Non raro in Ulcus et Fistulam degenerat. 2. [illegible] signum
Bagl. 119. | est fœtus mortui in utero. 3. In moderato excipiatur per infernum vapor. [illegible] [illegible] ardentis [illegible]

Testes, v. Tussis, Tibia

Hip. 4. 6[illegible] 5. | Tetanus. 1. Est immobilitas recta cervicis. 2. Est intra quatuor dies lethalis, alias sanabilis. 3. In eo maxillas laxari, [illegible]; ut et etiam clamare, si ab initio voce captus erat.

Tinea. 1. Sæpe sponte sanatur; sed si diuturnior sit, in Ulcera depascentia aliquando degenerat.

Tremor. 1. Senectuti superveniens, plerumque durat ad mortem. 2. Hereditarius raro curatur. 3. Partui superveniens, sæpe Epilepsiam inducit. 4. Ad
Hamil. 211. | manuum tremorem in morbis sp: Lavend: comp. gtt: XX aliquoties in die cum haustu potus ordinarij.

Tumores. 1. Quicunque tumores dolentes assurgunt fluente alvo, mali
Nott: | sunt. 2. Ubi tubercula exoriuntur in corpore, ibi excrementa spectanda; nam si biliosa sunt, signum est corpus etiam ægrotare. 3. In tumoribus conspicuis nunquam fit valida convulsio, aut insania; sed ijs repente evanescentibus (siquidem posticâ parte fiant) convulsiones et [illegible] accidunt; si verò à fronte, insania, aut lateris dolores, aut dysenteria, si rubri nudi fuerint tumores. 4. Molles tumores boni, et crudi mali. 5. Si [illegible] [illegible] tumor magnus in perinæo [illegible] ischuriam aut alvi suppressionem provocans, [illegible]
Bagl. 127. | [illegible] est; generandæ enim perinæo. 6. Tubercula ad aures cum dolore perniciem
Hip: | minantur.

Bagl: 80. | Tussis. 1. Si contumax sit, Herniam in pueris, Abortum in fœminis, Phthisim in viris, causat. 2. Si
v. Asthma. | post febres curatas supervenit, à malâ morbi fece, metastasi, prompte succurrenda, ne in phthisin degeneret. 3. Hydropi per anasarcam superveniens, lethalis. 4. Si [illegible]

Tussis inflammationi tussis supervenit, inflammatio solvitur, et è contra: 5. Tussis cum alvi fluxu continuato, est pestifera, nisi dolores vehementes pedibus inciderint. 6. In infantibus ut plurimum solet esse à stomacho cruditatibus scatente. 7. In aere et siccitate usus lactis cum aq: violarum et syrupo corali, optimum remedium. 8. Aliis morbis superveniens, non curatur, nisi curatis morbis à quibus pendet. Sic à febre non liberantur perfectè, si tussis adhuc perseverat. 9. In tussi pectorali purgantia et vomitoria vix danda, sed in stomachali semper. 10. In catarrhali vel sicca bolus ex butyro et saccharo optimè prosunt, ut et syr: de erysimo. 11. In convulsivâ infantum decoctum ex musco arboris quercei est Herbetum. 12. Si tussiendo alba quaedam granula excernantur, quae digitis compressa fatent, vomicam latentem certò denuntiant. 13. A dolore fortè ad testes invadente tussis sicca solvitur. 14. Cum testis intumescit à tussi, memoriam ... 15. Tussis sicca saepè sanatur ... pectoris ... cum brodio alterato portulacâ, tussi ... 16. pectoralis ... vulneribus ex herbis pectoralibus paratis ... 17. ... contra tussim vehementissimam mirabilis est. 18. ... 19. Qui ... tussiendi ... non liberantur, nisi dolores ... 20. A dolore forti ad testes invadente tussis sicca solvitur ... intra aures ...

... humores ... fiat ...
Bag: p. 10. 81. seq.
192.
expectorantia ...
Nott. ...
125
Bag: p. 10.
ib.
ib. 81.
136.
192. seq.
192. seq.
... 2. 87.

Tympanitis. 1. Tormina circa umbilicum, et lumbos dolor, qui neque medicamentis neque aliter solvuntur, in eam terminant. 2. Tumor pedum non ... 3. Hydrops ascites est familiaris in morbi principio, sed circa vitae finem apparet. 3. ... ordinaria Tympanitidis successio. 4. Non est flatus, ut vulgus dicit, sed intensio et exsiccatio solidorum. 5. Usu exsiccantium et calidorum sponte venit, humidis verò tollitur, aut praecavetur.

Hipp. Sect. 4. aph. 40.
Bagl. op. 576.
577.
578.
576.

Variolae, Morbilli. 1. In eorum principio, nec purgandum, nec Diaphoretica danda. 2. In nimio sang: fervore in principio, fit V. S. et fit ... qui eorum ... ad eruptionem circa qualem; et si adhuc magnus calor, anxietas, et molestiae tendiniis sint, non negligendae cucurbitulae scapulis, cum scarificatione, et dec: emollientia cum spongiâ plantis manuum et pedum applicanda. 3. Si in sang: emissi superficie crusta alba, magna, crassaque (qualis in omnibus morbis inflammatoriis) observatur, hi variolas fore copiosas et periculosas prognostica. 4. In pueris et lumbricis et variolae suspicandae ... 5. Motus convulsivi in pueris ... dolor dorsi acutissimus, tussis, oculi humidi, motus convulsivi, gravitas in somno, ... sang: ... signa. 7. Qui in variolis ... raro moriuntur. 8. Maculae lividae in variolarum summitate nimium significant fervorem. 9. In iis mox impensè sudandum noxium. 10. Symptomata noctu exacerbantur. 11. In iis mictio sanguinis et haemoptoë mortifera. 12. Vehementiores saepè chronicos affectus post se relinquunt. 13. praecox eruptio periculosior tardiore. 14. In iis faciei manuum tumor magni est momenti 15. materiae ad salivationem suppeditetur. ... 236.

Bag: 62.
... salinorum ...
... aq: viol. ...
...
...
... potio ...
... lumbricis ...
...
quia ...
propter sanguinem ...
... cum Croco, Dec. ... cum syr: ...

vid. Diarrh. 7.

15. In iis Diarrhaea, praesertim in adultis, periculosa. 16. In iis divites plures pereunt, quam plebei. 17. post curationem V. S. et purgatio instituenda. 18. Variolis exsiccatis, vini Canarini usus salutaris. 19. Variolas confluentes comitatur salivatio in adultis, et diarrhaea in pueris. 20. Si maculis petechialibus inspergantur, periculosae. 21. Si post eruptionem non remittunt symptomata, portendit mortem. 22. Res desperata si manus cutis assiduo madore, siccis tamen brachiis, occupetur, nisi mador ille sit naturalis. 23. Si in iis tensio et rugitus ventris, cum agitatione, mors fit. 24. Saepe ad sit tensio et rugitus ventris, cum agitatione, mors fit. 24. Saepe variolae ut plurimum die quarto erumpunt. 25. Iis Angina superveniens, mortifera. 26. Pustulae atrae, et lividae, nigrae et virides, mortiferae. 27. Adultiores aetate nisi certe tradantur in variolis, saepe moriuntur phrenitici. 28. pueri variolas non adhuc passi, febre, motibus convulsivis, aut dolore circa lumbos correpti, certum est signum eruptionis variolarum sequente die. 29. Sudor circa lumbos, ut correpti, certum est signum eruptionis variolarum. 29. Humor latio frequens in iis et morbo Hungarico nunquam a me visa mala. 30. Humor volatilis lacrymae, a naso et oculis constanter distillans certissimum Morbillorum signum. 31. Si inimicus sit ad judicem propensio magna, variolas non fore confluentes concludo. 32. Qui in variolis moriuntur, mors fit plerumque octavo die in distinctis, et undecimo in confluentibus. 33. Variolae quanto propius maturationem ad colorem obscurum accedunt, eo periculosiores; quae vero flaviores eo meliores. 34. Morbi periculum a numero [illegible]. 35. Salivatio in confluentibus in adultis [illegible].

Vertigo. 1. Vertigine cum lethargica laborans, victum aversans, et somno ac ardore multo detentus, desperatus est. 2. Ex temporis pulsu visibili, repletionem ostendit. 3. In initio acutorum haemorragiam fore denotat. 4. In febribus continuatione pestifera. 5. In separabili febre dicessione, bona. 6. Si gravior et diuturnior sit, citra manifestam causam externam, in junioribus Epilepsiam, in senibus Apoplexiam certissime pronuntiat. 7. periculosa est vertigo in qua solummodo externa circumagi videntur, periculosior quando caput et corpus gyrantur, periculosissima vero caduca.

Vesicantia. 1. a Cantharidibus in morbis inflammatoriis et acutis cavendum; maxime enim capiti sunt noxiae; adeoque in capitis vulneribus, aut etiam in convulsione suspecta, vel jam facta, ab iis abstinendum. 2. In macilentis et gracilibus caute usurpentur. 3. In delirantibus in acutis cum lingua arida, vesicantia saepe mortifera. 4. In sang: coagulationibus, et morbis soporosis, sunt optima. 5. Cantharides usu nimio fluxus alvi saepe sistunt, et multas qui antea alti erant, obscurant. 6. Ulcera a vesicantibus excitata saepe in Gangraenam, vel in difficillimam eorundem cicatrisationem praesertim in cachecticis, et lue laborantibus valde scorbuticis, degenerant. 7. A nimio eorum usu saepe fiunt foedissimae satyriases. 8. Vix unquam interne dandae, nisi eorum vis multum infringatur, ne vesicae fiat exulceratio, vel renalis inflammatio, intestinorum erosio, vel dolores in hypogastrio immensi, vel similes quaedam. 9. Ut in omni acri sang: constitutione nocent, sic e contra, in omni crassa et viscida prosunt; ut et in febr: cum exili pulsu, frigore, sopore, anxietate, et sim: Sal enim Cantharidum humores ad coagulationem et stagnationem

Epilepsia.

ut et diarrh.

Sydenh.

Sydenh: [illegible] symptomata non sistuntur a moritorum eruptione, ut fit a variolis.

Bagl.

Walth.

Sydenh:

ad [illegible] postulat.

Bagl. Dil. de usu et abusu Vesicant:

morborum oblinitio opt. Bagl. ib. et Ulcer.

Dantur tamen aliquando interne cum aliquo specifico in impotentibus.

om dispositos resolvit. 10. In oculorum et faucium morbis, sunt specifica: 11. In tussi gravissimâ, cum sputo crasso et copioso, cervici applicata, sunt quam optima. 12. Delirantibus hominibus ad mola ... [illegible] ... mulierum ... adhibita levant symptomata et morbi, salutis ... [illegible] ... 13. applicantur sinapismi, Diaphoret: purg: aliisque hujusmodi stimulis non ... [illegible] ... 14. applicantur carpis, post aures, brachijs internis et externis, femoribus internis et externis, nuchâ, inter scapulas, capiti, etc.

Rott: ad odontalgia, Otalgiâ

Vesicae. 1. In eorum obstructionibus, si faciem ... et vividum ... vel colorem, curationem suscipito, aliás non. 2. Chalybs et Rhabarbarum in obstructionibus sunt maxima remedia.

Bagl. 113. Rott:

Vomica. vide abscessus, suppuratio, purgatio.

Vomitus. 1. Spontaneus est saluberrimus. 2. Lividus morbis malignis supervenions, est lethalis. 3. Vomitus sang: crassi et nigri non admodum periculosus; sed tenuis, nigri, et fluidi, et acris, [illegible]. 4. Bilis atrae, postridie mortem denuntiat. 5. Biliosi aut pituitosi, die critico erumpentes, boni: et in genere, ubi humores hi ritè permiscentur, semper boni, nisi nimiâ sint copiâ. 6. Variegati, ex multis humoribus constantes, mali. 7. Bilis vomitus à capitis vulnere malus. 8. Si singultus supervenions, pessimus. 9. Vomitus rubor est lethalis, maximeque si aegro vomat. 10. Quorum alvi cavitate intestinorum laborant, eos hyeme vomere malum. 11. Vomitus in acutis aeruginosi ... livido, rubro variis coloris in acutis. 12. Spaeros vomere in Ileo, lethale. 13. In vulneribus semper malum. 14. posita ... ad vomitum inceptum continuandum.

Purgatio: ... Walth. Walk. Hamil.

Vomitoria. 1. In Hemoptoe aut morbis pectoris pronis non exhibenda.
vide morbi.

Ulcus. 1. Si ulcus in unâ tibiâ, purum et aridum evadat, deinde caloris et dolor et direct partis affecta supervenerit, lethale. 2. pulvis ... ut et fila carpta; decocto aluminis ebullita, et dein exsiccata, sunt ... pro ulcerum cicatrisatione. 3. Si ante, vel in morbo sit ulcus, ante mortem lividum et siccum, aut pallidum et siccum evadit. 4. Circumglatoria, maligna. 5. A forti in iis pulsu haemorragia, malum. 6. Pus album, salutare, foetidum et voluti ... semper lethale. 7. Post sanatum ... sang: fluxus ... ad corruptionem. 8. In ulceribus ... qualidie ... vergunt ... optimus est ... boni.

Bagl. 193. ... Dist. 2. 85. Rott: translatio ... Excerpta mea ... Bagl. 193. ... Bagl. ... 2. 83 Wal...

Vide Mulier, Hysteria

178.

Bagl. 309. Not. aq: frigida pauco farina tritici mixta etiam prodest.

Uterus. 1. Ejus suffocationi superveniens sternutatio, bona. 2. In praegnantibus, suffocatio periculosa, praecipue si sit cum aetione omnium animalis cessante per longum tempus. 3. Ejus affectiones hystericae sub formâ asthmatis se ostendunt saepissime; quod dignoscitur per pulsum, frigores et distensiones in capitis vertice cum aliquo dolore. 4. Sal Jovis cum aq: molitur in Hystericis, est secreta. 5. Utero cancro affectis color faciei à naturali non recedit, sed venas perpolitas roseas habent. Bagl. 113. 6. Quaecunque intestina astringunt etiam glandulas, sunt etiam utero affectis imprimunt; quod probe ad vertendum. Hamil. 189.

Vide Febres omnes, Deliriis, Morbi.

Vide Pulsum nos.

Fit enim translatio bilis ad caput.

vi. Ubi est cujus parte appareant guttae seu bullae aq:, instar sperm. ...

xi. ... pellucida; lactea enim signum lumbric.

Urina. 1. Alba et levis in feb. hypostasis est bona. 2. Subrubra hypostasis septimanâ feb. exsolvit. 3. Urina alba pellucida, prava, praecipue phreniticis. 4. Nebula alba fundum versus, utiles; rubra, nigra, et livida difficiles, nisi sint à mensibus hypostasis. 5. Hypostasis amylo similis et variegata, est mala, ut et divulsa. 6. Quae immerito et ex improviso coquuntur, sunt mala in acutis. 7. Oleaginosa, mala, viridis, mala. 8. perniciosa omnis quae clam omittitur. 9. pleuriticis rubra cum varia hypostasi, intra quatuordecim dies mortifera. 10. Alba est pessima in febre ardente. 11. Cruda, et sic diu reddita, abscessum pulmonis, renalis, denuntiat. 12. Cum hypostasi pingui, febrem abire denuntiat. 13. perturbata quae non subsidit, recidivae signum. 14. Jumentorum similis, cephalalgiae signum. 15. pelliculosa, convulsionis signum. 16. Cruenta principio reddita, longi est morbi. 17. Cum sputi formâ, aut limosâ hypostasi, rigorem denuntiat. 18. Cum aranea veluti telâ, colliquamentum ostendit. 19. Nubecula in feb: erraticis nigra, Quartanas futuras denuntiant. 20. Lixiviosa et pauca, hydropem denuntiat. 21. Spumantes, convulsionis etiam signum. 22. Quae utilem habet hypostasim, et mox iterum non habet, laborem ostendit. 23. pleuriticis subrubra cum levi hypostasi, securam crisim denuntiat. 24. In parotidibus cito et paulisper mitificata, prava. 25. Intercepta à frigore, in acutis, pestifera. 26. Suppressa, cum dolore renum repente oborto, lapillos aut crassam urinam reddendam ostendit. 27. Suppressa in Ileosis, fit cito mors. 28. Bullata, est nephritica, et longi morbi. 29. Spumosi, in longis et erraticis feb: sunt tenosa. 30. Varia in febribus, saepe longi sunt morbi. 31. Immemoribus reddita, pestifera. 32. Si quis sanguinem aut grumos meiat, vel Urinam guttatim omittat, ac dolor ad imum ventrem incidat, ea quae circa vesicam sunt laborant; sic si squamulas aut pus meiant cum gravi odore, vesicae significant ulcera. 33. Mictus noctu plurimus, pravam dejectionem significat. 34. Hypost: farinacea in feb: longam invaletudinem

Diendem significat. 35. Hypost: biliosa, acuts morbi significat. 36. Excrassis et grumosis, tenuis et copiosa facta, bona. 37. Si urina profunda rubedine tincta sit, et aeri exposita sedimenta lateritia deponit, pro certo febres morbi illi, sub quacunque demum forma appareat, a fermento feb: intermittentis originem suam deducere, ut pluries observavimus. 38. Si circa initia statu morbi urina rubicunda, et contentas excrementitiis copiâ valde satura, sensim mutetur in tenuem et pallidam, pessima. 39. Urina subjugalis, i.e. crassa et turbida quae in acutis feb: aut morbis apparet, semper mala capitis pronunciat; si ea apparente pulsus sint parvi et debiles, aeger ad somnum inclinet, gravitate capitis afficiatur, et soporosus afficitur, et praesertim lethargi mox supervenientem prognosticato. Contra si vigilias, capitis dolor, sitis, linguae ariditas, ardorem viscerum et sim: cum tali urina vigeant, delirium, convulsiones, et alios nervorum morbos jam jam imminentes praedicito. 40. Urina subjugalis, ut mala in acutis, ita ~~...~~ contra bona in nonnullis chronicis, ut podagra, rheumatismo, doloribus ~~Vaing. 1. Si in magnis tumoribus non appareant, mala.~~ articulorum, etc. 41. Urina aquea in feb: deliria praenuntiat, ob bilis ob tenuitatem et levitatem suam ad caput delatione. 42. Pallens in feb: malignis lethalis est, nisi crisi bonâ emittatur. 43. Si urina quinto, sexto, septimo, et diem in feb: appareat hypostatis, indubitatum signum salutis praebet, saltem si antea non fuerit talis, et hypostasis non sit dissulta, sed quodammodo aequalis. . . Qui incidunt in lethalem urinae suppressionem, corripiuntur stupore mentis, tremore, et rigore vel febre demum, paralysi, aliisque nervorum morbis etc. 45. In acutis morbis si urina derepente fiat decolor et tenuis, phrenitidem, morbosque capitis praenunciat. 46 Imminentem Hystericam paroxysmum denunciat color urinae, paulo ante paroxysmus ex citrina in aqueam et tenuem mutata. 47. In animi pathemat. et corruptis Urinae ex rubicunda desinit statim in aqueam et pallidam, nec naturalem colorem recuperat, nisi animi passio morbo recesserit. 48. Color aqueus in urina semper praecedit invasionem paroxysmi convulsivi; et spasmo iste abeunti urinam rursus semper reddunt tenuem, claram, et copiosam. 49. Urina gravidarum nubeculam viscidam in medio possidet quae nec ex concussione divelletur, urina mulierum non item. Glone. 50. Urina fluore albo et Gonorrhea simplici laborantium strias albicantes admixtas habet, quae non prendi secernuntur, sed in meatu urinario habitant, ab excretione materiae albicantis remanentes. Glone. 51. Urina tenuis in Hystericis certum est signum paroxysmi hysterici adventantis; turbida, ~~in~~ eo sedimento in eisdem signum parox: praeteriti et liberationis materiae deinde evocans ex excrementis et obstructiones solventis. Glone. 52 Urina instar seri lactis significat... et etiam crippsiam si alba, seri in... 53 Urina cruenta si coaguletur, à vesica; si non coaguletur, à renibus provocante sive...s. 54. Cruenta in calculo et germinatione variolarum, mala. 55. Clara in sano, ... ac in morbo pessima. 56. Turbata in sano debilitatem, et in morbo malignitatem denotat; in aegro vero ... coctionis materiae prognostica. 57. Sedimentum lateritium est albis mala. 58. Cum nebula fundo petit in feb: turbatio fit seq. die. 59. Largior mictio in acutis mala; in intermitt: hectica est prodromus.

Bagl. 115 et seq.

Zypaeg.

Bagl. 341.

243. ante et valde praedictos morbos comitem albicantis salutis supposidari pallore.

244.

Glone

Walk.

Vaing. 1. Si in magnis tumoribus non appareant, mala.

Cog. Bagl. 192. 233. — [illegible] 45. Qui post vehementes et periculosas pulmonias in crura erumpunt, omnes ulcerosi sunt. [illegible] hepatis, et ex [illegible] cruris aut surae dolores, nullis remediis cedentes, manifestant.

Bagl. 127. 72. Walth. — Alvi fluxo. 1 porraceus ac viridis, et mortem, et diuturnos morbos significat. 2 In inveteratis alvi [illegible] Dysent: [illegible] relaxandum, ne [illegible] intempora [illegible]: [illegible] ardentibus mixta 3 quo die fluere alvus saepe pro valetudine est, atque etiam pluribus si abest feb: et intra unum diem conquiescat.

Bagl. 124. — Anasarca et Hydrops.
[illegible] 1. ma: [illegible] a rupta tunica arteriae. varix à rupta valvula in venis. Hydatides à ruptis valvulis lymphaticorum. 2 Qui aneurismate interno laborant, et ex [illegible] sani, et derepente moriuntur: caveant hi omnes à nimio motu, venere, ira, liquoribus spirituosis, et quicquid sang: motus adauget ac perturbat, utantur diaeta lactea, cibis aliquantum viscidis, et motu moderato.

Bagl. 126. Sennert. — Appetitus. 1. Si in morbo aliquo appetitus sit prostratus, postea vero derepente supponiat maxime, non praecedente ulla crisi, nec imminuto morbi paulo post moriuntur aegri; significat enim cerebri laesionem, et virtutis sensitivae extinctionem.

Bagl. 196. [illegible] 104. Bagl. [illegible] — Arthritis. 38. Mature potant lecti, praesertim hyemali tempore, qui podag: [illegible] sunt obnoxii; nocturnae enim vigiliae, nec non perturbationes animi, primas [illegible] actiones [illegible] debilitant, [illegible] fomitem podagrae producunt. 39. Podagrici nec [illegible] [illegible], nec [illegible] nec frigida [illegible] nec aromatica [illegible] nec vinum nec aq. [illegible] aq. mulsa vel [illegible]. 40. nullum remedium [illegible] podagra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] podagra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. 42. Tollere nodosam nescit medicina podagram [illegible]. Qui podagra non confirmata abstinent à vino, et purgent semel vel bis in septimana, et curabuntur. marc. Donatus l. 1. c. 8.

Capitis. 1. In morbis capitis alvi fluxus superveniens salutaris. 2. Dolores capitis magna ex parte à stomacho fiunt, et si hac tibi sedulò constant, utere stomachicis, dietas et clysteribus etc. 3. In morbis capitis et faucium purgantia levia, et venae sectio exhibita, ex pediluviis multum prosunt, nim. ex hi morbi à crassitie, stagnatione, et lentore fluidorum procedunt; non verò ab acrimonia, convulsione, nimio solidorum, aut fluidorum impetu, et inter hac purgantia primas tenet [illegible]: Bernachini. 4. Dolores capitis ex convulsionibus et motibus convulsivis, in temperamento [illegible] sicco, [illegible] curavit Balnei tepidis ex acidulis per 40 dies, et solu Aq: [illegible] minerali, [illegible] copiâ. ex [illegible] + macerarunt sem: lini, + rad: Althaeae [illegible] solidorum dies.

Cephalal. Bagl. 53. 122.

+ Dolor. Ett. 2. p. 84.

Bagl. Fibra Mot:

Convulsio. 1. Quae pueris, etiam in febr: et mulieribus extra puerperium accidit, plus saepius terroris quam periculi habet. — Walsh.

Delirium. 1. In febr. vesicatoria corpis, inter scapulas, etc. 2. ad illud compescendum antim. Diaphor. vim saepe expertus sum. — [illegible] 204. ib. 207.

Bagl: p. 53. Hip: Walth. ~~[illegible]~~ Dolor. i.e. in aliquâ parte non sentire malū. 4. Diutius durans in parte aliquâ abscessū pronunciat.

[illegible] 144 Epulæ. 1. Post epulas lautiores exercitatio utenda, & alvi solutio procuranda.

Erysipelas. & Bacides, Gutta Rosacea.

Ephelides. 1. In ejus morbis purgantia omnem paginam absolvunt. Hippocr: Exinanita alvo humorem ex reliquo quidem corpore universo, ex capite autem potissimum ad se trahit, et incaluit; vacuandum autem capitis expurgant oculi, aures, faciei exanthemata, et ipsa tamen facies clarior fit et nitidior. 2. Erysipelate faciei laborantes purg: remedio, agri non accommodato, brevi curantur, et pro secreto est.

Bagl. 121.
℣ Gutta Ros:

Febris miliaris. 1. Signa pathognomonica sunt pectoris oppressio cum [illegible] interceptis suspiriis, et spirituum defectu, seu languore. 2. Calor et [illegible] [illegible] vicibus [illegible] pulsus frequens et debilis; vola manus calida cum superiori parte frigida sit; vesiculae [illegible], circa 11mum, 18um, et 21mum diem, primo sero limpido, dein subalbo, [illegible] colore non absimili, in pectore, collo et digitorum interstitiis, aliquando in toto corpore, quae [illegible] indies aucta, tandem evanescunt, cuticula subscabra remanente; urina sanorum similis in initio, aliquando pallida; somnus saepe interruptus.

Hamil.
℣ prax. p. 63. in marg.
In ejus curatione [illegible] medela calida [illegible] danda [illegible] [illegible] excitanda et continuanda solum: modo apta.

Feb: intermittens. 1. Tertiana exquisita sibi permissa, quatuordecim diebus terminatur. 2. Purgantes et phlebotomia in principio [illegible]: perniciosa, [illegible] in [illegible] [illegible] statim duplicantur. Idem accidit a [illegible]: principio exhibita). 3. [illegible] [illegible] [illegible] morbi [illegible] sanantur. 4. [illegible] [illegible] infallibile et specificum remedium. 5. Tertiana simplex [illegible] sponte sua recedit. Ephemera 24 horis, Synocha quatuor diebus [illegible] Hipp: et exper: 6. Tumefactio abdominis in infantibus et pedum in viris [illegible] significant. 7. Dolor [illegible], raucitas, seu [illegible] Hippocratica mortem praesagiunt. 8. Intermittentes vero, quo magis [illegible] [illegible] [illegible] eo citius finiuntur, et contra. 9. 10 iisdem plus accedere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] causam eo mobiliorem forte, et copiosiorem habere [illegible] [illegible] et in has mutari. 10. [illegible] 11. [illegible] [illegible] superveniente calore sponte solvuntur. 12. autumnales, quidem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ex quibus omnibus [illegible] quibus febr: medicina facienda, et [illegible] [illegible] 13. Tertiana laborantibus, si ulcera aut pustulae in labiis et naribus erumpant, finem feb. praesagiunt. Haly, et Experientia. 14. Alvi fluxus tertianae superveniens, materia jam concocta, eam solvit.

Bagl. 179. Hipp. 180. 224, 234 237, 243. 253.
Sydenham.
Boerh:
Riv. id.

Gutta Rosacea. 1. [illegible] aliasque faciei morbosas rubedines, [illegible] aliis, [illegible] [illegible] affixus sanat, et pro magno secreto habetur. [illegible]

Bagl. 121.
Rott.
℣ Ephelides.

Bagl. 178.
+ Ulmus 223.
243

Hysteria. 1. Sensus frigoris in vertice capitis maximus est hysterici diagnosticus. 2. Imminentem hystericam prae caeteris denunciat color urinae paulò ante paroxysmus ex citrina in aquaeam vel crinum mutatus. + Bagl. loc. citat. 3. In affectione hysterica sal aut bezoarticus Jovis specificus est. (Omnia etiam vel chymica foetida naribus admota)

Bagl. 114.

Ischias. 1. Ea correptis, eadem hora, vel paucis à doloris prima invasione elapsis, si purgans mostis dederis (ipse uti soleo syr: de spina cervina cum vino) vix absoluta hac, aut ad summum altera, quam propinaveris, purgatione, aegri certo sanabuntur; non ita verò si morbus ad plures dies et menses fuerit protractus.

Hipp:

[illegible], citra caussam manifestam prodromus est febris. 2. In acutis periculis minatur. 3. Si corpus omne grave est, vel manus ac pedes, periculosum

Mammæ. 1. si subito extenuentur, abortus periculum significant. 2. si ac copiose profundant, fœtus indicant imbecillitatem.

Morbi. Duo maxima remedia in chronicis obstructionum morbis sunt chalybs et Rhabarbarum. (Ego ita utor ℞ chalyb: sulphur: pulveris gr: XV. Rhabar: pulv: ℈j. M. f. [illegible] ...) 2. morbi chronici viscerum naturalium magna ex parte [illegible] ... 3. In morbis ab animi pathematis ... 4. Morbi ... 5. ... 6. ... 7. Purgantia in morbis pectoris ... 8. Periodici dolores, et alij morbi ... 9. Morbi ... 10. Morbi ... 11. Morbi ... 12. In quovis morbo animo ... 13. Desipientia quæ ... 14. Desipientia cum difficultate spirandi, sudore, oculorum ... pessima. 15. Desipientia quædam admodum ... mala. 16. Somnus in morbo laborem afferens, malus. 17. Exitiosum est, ubi ægroti ore hiante ... dormiunt. 18. ... 19. In his qui propter imbecillitatem non ... 20. Sopor in morbi principio malus, malignitatem ... 21. Vigiliæ ... 22. omnis subita ... 23. Singultus in acutis pessimus ... 24. Rigores post quos corpus non incalescit, in acutis exitiosi ... 25. Sputum æquale, non fœtidum et quod sine magno dolore et labore rejicitur in morbis pectoris, albo calculo dignum.

p morbi antea. Bagl. 128.
ibid. 115.
132.
136.
165.
178. & Dolor.
190.
200.
Bagl. fibra. 136.
Hipp. a. 33.
Wall. & Rati: 110.

Phrenitis vid. Delirium.

Bagl. 1.7.2 | 182 | Sill: 2. 81. 82. | Walterm: | Hipp: | Chorr: Hirurg: 147. 149:

54. In pleurit: dolor ut plurimum ascendit ad jugulum praecordia, dorsum, &c. 55. Qui saepe fit pleuritici saepe moriuntur ex pleurit. & peripneumonia. 56. Quo citius apparet sputum [illegible] [illegible] plurimi utique pleurit: curantur. 57. in maligna tutius est sang. missionem omittere. 58. pleuritidem quinque signa constantia comitantur: dolor sc. lateris punctorius, spirandi difficultas, pulsus durus, tussis, &c. 59. Quanti discriminis sunt purg. in pleurit: & morbis pectoris [illegible] [illegible] [illegible] ex [illegible] utilitatis sunt diuretica potissimum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alth. spermaceti, & [illegible] [illegible] dicta [illegible]. In morbis praedictis [illegible] [illegible] [illegible] impetrari [illegible] dis parata suspecta sunt; [illegible] [illegible] pectori inimicum. [illegible] [illegible] [illegible] impetrari [illegible] [illegible] [illegible] radicat morbis pectoris rejiciendum, quia acido [illegible] [illegible], qd [illegible] [illegible] [illegible] inter initia, [illegible] Phthisin. 60. Pleuritide laborantibus si [illegible] statim apparet [illegible] in initio [illegible] [illegible] abbreviat: si vero postea appareat, [illegible] 61. Qui [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 62. Remedia [illegible] viris [illegible], plerumque temp. pleurit: [illegible] & [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] praeter [illegible] sunt quae sang: rarefaciunt, subtilisant, et attenuant, ut flore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sang: volatilis [illegible] maris pulv. [illegible] sal: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in vino albo; sang: [illegible] in vino forti et [illegible]: mirabile est; [illegible] &c. et [illegible] ejusdem [illegible]. [illegible]: urtica in vino forti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] frigidi, pessimi. [illegible] [illegible] [illegible] calapl. applicatur. 63. polo aq: et polo [illegible]

Bagl. 124 | 25. | 127.

pleuritis. 50. si pleuritici non repurgari incipiant 7ma die, [illegible] [illegible] angor [illegible] et aliis symptomatis, nec non magna spirandi difficultate, et stertore [illegible] 7ma die moriuntur: in his [illegible] pedes tumefieri solent ante mortem, et oculi caligare [illegible] 51. In omnibus pectoris morbis [illegible] praesertim sputo sang. & pleurit: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] imperanda, ne sanguis nimio chylo [illegible] [illegible] pulmoni [illegible] [illegible] [illegible] impetus faciat. 52. [illegible] sang. mittitur in pleurit. et non [illegible] [illegible] [illegible] dolorem, & ob crassitiem, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sang: missio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pectoralis quanto fieri poterit calido [illegible] [illegible] pleuritides & peripneumoniae [illegible] strangulatorias [illegible] [illegible]

Pulmones. 1. Praeire et subsequi sternutamenta in morbis pulmonum malum. 2. In lethalibus pulmonum morbis cum febre, et sine febre, ferè semper circa finem cerebri/nervorum affectiones; capitis, ut sopores, lethargus, vertigines, oculorum caligines, &c. 3. Qui ulcere/tuberculo pulmonum laborant, [illegible]; nam separato tuberculo pus in tracheam erumpit, et suffocat. | Bag. p. 10. 122. ψ in suppurat. 20. 2. 159. Phthis: 204.

Pulsus. 1. Si valdè est celerior, debilis, ac ferè vacillans circa initia stat. morbi pessimus. 2. Spirituum robur in feb: ex pulsu certissimè et fidelissimè sumi potest; unde si robustus et aequalis ille fuerit, quamvis deliria, convulsiones, tremores, et varia alia generis nervosi symptomata appareant, semper bene sperandum; contrà si pulsus fuerit valdè celer, debilis, et vacillans, nisi reliqua symptomata salutem promittant, semper timendum; cum tali namque pulsu mors pro foribus esse solet. 3. In omnibus pectoris morbis, sed praesertim sputo sang: et pleuritide lenissima diaeta imperanda, ne sanguis novo turgescens chylo et conditas affecti pulmonis vasorum [illegible] ... 3. Pulsus durities semper comitatur pleuritidem, mollities verò alios pulmonum morbos: quod est inde signa distinctiva morborum pectoris difficillimè cognoscibilis. 4. Pulsus intermittens in una pulsatione praesentaneam mortem denunciat. | Bagl. 117. ψ Sputus. Crisis. 125. 127. Galen:

Rachitisorum Prognostica. 1. Quo citius incipit, eo pejus curatur. 2. Cum durat ad 5 aut 6 annos, valetudinarii sunt in tantum durante tota vita. 3. In puellis pectoris lati angustatis ut difficilius pariant. 4. Hydrope aut Phthisi comitata, lethalis. 5. Cum infantes fiunt scabiosi signum est curam appropinquari. | De Vomey Maladies des os.

Scabies. 1. Ex scabie retropulsa et male curata quamplures insulti mali superveniunt, et [illegible] sanguinis, sang: apopl: hydrops, feb: lentae, caecitas, &c. 2. Quartanariis superveniens, bona; morbus enim quartanariis brevi solvetur, et ipsa scabies nullis adhibitis remediis sponte suâ paulo post recedet. Ut saepe expertus. | Bagl. 220.

Suppuratio. Omnes aliarum partium suppurationes manifestantur prioris et febrium supervenientium; sola pulmonum suppuratio, i.e. eorundem vomica, clanculum et sine praedictis signis supervenit; quod saepè notent Juvenes. | Bagl. 126.

Secretio. 1. Sanguinis fermentatio aut motus violentior, eam minuit. 2. Una evacuatio minuit alteram. | Hamil. 198. ib.

Sydon: Bagl. 148. | Hournius 570. | ib. | Bagl. op. 100.

Suppuratio. 1. Post ulcerem et conicitam statim Sgae b. theriaca ad ℥j circiter ex vino data. 2. ♃ Thor: nova ℈v. si antiqua sit, add. ope gr. ij vini generosi ℥iij. f. Haustus. 3. usus Balnei, sudoris evocatio, usus astringentium, ut terra Lemnia, rosarum, etc. cucurbitae, solus exastring. ventriculo, Narcotica, ut Philonis cum terr. Lemnia, etc. vid. Hournius. 4. Thor. ℈j. 4 ℥v. vino diluto quantitas opt.

Bagl. | ♃ 192. et 193. Bagl. | p. 410.

Tibia. 1. Inter tibias et pectus, inter pudenda et pectus, arcani quidam observantur consensus. 2. ulcera antiqua, cauteria, aliaque tibiarum mala intempestive aut imprudenter sanata, in perniciosos pectoris morbos desinunt, ut quotidiana constat experientia.

Sydon: Variolae, Morbilli. 3.5. salivatione, variolas confluentes in adultis concomitante, cessante, ilico moritur patiens, ni manuum et faciei tumefactio notabiliter incipiat et diu duret.

Bagl. 249

[illegible] ♃ Dolor.
Ventriculi. 1. In eo scirro atque chalybis hydropem et mortem adfert.

pilo Lupi, witch-balls.
Myrtilli baccæ, Blæ-berries.
Moschus cranij humani, qui adnascitur ex ossi ex-posito, est si aliquid humiditatis ei insit.
Aq: sublimata fit ex ☿ corros: ℥v solutis in aq: [illegible] ℥x in mortario vitreo.
Zibethus occidentale est. stercus humanum & infantis pulverisatum.
Panegoricus, doloris allevator.
Dulcis, ex variis oleaginosis et salinis.
Amarus, ex salinis et torrefact.
Stomachicus, ex partis subtilibus firmius in-tricatis.
Pectorale.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Cardiacus.
Acida et rigida scindens et pungens (Scindens in its Sides & pungens in its points) et fi-xat; quapropter liquor movens acidus esse non potest; molo enim acidus destruit; imo acida potentiora post fermentatio-nem, & intestinam dilutionem, procurata à calore; aut dulcia evadunt, aut insipi-da et alcalica; acidi enim spicula fer-mentationem frangunt. Sic aq: [illegible] [illegible]: post biennium evadit dulcis: et [illegible]: acidi [illegible] morâ sponte suâ dulcescunt syr: acidi ignem non ferunt.
Ordo medic: pols physicus, est in quâ [illegible] morbis quibuslibet propria m-[illegible].
Ligna sudorif: 4. rad: quaj: Lig: Sassafr: [illegible]: et Junip:
[illegible] ex Lignis fit ex Dec: secundo
Farinæ 4. Lini; Foenugr: Lupin: Hordei.
Dec: ex Lig: fit. ebullitione Lig: in aq: [illegible] [illegible] sal: sassafr: [illegible] [illegible]: ex:) & præscripta mea p. 35. bis.
[illegible]
[illegible] intestinali: idem ex fistulâ ani [illegible] ad fistulam [illegible] [illegible]
[illegible] est [illegible] in aq: ebullit: [illegible]
[illegible]

Colliquamentum, the bread of the Egg.
Nitrum: constant partibus omnib: et volat: salinis. Sic oliam Lumbrici.
Terebi: cocta, est terebi: ebullita in aq: usque dum omnis ejus humiditas absorbeatur, et ita crassescat ut in pil: formari possit.
Spongia præparata fit immersione spongiarum in empl: molli: liquefacto, et subjectione [illegible] ut formetur.

Sal purgans artificialis quomodo et unde fit. p. 40.
Aq. Medicata artific. p. 54.

[illegible] propria est [illegible] ex dis[illegible] Terebi: & Terebi. tam diu cocta ut instar vitri pel-lucidi fragilis contundi possit. Bat. Pot. 28. n. 3.

[illegible] ex [illegible]

[illegible]

Cap: 1. Causæ doloris sunt 1. fibrarum transversarum nimia distentio à materia fibras longitud: interstitia occupante. 2. materiæ acrimonia. 3. pororum nimia [illegible], [illegible] sanguine & humore [illegible] in pororum [illegible] ad [illegible] illorum quantitate [illegible] impetu [illegible] calida [illegible]: si autem dimidium capitis occupet, Hemicrania dicitur, si paulum tantum unam partem occupet & clavi instar capiti infigat, Clavo dicitur, debet humori acri in loco particulari deposito. —— Dolor [illegible] pathice [illegible] [illegible] ab impetuositate sanguinis [illegible]. —— si urina sit rubicunda, ut et facies, morbus hic ab impetuositate sanguinis [illegible] [illegible] comitatur, [illegible]; si autem urina et facies pallida, ab obstructione [illegible] comitatur, [illegible] frigidam [illegible] causâ frigidâ procedit. Doloris cephal. calidam [illegible] comitatur, [illegible] particularem [illegible] hemicraniæ aut clavi. Cephal. cal: originem ducit à sang: impetuos: [illegible] à materia calidâ & acri. —— Dolor [illegible] pungens, scindens, gravativus & distensivus. [illegible] pungens à materia acri et salinâ, scindens ab acida, gravativus à crassa & [illegible] activâ. Distensivus à flatibus procedit. Dolor pungens & scindens vix distingui [illegible] [illegible] dolore in quo si [illegible] sint viridia, & odoris [illegible], ut [illegible] aut [illegible] [illegible] & austeri, procedit ab acido, sin aliter ab acri. —— Rationes V.S. [illegible] quantitatis diminutionem, quæ aliquo auget, aliquo minuit [illegible] motus [illegible] quantitatem minuit motus [illegible]. [illegible] si enim peccat sang: impetuositate, minuendo quantitatem [illegible] non [illegible] collapsui unde etiam venis [illegible] facultas [illegible] [illegible] ulterior materiæ dolorem causantis depositio [illegible] [illegible] in partem aliquam depositam [illegible] [illegible] transpirationem [illegible] impeditationem non [illegible] V.S. [illegible] quidam [illegible] non [illegible] modo inflammationis [illegible] V.S. [illegible] & plethoram in quo [illegible] venas. Si vero sang: crassitie peccat [illegible] motus sang: [illegible] V.S. [illegible] contrahere non [illegible] fibras [illegible] actionem [illegible] contractivam; [illegible] sang: [illegible] motus auget [illegible] aut [illegible] [illegible] distensionem nimiam [illegible] V.S. —— In [illegible] à Scholasticis [illegible] V.S. in superioribus [illegible] aut ab impetuositate sang: [illegible] V.S. in superioribus [illegible] ex inferioribus [illegible] aut à sang: crasso et [illegible] in dolore gravativo, aut à sang: crasso [illegible] inferiora [illegible] V.S. in [illegible] enim [illegible] sang: [illegible] —— Vesicat: & Cucurbit: in hoc morbo sunt [illegible] superiora [illegible] V.S.

Operatio V.S.

Operatio Vesicat: & Cucurbit:

[illegible] remedia intercipientia non vero attrahentia; [illegible] enim tantum sunt [illegible] [illegible] humoribus [illegible] sang: advectis, non autem humorem [illegible] attractivam [illegible] ad [illegible] aquarum et fluxus lateralis torrenti & impetuoso fluminis [illegible] in aliis corporis partibus, ut v.g. in [illegible] non vero ita omnimodo [illegible] in [illegible] [illegible] humori [illegible] parte in [illegible] [illegible] lancinando humorem doloris causam ad se attrahere [illegible] aperiendo & fibrillas lancinando humorem doloris causam ad se attrahere [illegible] [illegible] seu [illegible] [illegible] finem [illegible] ad [illegible] partem [illegible]; non [illegible] vero in hoc casu, ut in præcedenti, materiam intercipit aut divertit. —— In [illegible] capitis remedia interna [illegible]; externa [illegible] sunt [illegible] [illegible] ut [illegible] Urin: [illegible] albumine ovi [illegible] et [illegible]; idem [illegible] [illegible] de Clavo & Hemicranio [illegible] cap. 2. —— [illegible] Vesicat: à [illegible] [illegible] in [illegible] calidâ & inflammationibus reprobari, eo quod augmentant [illegible] [illegible] humore acri dolorem causante [illegible] dolorem [illegible] [illegible] [illegible] et coagulationibus omnibus sang: [illegible] —— Purgatio & Clyst: laxans in hoc [illegible] [illegible] undique [illegible]. Eodem modo Anodyna.

[illegible]

6. 4. Sal deoppilat; operat; et calore suo dissipando humorem crassum, et mām alcalica absorbendo. 2 Purg: et Apozema, attenuando, subtilitate, et à corpore eductione operant;. 3 Hissopica, subtilitate, dissipatione, et attenuatione cephalica enim sunt. — Dolor capitis à causâ frigidâ raro in apopl: transit, et omne qd sit dolor, signum est acrimoniæ, acrimonia autem crassitiei et viscidi: opposita est.

ad deopp. oper: alia.

Cap. 3. Apopl: pituitosa gradatim invadit, et non sine signis gravijs, nim: somnolentiâ, seu continuâ ad somnum inclinatione, per tempus aliqd ante invasionem. At apopl: sang: subitanea est: ut et apopl: abscessu rupto. Instantia. Generosus quidam ..... Perth; accepit casu de equo, humi jacebat pronus et exanimis, at paulò post convaluit, nullaque instituta fuit operatio. Quatuor, 5, aut 6 mensibus post cadens venatus ibat apud Glasdunum. ibique circiter horam 4 aut 5 tam pomeridianam, reversus morbo correptus est (mane enim ex ædibus suis egressus est, et ad eam usque horam bene se habebat) primo comate, deinde carus, demum apoplexia, eadem nocte ad superos migravit. Eo defuncto caput aperuerunt medici (inter quos erat D. Glenc. qui mihi historiam retulit) et alque in ventriculis cerebri conspiciendi se obtulit pus ventriculos utrosque replens. qd à ulcere, in cerebri substantiâ solidâ existente, rupto, in eos effluxerat, atque de minori ad majorem apopl: gradus patientem affixerat, et gradatim in ventric: influens. Nott. Hanc instantiam ... demonstrare probare, et ventric: cerebri esse sp: promptuaria, et nervorum orificia in ventric: sita, seu ad eas usque se extendere. — In apopl: ut certiores fiant medici an patientes revera sint mortui necne, pulsus tangunt, calidus recipiunt, respirationis musculos attendunt, et his nihil certiores facti, vel aquâ ... abdomini ..., speculum ori admovent, plumarum lanuginem ori et naribus approximant, et ... signum est ... injectio. ✠ Instil: ....

Vincula dolorifica operantur eodem modo ut videtur in fasciculo virgarum unâ extremitate arcte ligato, unde altera extremitas expanditur, et virgæ à femalio recedunt. Ita ... fibri in nervis à vinculo dolorifico. unde in extremitate in cerebro ... expandit, mām pituitosam, apopl: causam, dividunt.

Vincul: dolorific: operatio.

Cap. 4. .... in lethargo ab acrimonia mām viscidæ conjunctâ. ortus ducit. Quod autem lethargus sit morbus somno et febre comitatus accidere possit, ab observ: demonstratum, ut in praxi videre est.

C. 5. Paralysis ortus debet mām crassæ et viscidæ simpliciter absque acrimoniâ conjunctæ. ... ... internam in nervorum poris ... ... compressionem externam; concipere enim non potest quomodo sp: ... nervorum ... ..., aut mām crassior in eis, gracilitas eis sit, ingredi potest. Verum Glenc. ... admittit; ... in ... seu liquorem nervorum ... hunc liquorem inspissari à certâ aliquâ causâ et incrassare posse. — 1. Clyster operat; nervorum et intestinorum irritatione. 2. Vomit. corporis concussione (quamobrem ubi etiam potest ...) ... ille mām divulsione in loco quo peccat. 3. Purg. irritatione agit ... ... in hoc casu apopl. ✠ obs. ... ad ... 5. Inunctiones irritant et ... diluant, atque ad origines nervorum ad partem affectam ducentes, fieri debent, v. g. in brachij paral. inungat; cervix; in femoris, lumbi, &c.

operationes medicorum

Cap. 6. In catalepsi ... sp: obstruit: aut ... Aliquis in corpore descendens ... ... determinationis ... ad motus arbitrarios. à mā crassâ ... ... immobilem reddente. Respiratio et ... remanent ✠ quia ... ... nervorum ... partes his usibus inservientes ducentes patentiora sunt, spiritusque in eas ... determinatione ... ✠ quia partes hæ nervos, et sic sp: aliunde quam à ... recipiunt, nim. à cerebello et medulla spinali, Consulant; Anatomici. ✠ praxin de apopl. ubi alia additur ratio, viz. quia musculi in quos nervi tendunt ... ...

Cap: - Epilep: oritr à viscidilate acrimonia maximâ conjunctâ, unde partr nervaeæ atqz musculosæ valdè convelluntr. — Ophistotonos ex musculi cervicis robortr trahuntr et convelluntr. Emprosthotonos est continua convulsio musculorum cervicis et aliarum partium anterioris, ita ut mentr thoraci incumbat, et nates aut genua ad abdomen sæpe trahuntr. Tetanos est contractio continua quâ membrum aliqd rigidr et inflexile evadit; tendines etiam dorsi aliqdo contrahuntr in formam globularem, qui ob affluxm humorum in eos coptr, vertebras è loco dimovent, gibbumqz formant, vel saltem proclinationem et flectionem dorsi causant. — Epilep: aliqdo tantr sympathica est, et symptoma tantr alterius morbi; quo curato evanescit ea. Sic semper sperandr est Infantum Epilepsiæ à vermibus oriri, punctione enim rostrorum nervos lancinant et musc. hincqz convulsiones excitant: ipsiqz exhibentr vermifuga, quibus nil proficientibus. Epilep: Idiopathicam esse concludendr est. Oritr etiam in virginibus et fœminis à mentium suppressione, ut in exemplo à Regio attacto atqz in hoc casu Emenagoga exhibeantr. Si virgines eâ corripiuntr ante debitum tempus fluxûs menstrui, sperandr est eam cessare menstrua nõ facta. — Convulsio in virginibus et fœminis Hysterica affectio nuncupatr. ob nomina eorum et sonum horribilem. — Vapores (acres) aliqdo sentiuntr à caviate abdominis, a pedibus quandoqz, aliisqz corporis partibus ad cerebrum ascendentes, qui ex principia nervorum adoriuntr et lancinant, Epilep: causant per sp: distributionem irregularem. — Stertor provenit ab expressâ viscositate circa fauces et nati radicem, et à compressione et convulsione laryngis à musculorum, et consequenter glandium præcipue circa os. compressione, et symptoma in Apopl. non apparet, cui nervi tantr, non verò musc. et glandula aggrediuntr. Stridor dentium in infantibus vermibus laborantibus est particularis convulsio musculorum maxillarum et nervorum dentium, à lancinatione lumbricorum rostrorum in intestinis vel stomacho exta; quem stridorem nulla ars imitari potest. Pollices in manibus tenere, quia pollex musc. largo propius gaudet, digiti verò eodem tantr habent musculm: et nott: est pueros ordinariò pollices in manibus tenentes Epilepsiæ, vermes et anxios plerumqz esse. Et vomitr adest in initio paroxismi, si sperandr est morbi fomitem in ventriculo esse, eoqz vomitorio curari. vide lib. 3. s. 4. c. 7.

Cura difficilis est ob contrarietatem causæ, viscidilatis nim. et acrimoniæ, ut et etiam ob nostram ignorantiam loci et habitus in quo mãa vapores viscidos acresqz emittens, morbumqz causans, latet. morbus ordinario ad plenilunium invadit ob demissionem aeris, hujusqz commotionem in corpora nostra. — Medta sunt plurimqz volat. saltem quæ in 3a. recensentr (vulgo pulv: comit: et de guttet. quæ volat. et alcalica) quia viscidilas magis considerenda quam acredo, nõâ enim dissolutâ circulationem subit. eoqz acredinem amittit. sic vo pavon. volat et alcalic. vulv: fracui: volat. sulv: sum sic. volat. et emolliens. Quidã hunc morbum aggrediuntr solis emollientibus, et ex hauste.

Cap: 8. Palpitationi plerumqz vertiginosi, atqz cordialia et stomachica liberant à sequenti morbi paroxismo, nisi eandem paulò post reddit, posè nim. actionem cordialis aut stomachici actionem similem.

Cura fit medtis cordial: et stomach: mistis (pulv: rad: Zedoar: specificr.) ut cordial: superantr spiritusqz crassities, nervosqz, ipsiqz liber concedatr ingressus in nervorum tubulos.

Cap: 9. Phrenitis rarò accidit, nobisqz ignota est ut morbus Idiopathicus, tantumqz cognoscitr ut symptoma febris, febris verò non est symptoma phrenitidis: nam — mania, quæ etiam delirium est, feb: non comitatr. — Urina in phrenitide est pallida et aliqdo aquea, urina feb: natam; unde urina pallida in feb: delirium instantem significat, aut saltem brevi prognosticat.

Margin (beside opening lines):

v. 3p. de his.

Oritr: viscositate acrio musc. irritat convulsionem et Epilept: constituit; acrimonia enim nervos et membranas vellicans convulsionem, viscositas insensibilitatem causat.

Cura fit sang: motu et salsedinem cohibendo. — Sp: nitri et [illegible]is sunt soli Sp: acidi interne exhibendi, reliqui nimis corrosivi sunt. Sal prunell: opt. interne dandus.

Mania vel oritur à corpore vel à mente. De maniâ à corpore vide[illegible] ducendo ex Praxin. Mania à mente, ordinariò originem ducit à cogitatione vin: dictâ ut in exemplo Regij, quæ cogitatio impressionem certam in cerebro à Sp: factam relinquunt, Spiritusq; motus ut et sang: accelerat, hiq; Sp: cur: sus cum sang: ad cerebrum provenientes, priorem cogitationem renovant, imo et corroborant, quoties ad cerebrum redeunt, et hinc maniam causant. Quædam tamen sunt corp: constitutiones, ut melancholica, quæ maniam non admittunt; supponendus est ergò corp: constitutionem habilem esse ad hunc morbum alendum et fovendum, [illegible] passion: [illegible] à fermento ex certo loco. Et si: [illegible] passionum, [illegible] mobili[illegible] [illegible] ira ex officientibus, etc.

Cura. [illegible] tardissima in hoc morbo et plenitudo, in nullo alio aeque larga, nisi forte in [illegible]. — [illegible] Lutum cæruleum cum aceto ad mammarum inflam: opt. [illegible] et ad lac repellendum. [illegible] specifica in Maniâ et Melanch: Helleb: alb: ad g. [illegible] dos: potentiss: Helleb: nigr ad ʒß non tam valens.

Melanch: item oritur vel à mente, ut in exemplo Regij, vel à corp: ut in fæminis à mensibus suppressis, etc. —— Purg: laxans hic et in maniâ adhibenda, non verò fortis et irritans, quia fæces ab irritatione intestinorum dejici non possunt, (ita sunt indurata) adeoq; in attenuent. fluidaq; reddantur, qd facit purg: laxans. — [illegible] Cortic: Cappar: et Tamarisc: soli attenuantes et aperientes. — [illegible] tertiò purg: irritans in maniâ non adhibenda, ne et motus sang: augeatur.

Cap: 10. provenit ab eadem causâ, ut Repetitio lectionum a pueris in somno, pro qua [illegible]. —— Mulier post puerperium nunquam in lecto ante elapsos ab eo [illegible] dies.

Cura. [illegible] vomit: purg: [illegible] et vapulatio, timor, etc. unde conjuncta cogitatio vapulationis aut timoris excitata cum cogitatione ambulationis de nocte, morbum [illegible] sine cogitationes in suâ naturâ diversissimæ. Ut in canibus præsente [illegible] aut ave statim incedit instinctus eos sequendi, at vapulatione, timore, et usu, animalibus illis præsentibus aut excitatis, subsidunt.

Cap: 11 [illegible] ut in praxi.

Cap: 12 [illegible] hi morbi à materiâ pituitosâ et acri oriuntur, cujus depositio in aliqua corporis partem inflam: et obstruct: causat. — Frequentiores sunt catarrhi seu defluxiones in locis minimi motus, seu magis à centro motus distantibus, et præcipuè circa fauces, (quia ibi tota seri emunctoria insunt) ac specialim [illegible] ob laxiuram delicatiorem, ut et in languidis et morbosis. — Omnia signa et symptomata Catar: calidi oriuntur à salsedine et acredine humoris, [illegible] urina rubicunda oriri etiam poterit à motu sang: [illegible] exaltante. — In Catarrh: [illegible] qd antea cum sang: circulabatur, nunc ab eodem præcipitatur et secernitur, et præcipuè circa fauces, ob [illegible] allatam.

Curæ 1. aggredit. effectus præcipitationis, viz. acrimonia seri à stagnatione [illegible] ad eam involvendam. 2. obstruct: [illegible] causa, adeoq; calidis ad[illegible], ut lympha circulatio cum sang: continuetur, ac obstruct: solvantur.

[illegible]: [illegible] vidit dentem excorticatum, ut ita dicam, seu superficie [illegible] privatam, cujus pars interior [illegible] spongiosa erat, [illegible] minimam impressionem sufferre [illegible] patiens, [illegible] illius [illegible] afficiebatur, unde concludit [illegible] Dom. [illegible] dentes spongiosos esse

mamarum inflam: et lactis repulsio.

Cort: attenuante.

internè, atq nervorum ramificationes recipere non tantum in radice, verum etiam per totam internam seu spongiosam partem. Addit etiam verissime esse, imò certum, partem politam et externam poris minimis et angustis dotari et praeditam esse. (Hinc facilior solutio cur acerba dentes obtundunt, et calor eos restituunt, &c)

Causticum auris quomodo operatur.

Cura. Caustica auri multum operatur corrugatione et contractione nervi et partium vicinarum, unde spiritus fluxus liber et solutus non conceditur, sensusque inde aufertur; sentit autem rursus recuperatur fluxione seu actione spirituum in nervum, unde patulens redditur et elongatur, ut fit in valorum elongatione in vulneribus.

Gingivarum haemorrhag: seu ad eam talis inclinatio ut tangi non possunt absque sanguinis effusione, est signum pathognomonicum, seu sine quo non, scorbuti; igitur praeter remedia externa, Antiscorbutica internè exhibenda.

Catarrh: frigidus. Lassitudo est signum [illegible] et [illegible]: [illegible], non partis in certa aliqua parte tantum. accidit praecipuè in Articulis, qui molo seri crassi per poros minimos et strictos cartilaginis difficilis perficitur quam per patulos musculorum. Asthma fit à collectione ejusdem seri in bronchia depositi. Diarrhaea à depositione ejusdem in intestina, ut et secretione à gland: eorundem.

Vomit: operatio.

Cura. Vomitoria, 1. ut totum corpus [illegible] [illegible] succutiatur, et mata latitans ex loco detrudatur. 2. [illegible] stomacho cruditates, et indigestione, per magnam pituitam in istis deposita [illegible] [illegible] sang: communicet. 3. ut [illegible] lactens in stomacho crudum [illegible] [illegible], sicut sang: non communicetur. — 4to. suffitus operatur gland: corroborante et constringente ut ulterius serum non recipiant, aut majorem quantitatem [illegible] [illegible] non admittant. 5to. [illegible] &c. Haec sunt [illegible]. Sola cura perficitur spirmantibus et [illegible].

Cap. 13. Causa inflam: sunt et sang: impetuositas et sang: acredo in partem deposita.

Inflam. in [illegible]
Cura, fit. Diminutione quantitatis sang. per purg: laxantes tantum; si enim sit irritans inflam: augeat. 3. Refrigerantibus internè ut impetuositas cohibeatur et acredo involvatur, et Emulsion: &c. 4. Crassis simpliciter, atque crassis et [illegible] externè, ut [illegible], portulacâ; cerato et [illegible] defensivo, &c per eam [illegible] humorum.

In ophthalm: [illegible] seu Spuriâ non [illegible] signa ophthalm. verae, in Praxi [illegible] contrà, atque in eâ Refrigerant: parum et nihil conducunt, in eâ enim attenuantia et incidentia tantum probant, quia mata causans viscosa est. — [illegible] [illegible] &c. utuntur tantum in [illegible] seu spuriâ, non in ophthalm. verâ, quia attenuant. [illegible] [illegible] in ophthal. verâ cum magnâ acredine, quia [illegible] est glutinans; non verò in spuriâ.

Operatio Alum: Sach: Saturn.

Cap. 14. Alumen [illegible] est acido-austerum, et [illegible] optimè in inflam. aciditate sali opponuntur, austeritate poros constringunt. Sach: Sat. operatur aciditate, et partium mollitie.

Cap: 15. attendendum an [illegible] sint in ipsâ corneâ [illegible], tum enim incurabiles sunt, et an [illegible] aut alteri oculi parti tantum supincumbant.

Cura. Inflam: non tam attendenda, sed macula [illegible] omnibus modis. [illegible] operatur scabritie et volat: 5to. operatur scabritie et pungentia. 6to. [illegible] operatur Corrosione.

Cap. 16. [illegible]. 5to, 6to. Haec media non operantur transitione partium per poros corneae, (adeò enim stricto esse [illegible] ut radijs luminis solis ingressus admittant, et [illegible] [illegible] esse [illegible], [illegible] partium crassarum et terrestrium ingressu perturbentur visus) sed tantum irritatione valorum externorum, unde in eorum [illegible] [illegible] [illegible] qui ad mata [illegible] obstructionem et solutionem (cooling) prodesse [illegible].
— Gutta serena [illegible], quia oculo eo malo affecto [illegible] [illegible].

~~Cap. 22. [illegible]. Haemorrh. naris in febr: sistenda non est nisi sit magna: [illegible] si ab acrimoniâ procedat, refrenanda est acrim. [illegible], ut aq. frigida, [illegible] cum sal: prun. et longo usu amygdulat. seu [illegible] cum [illegible]:~~

...za nigra in oppositione alterio. Cura, vomit. ut deuliat corpq. Purg: validâ, i. stimulatione et irritatione nervorum maa hasitans succulentiq. attenuant. ut millep. et Cephalicis.

Cap: 18. Inflammatio à causâ internâ nisi discutiat intra 6 aut 7 dies, oportet ut omnibq modis maturetq, ut ad suppurationem veniat. — Nott:

Cap: 19. Cura. Urtica, ut q.s. puro: te Pll. clavis exterius, emollientia, ut malva, althæa, &c & varq Dec: et glutinant: ut Sem: psyll: gr Tragac: arab: &c

Cap. 23. Vomitoria non exhibenda in morbis pectoris, ne fiant Anastomosis, hinc Hæmoptoë, et affectionem et mollitiem ob tempores vasorum. — Hæmorrh: nari: in febr: sistenda non est nisi sit magna. — Si ab acrimoniâ procedat, refrenanda est acrim: refrigerantibq, ut aq: frigida potu et sal: prun: et longo usu amygdalat: seu Emuls: et sal: prun: Interim Hæmorrh: sistenda externè insufflatione (naribus) pulv: astring: ut Crep: Lupi (non qd in se sit magis astring: qm alii pulv: in hunc effectum usurpati, sed qd sit maxè volatilis, et facilis locum affectum petat. Naribq etiam intrudatq linteum ustum (Zunder) aceto imbutum. Aceto etiam vel et sim: dorso, collo, fronti, testibq, &c applicanda. — Pulv: Cinam: et Stomach: firmantia non verò astringentia: maxè prosunt mulieribus nimio mensium fluxu laborantibq, proficiunt etiam hinc in aliis hæmorrhagiis. — Pulv: Helvetica novum et optimum remedium. — Crassa simpliciter, ut succus Sedi, plantag: &c, mista cum acido-austeris, ad prædicta fortiq infigenda, ut alumine &c. Opii in hunc usum medela. — Anastomosis est nimia pororum lateralium vasorum apertio. Diapedesis extremitatum vasorum à sang: quantitate apertio: sed hæc fieri non potest cum sit vasorum continuitas. Diabrosis vasorum à sang: acredine apertio. Rexis est ruptio fibrarum vasorum.

Cap. 24. Omnes pustulæ in quacunque corporis parte, lividi aut nigricantis coloris, periculosæ sunt, econtrà albicantes & rubicundæ. — Nott.

Cap. 25. Relaxatur vel à pituitâ, vaga nisi & in linidâ, in quâ uvula albicans & livida, quæ ordinariè est symptoma et concomitans frigoris suscepti; vel à pituitâ aut sang: acri, & tum dolore et inflam: comitatq.

Cura illius nisi sit 1. puro. 2. Inflatione calidorum et fortium, ut pulv: pyreth: piper: sinap: &c — In inflam: cura sit astring. et gargarismatis astring: et refrigerantibq; item q.s. in raninis et Jugularibq.

Liber 2.

Cap: 1. Inflammationes differunt respectu humorum et partium affectarum. Humores vel sunt acres, et dolorem causant, vel pituitosi, et dolore vacui. Partes affectæ vel sunt externæ, et hæ cartilaginosæ, ubi dolor intensissimus, vel carnosæ, ubi dolor nec intensus nec adeò periculosa; vel internæ, quæ quo magis accedunt ad viscera, eo periculosiores, ut in pleurit: peripneumoni &c vel quo magis consequentibq malis attenduntur, ut in Anginâ quæ respirationem atque deglutitionem impedit. — Angina vera cum musculi Laryngis proprii afficiuntur, et cum humor acer est & inflam: excitat: spuria verò cum humor est pituitosus, nullo dolore comitatq, vel cum musc. Laryngis com. & cervicis tantum afficiuntur. — Pleuritis vera & notha eodem modo et cum sine dolore ut etiam peripneum: vera et spuria. — Pleurit: semper cum peripneum: — Biol:

omni:

Pleurit: dignoscit à simplici laterisq dolore p febr, quo ex aco: bacy pleurit & multiplex simplex dolor: Item lactus quo non afficit pleurit: sed exacerbat externus dolor Hipp. Rust. Pulsus etiam durit et Basl:

Acidus quid?

comitat ob contiguitatem et adhaesionem membranarum pleurae et pulmonum partes enim inflammatae contigua semper adhaerent ex transudationem sed ac extimis capillaribus. Expectoratio sang: per puris in pleuritibus certum est signum conflationis pulmonum cum pleura. —— Acidus est acidus scindens et pungens: ... etiam: quapropter liquori moventi (adeoque sanguini) acidus miscere non potest; molo enim abradendo latera scindentia et mucronis pungentis dissolvit acidus. Eam ob causam syr: acidos igni non imponimus: calor enim motum conciliat et molem acidi destructionem.

Cura anginae fit Dec: Rubi vulg: et Catapl: ex eodem externe, decocto defens. sal: decrepit: et Emoll: ut ol: Lumbric: lil: alb: &c: per Emoll: ex volat: ut flor: Sambuci. pro Ol: per gravius et Calidam & Curam ... humores in margine. Ung: plantag: externe et interne.

In pleurit: respiratio difficilis, non quod pulmones afficiantur, sed quia non est spatium ad actionem pulmonum requisitum, et etiam quia patiens metuit pleuram inflammatam laedere respiratione valida. — Pleuritis ea periculosior quae externe & tactui non dolet, sed tantum interne; quae vero externe dolet, mitior. Decumbit in latus affectum facilior ob adhaesionem pulmonum cum pleura; unde si in latus non affectum decumberet patiens, fieret laceratio, per tensio saltem partis inflammatae.

Cura externe fit inunctione Ung: de alth: Ung: digital: et iisdem Catapl: ac in Angina. —— 2do. Stercora omnia et specialiter haec, Emoll: & volat: & contemperant anodyna tensionem relaxando, et deobstruentia. — Sudorifica mitia, seu Emoll: ex volat: quae modica in inflam: fortia vero, quia et maximam volat: nimis pungunt & dolorem augent, non conveniunt. ... est per in P. Balt: et spt. — Glne: nobis narravit quendam solo haustu Ol: Lini (quod emoll: & volat: est) post omnia alia frustra adhibita, curatum fuisse. — Si omnia haec media frustra adhibeantur, promovenda est suppuratio, omnes enim inflam: nisi intra ... ... evanescant, suppurandae sunt; haustibus Ol: Butyr: &c interne, ut et externe commodis; atque suppuratio per expuitionem appareat, caveas à ... aliisque evacuationibus, eo quod suppurationem impediunt supprimuntque.

per tussit:

Cap: 2. Haemoptoe aliquod symptoma, ut in feb: pleurit: peripneum: ... vero est cum nullo alio morbo afficitur corpus. —— Sanguis sane: si cum tussi ac floridus et spumosus sit, procedit à pulmonibus; si cum vomitu et nigricans sit, à stomacho; si cum screatu (Angl: hawking) à radicibus nasi &c.

In ulceribus omnibus internis in quacunque parte Balt: Lucal: et Balt: ... sola spt. Glne:

Cap: 3. Phthisis (à πτυω spuo) cum sputo, et tabes non semper; et omnis Phthisis est tabes, sed omnis tabes non Phthisis. —— Tabes triplex genere 1. Vera, quae sita est in pulmonibus, et expuitione comitatur. 2. Notha, quae provenit ab exulceratione hepatis, lienis, et alterius partis interioris; per ab ulce in profundis (calcitis, fistulosis, aliisque etiam. Hectica dict.) in aliis partibus exterioribus: pus enim in iis ob profunditatem mis... cum sang: in venis proximis: sed si ulcera sint in externis partibus corporis et superficialia, ... signum est patientem tabe non laborare: vires enim habet sufficientes ad expellendam materiam unde tabes oriri possit. 3. Tabes provenit à frigore statim, quomodo cumque demum modo, contracto post inebriationem, et sim. unde oritur habitatio et obstructio partium sang: Atque omnia alia genera pertinent ad haec tria referri. — Tabes & feb. Hectica à feb: intermittente (Ague) differunt in eo quod tremor in feb: intermitt: frigore comitatur,

calor

... vero maximo in Habe: et etiam in eo qd in Habe: fit tanty pulsus Remissio, in febre Intermissio. ✠ ad Cap: 3. lib: 5.

Cap: 4. Asthma ✠ est Intermittens, & ij paroxysmos tanty invadens, ✠ est Continuy. — Asthma ✠ est symptoma tanty, ut in pleurit: peripneum: Angina. Phthisi, seu ulcere pulmonis, Empyemate, &c quory oiy facilis est explicatio respectu ad hoc symptoma; ✠ est morbg, cy scil: indigestiones pravæ sunt, indigestamqz mam sang: suppeditant. quâ bronchia replenty

Cura perficity expectorantibg. digestionem promoventibg, et viscditatem ejqz crassitiem attenuantibg. Capa alta & alliy tosty opt sunt remedia, lubricant enim et attenuant. — vomit: evacuat mam indigestam et peccantem, adeoqz impedit ne sang: communicety. — 5to. Hac Asthma potiq præveniunt qm removent. — 9o. Remedy hoc multy hodie commendaty.

Causa ijma ... multory &c vulgo apud nos dicity the Cronp, et tener fere infantes aggreditz: subito invadit, et spatio 3 dies mortem infert. pro Cura. statim in initio vomendy est. Antiepilept: hic opt: pectoralia nihil prosunt. ... cephal: p mod Cataps: applicenty calidibg, pectori, abdomini, &c. ... venel: cy aq. antiepil. pro Epithemate.

Asthma intermittens, generaliq est, non periodicq, et periculosq est. Invadit ablqz ullâ præviâ cognitâ causâ. vere scil: et autumno; primo lene est, ... continuo capit ad 3 ✠ 4 diem, & patiens mam crassam ✠ 3 aut 4 ... exuit. et à morbo liberaty, & ordinariy tempq, ver sc. aut autumnus recurrit. Eisdem curaty ac alia asthmata; sed opt methodq est ✠.G. instituere vomit: et purg: exhibere aliquot dies ante solity tempq invasionis. quâ methodo plurimi ab eo liberati sunt. si autem non præveniaty, remediaqz negligenty utqz dy invadaty semper recurret, experientiâ teste:

[margin:] Haec duo asthmat: genera ... negligenty

Cap: 5. ... venel: fontanelle, vesicat: et hirudines ... vulgaria sunt hujq morbi remedia. Capa et alliy alta multy prosunt, lubricant enim & attenuant. — In hoc ut in aliis convulsionq generibg consideranda sunt stagnatio et acrimonia mæ. vomit: exhibenty pro stagnatione, et alcalica ad acrimoniam irretiendam. — 4to. alcaliq, viscditate irretiat acrimoniam. — 8vo. Hyssopq antiepilept: est, alqz attenuans, non emolliens.

Cap. 7. Melancholici præcipitatione cordis maxe affecti, et sang: crassitiem. — Oia alcalica et salina vermes necant. ideoqz prosunt si morbq ab iis ortq duxerit. — 2g. præcipue valet contra difficultatem respirationis, quæ symptoma est hujq morbi, non adversq morby ipsy aut ejq causas.

Cap: 8. In mortuis nullq est sang: in arterijs, nisi capillaribg, adeo ut hæ intumescentes (ingressq enim in venas seu vasa revehentia sanguini non daty) prorumpunt, ✠ pori pateli redduny, ✠ sang: in iis contenty p carnem transudat, præsertim in locis cavitates respicientibg; et inde est Hæmorrhagia Naris et oris in jam mortuis. ✠ annot: ad cap: 7. lib. 5. de feb: malignis. & Institut: § 91.

Lib: 3. Sect: 1.

Cap: 1. Stomachica sunt variis subtilibg firmis intricaty. — Obstructiones sunt in Hepate frequentiores. 1. Quia Hepar non musculosq. 2. Quia sang: tanty venos

[margin:] Stomachicy.

venosio et crassiori, non arterioso, aliq. ℞ lib: 3. ʒ. 3. c. 3. in observ:

Saliva quâ saliva, seu saliva omnis generis, cib: in ventric: comminutionem non adjuvat, sed tantum ea quæ à sang: benè constituto et misto secernitur; non verò quæ à sang: turbata mixturâ, viscoso, torpido, ℞ alio malè affecto separatur; qualis enim est sanguis, tales seu ejusdem naturæ sunt secretiones ab eo. — Calor etiam per se digestionem non promovet, sed aliquando è contrà, ut in fod: et carnibus igne aucto coctis apparet; sed tantum moderatus et lentus. — Nimia tunicæ musculosæ ventric: instar corij tosti, ariditas, aut nimia fibrarum ejus laxitas, à quacunque causâ procedat, contractiones ipsius impediunt.

Fulcr: quid: Cap: 1. Vulgaris apud nos morbus est. — saccharum et alia dulcia ex partib: salinis et oleosis mistis constant. Vinum etiam ex ijsdem. — quod est ut quæ in acida cōvertuntur ex partib: salinis constant; ideoque sp: vini non acescit, quia est tantum ol: exaltatum.

Cura: sang: motus restituendus, viscositas attenuanda, pori deobstruendi, et stomachus roborandus.

Cap: 2. Rarus apud nos existit morbus, et jejunis ob modestiam — invadit ℞ ab ingurgitatione nimiâ calidorum, ℞ à conversione cholera morbi, et depositionem bilis in stomacho, verò fere et autumno, ℞ criticè accidens; paroxysmi breves sunt sed periculosi.

Cap: 6. Diuturnus vomitus provenit ordinario à cruditate ventric: ac iis, ℞ à nidorosâ, quare hæc prius curanda. Authores etiam tradunt eum oriri saepe debere inflammationi ventric: qd facilè dignoscitur à dolore statim excitato ab ingestione cibi; ℞ inflammationi hepatis, dolore lateris ad mollitionem et ab ingestione cibi; ℞ inflammationi nimiæ cartilag: Xiphoidis, quâ premitur œsophagus seu orificium stomachi superius. — Febris lenta procedit ordinario ab ulceribus internis, et si in eâ stomachus vehementer afficiatur, in ea

Nott: nario ab ulceribus internis, et si in eâ stomachus vehementer afficiatur, in oz. causa est uicus certum est, præcipuè si adsit vomitus et urina cruda — Causa vomitus diuturni cibi non intra ventric: sed inter ejus tunicas haeret. Cura ejus fit urtibus, præcipuè vomit: ad concussionem ulceris sit cicorum mollis, ut ejus fit urtibus, præcipuè vomit: — In vomitu sang: cura fit ijsdem ac Hæmoptoe — Chopanis ex lacte. — In vomitu sang: cura fit ijsdem ac Hæmoptoe, et vomitus biliosi curantur vomit: aliisque urtibus, item pacificis, ut Laud: amygdal: Emuls: &c. — vomitus atræ bilis, seu mat. crassæ ex filamentis nigris in eâ natantibus, quæ non aliud est qm sang: ex vasis capillaribus ruptis exsultans et in ventric: coagulatus vomit: curatur et pacificis. — 6 ed. alic est vomitus criticus, ut in Cholerâ, vere et autumno. Vannol. ad c. 3. h. 2 c. 5.

Cap: 8vum. Nunqm visus est alcalicis, ut gesso, pacilli, cineribus &c. à picâ laborantibus comesta, ijs non alios tantum videtur Pica esse appetitus naturalis ad ea quæ morbo suo, ex acido causato, opponuntur. Ergò definitio Pitcarnij non admittenda. — maxima est mutatio constitutionis gravidarum à non gravidis, ut videre est in salmonibus et alijs &c. — Cura fit vomit: et alcalicis.

Cap. 9. Sitis ℞ naturalis ℞ præternaturalis. Naturalis à defectu humiditatis, quæ facilè suppleri potest potu. — aqua tantum propriè humida; alij liquores ut vinum, cerevis: &c. non tam humidi qm humectantes, quia spirituosi: et humid: constat

Sitis præternaturalis non à defectu humiditatis, sed ℞ à lymphæ depositione in

in cavitate aliquâ corporis, ut in Hydrope in abdomine; ✝ à viscositate ductus salivales obstruente, quæ aq: potu non curatur, sed spirituosis et penetrantibus, ut sp: vini, sal: prun: &c. ✝ praxin. — Sitis sed. in œsophago et orificio superiori ventric: oriturque ✝ ab ariditate fibrarum, ✝ titillatione seu irritatione nervorum ejus. Causæ sunt 1. Deperditio liquiditatis in siti naturali. 2. In præternaturali sang: molis aucta, ut in feb: unde arescunt fibræ destitutæ humiditate, nervique irritantur exaltatione salis. 3. Ingurgitatio calidorum, tostorum, & salinorum, sive potuum sive ciborum, unde molis sang: aucta, fibrarum arefactio, nervorum titillatio. 4. Hydrops. 5. Gland: et ductuum salival: obstructio; saliva enim opt sitim sedans œsophagum continuò humectando, &c.

Lib: 3. Sect: 2.

Cap: 1. Acido-austera, ut prunum sylvestr: & sim. mistos liquoribus, ut lac, sang: &c coagulant. — Chalybs acida refrænans opt. — Subitanea sublatio et solamen post dolorem violentum, certum mortis signum; arguit enim partis mortificationem, ob nimiam vasorum compressionem. — Causæ [illegible] sunt 1. [illegible] [illegible] [illegible] viscositatem [illegible] quæ attenuantibus curanda, ut in Cap: dextero; ✝ ab obstructione ductûs choledochi: fa[illegible] bilis &c omnis bilis ab Hepate ductibus suis biliariis secreta fit. 2. Nimium [illegible], ut in [illegible] ardenti: qui refrigerantibus & laxantibus curando, ut in Cap: de [illegible]. 3. Humores austeri in melancholicis præcipuè [illegible] [illegible] [illegible] martis opt remedia, quæ hic ut alcalica operantur omnis aliis in casibus astringant. Vina etiam medicata ut in melancholia. Hic [illegible] [illegible] hac causâ in hoc capite agitur. ✝ usus astringentium ut bacc: myrtill: pruna, [illegible] &c. Intestina enim constringunt, humoresque coagulant. ✝ Cap: hoc. 5. [illegible] [illegible] et Borborygmi; qui carminativis pos, et in Clyst: curantur. 6. Intestinorum volvulus, et 7. Eorundem inflammatio, ut in passione Iliacâ de quibus ✝ Cap: seq: 8. Nimius Veneris usus.

Cap. 2. Intestinum Ileon in hoc morbo maximè afficitur, ob tenuitatem; dicitur Ileon in regione Umbilicali. Dicit etiam passio Iliaca in Scroto et inguine ob herniam; intestina enim in hac deducunt. — Passionis Iliacæ cura pro[illegible] [illegible] potest tantum ex à facibus induratis procedit. — Si vomitus in eâ sint [illegible], non ex induratione fæcum, sed ab inflam: procedit. — In inflammatione, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plantag: maximè [illegible] [illegible] non tantum [illegible] butyri, ol: & præsertim Ung: plantag: maximè [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], sed etiam frigida sunt. — ☿ vivus in inflam. nihil proficit, [illegible], in [illegible] induratione maximè. — In intestinorum calculo ol: butyri &c alia [illegible] [illegible] et opt remedia. ☿ vivus nil procedit. — Cura, ex ab alvo ad[illegible] [illegible] [illegible] procedit, fit clyst: laxantis, purg: laxantes, catapl: emoll: ex fimo vaccino ex ol. ✝ acto, et sim: abdomini, et balneo, omnibus simul et semel usurpatis. ut si hæc nihil proficiant, exhibeatur ☿ius crudus ad ℥j. — ☿ facili[illegible] [illegible] [illegible] potest, adeò minutæ sunt ejus partes, et fa[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], fit corrosivus, adeoque [illegible] [illegible]. — ol: ☿ij acido ut aceto, et sim. mistus fit corrosivus. — Resp. Parva [illegible] corrosivus evadere potest in corpore si acidus huic insit. Resp. Parva [illegible] [illegible] [illegible] huic infectioni qm magna. 2. Molis ejus continuus impedit [illegible] minus corrosivus evadat. 3. Continua superficierum ejus mutatio illud impediti [illegible] omnis corrosivus evaderit in unâ superficie [illegible] tamen [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] molu [illegible]. Add. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ex [illegible] [illegible] et [illegible], ut infici possit. Alias attulit [illegible] et solutione superficie non remaneat, ut infici possit. [illegible] [illegible] [illegible] vacat. ✝ Chymiam. — Cura ex ab inflam: intest:

...nis Ilio... procedit in qua patiens semper de unica quadam parte que... qui iacet. emoll: semicupia, ol. ung: plantae. interne et pulv. si... sub dies ... ventris inflammationis; ... nim ... retrocedunt, et suppurant. Sed Cura ab hac causa variis recondita, excepto in alvo adstrictâ promitti non potest. — Causa à Calculo duas, descriptas stantias, unam in Dominâ, quae hoc morbo periit, quarum dissecuit duos ... cum calculo in ... intestinis. Alteram in Viro Portiensi qui hoc morbo ... laborabat, tandemque calculus magnus ... alvo in campis excernitur ... manu ... ex ano extraxit. Cura in hoc casu sunt Emoll: semicupia ... fimo vaccino, et dec: malv: alth: &c. Cataplasm: Emoll: ol: &c. — Instantias ... exhibuit infantis involutione intestinorum defunctorum, et à se dissectorum.

Cap: 3. Diarrhaea colliquativa in Phthisi mortifera. — In variolis Diarrhaea maxime periculosa. — In feb: post ... diem accedens, non subito ... frenanda seu curanda.

Nott.

Cap: 4. Sang: procedit, post sequitur purgationem, in Haemorrhoidibus: in Dysenteria vero commiscetur cum faecibus. — ... fluxus Hepaticus in praxi. — In Dysenteria adsunt tormina ventris. in Haemorrhoid: non idem.

Nott:

Cura. 1. purgandum, ne fluxus retentus malos producat effectus, et ob feb: bi... &c. — pulv. Argentina fumans est emolliens. & obs: ...

Argentina

Cap: 5. ... expressionem. et ol: ... expressi: cum pauco Laud: ... refrenant: & sistunt: vomitionis; ideirco opt etiam in cholera. — Ingestio multi seri lactis. aq: tepida, &c ventric. adversus vomit: nimis fortem confert. — Cholera saepe fit à comestione nimia prunorum &c. — Bilis quae à vomit: eructatur, non in stomacho est, sed procedens ab hepate, actione ventric: presso, ... ductus cholidochus, ad pylorum et ventric: ascendit, ... os ejicitur. — Causa cholera aliquando ab intestinis, aliquando à nimiâ sang: secretione. aliquando à prunis ... etiam ab opulis ... — Sudor frigidus, singultus, extremorum livor et frigus, convulsiones, mala sunt omina in hoc morbo.

Cap: 6. ... amara, ut aloes, Rhabarb. ... &c lumbricis noxia ... partes salinas pungentes eorum texturam solventes. — Contra Lumbricos ... eos amara exhibeantur in quantitate, si abest febris: si vero adsit, amara ... ... miscentur. — Aethiops miner: et ... sang: alterant, ... partes tenuibus salinis, Lumbricorum texturam solventibus, replent. — ... crassa ... contra Ascarides et Cucurbitinos. omnia enim amara & alia ... sang. miscentur, vires suas amittunt antequam ad intestina crassa perveniant.

Cap: 7. Colica, non à Colon Intestino, sed à ... venter et ventriculus. — Dolor pungens semper à sale, scindens ab acido. distentivus à statu gravativus à viscositate et tenacitate, in qualibet corporis parte fit ... dit. — Legumina sunt ... vicia. et ... ab his fit Colica flatulenta. — ... calidus sit, in Colicâ ... nil prodest, imo ... dolorem auget, ... salinis, sive acidis concedit, sed non ... loco ... ; Mixtura vero nostra ... movet & ... — volatilis ... interne exhibita, et externe sub formâ ... sacculorum &c ... ... Pedes etiam aq: calidâ immersi, lintea calida &c. ... ad Dolor. & lib: 7. s. 3. c. 6.

Dolorum species.

Legumina quae.

Cap: 8.

Cap. 8. Hæmorrhoides aperiantur, quando verò salutares sunt, morbis non annumerantur. Rarissimè accidit nimius Hæmorrh: fluxus, sed cum supervenit, tota Armorum sit in usu, ut in Chirurg: tradit tractentur.

Cap. 9. Tenesmus fit ab ulceratione Recti, qd facilè dignoscitur à mâa excreta. ... puri; et fit à Lumbricis, Ascarides dictis. — Clysteres intra Rectum vix ascendunt, quoniam vapores ad Extremitatem intestini Colon sc. Ano-amotiorem transire volunt. — Corall: est adverso Ascarides et Vermifuges vermes; ut et etiam Clyst. ex Uno: plant. — Modo componendi suppositoria, plicet charta in formam suppositor: immergatur in aq: et liquefactis suppositoriis in eam infundantur. — D. Gul: Bruce de Kinross hoc morbo laborabat ad anni dimidium, neque curatus, et post omnia frustra adhibita, vero-scripto est usus aq: mineralis, quia causa ab humore salino et acri. — Cum ab ulcere Recti sit, Clyst. ex ℥ß + ℥j Bals: Lucat: cum fl: ☿ris, et pauco liquido est; + suppositoria ex Bals: Lucat: et Bals: ☿is cum sevo in omnibus ejus causis prosunt, excepto ab Ascaridibus.

Lib. 3. Ss. 3.

Cap: 1. Mâa quæ Icteros causat, cum sit instar et appareat esse bilis, cur non pungens in aliis partibus corporis Ictero affectis, ac solet esse in Intestinis? Cum etiam Urina. sit ejusmodi colores et consistentia ut lintea tingat flava, inter bilis, cur non amara et pungens? Resp: Humor Icterus causans non est ter bilis, cur non amara et pungens? Resp: Humor Icterus causans non est vera bilis, quia acrimoniam non habet, sed humor viscosus in sinus, innominatus flavus; et etiam indigestus; et sanguis crassus, verus bilis simile carens, ... ob causam secretio vera bilis in hepate impeditur, unde fæces in hoc morbo colores sunt argillacei seu candicantes. Hepar enim hic non agens, ... de patien, ut calore corporis partes. Hic ergo humor videtur esse chylus, qui non subitò à candido in merus permutatur colorem, sed gradatim ita ut primò candidus, 2º flavus, 3º ruber evadit; et si viscidus ac indigestus hic sit, in rubrum colorem nunquam transit, obstructiones hepatis causat, et quæ nunquam curantur donec viscidiatas attenuatur et humoris digestio promoveatur. — Millepedes: constant partibus emoll: et volat: salinis; et hic etiam Lumbrici terrestres. — Icterus flavus facile superabilis; flavus verò obscurus seu nigr. difficilior. — Icterus se manifestat, 1º. per Urinam, dein in albo oculi, et Unguibus, postea in facie, demum in habitu corporis.

Cap. 2. Cur evacuatio larga mâa nocentis, ut puris, e corpore languorem, debilitatem, lassitudinem, et etiam animi fere deliquium causat? Ratio est 1º. Quod cum hæc mâa in corpore remanet calorem aliquem corpori dat, evacuatio e contra valde refrigerat. 2º. et principium quia evacuatione vasa vacua et tumorem extensa et distenta, sic collabuntur, ut circulationem, ad tempus, sanguinis perficere non possit. — Cauteria ultra vasa perforare non possit ... in liquido, praesertim frigido, vim suam amittit. — Inflam: nunquam fieri potest nisi à partibus activis, sive salinis, sive acidis: Obstructionibus et Schyrris ab inactiva mâa dolorem tantum gravatio causante. — Nota: subsultus tendinis et nervorum post ulceras Gangrænam et mortificationem, et consequenter mortem certo præsagire dicuntur — Historia Dom. de Innerpeffray ... et D. Grange Aeon. mortui ulcere hepatis laborantis. Item D. de Naira et Dominæ Wertheni eodem malo laborantis, interna ulceris ruptione et purgatione curatorum.

Cap. 3. Hepar et Lien, magna viscera dicta, obstruuntur et Schirris sæpius

Suppositoria.

Millep: et Lumbrici.

Nota.

ra ius; quia non fibrosa seu musculosa, sed granulosa, et fibra sano circulationem promovent. 2. Hepar facilem venosi et crassi sang: recipit
— Schirri indolentes sunt, quia eorum partes non sint fibrosae et tensae, sed glandulosae et contiguae tantum, non continuae, sensationem ad sensorium eo transferre non valent. ✝ Causam et Curam eorum Humorum. & lib. 3. s. 1. praef. —
Attenuant: et Emoll: et Millep: Bals: Lucat: apt remedia. Etiam pil: aper: sine purgantibus exhibendae per longum tempus.

G. Ammoniac.

Comes de Braidalbin Schyrro hepatis laborans, accersitus est D. Stone qui praescripsit ol: et ung: calore illinienda, et Empl: de gr: ammon: superappl: s: de (✝ Empl: Carmin: Sylvij; aut Molit: compos: ex gr: ammon: mist. Gum ammon est discutiens et dissolvens) pilulaeque aper: interno singulis noctibus assumendas ad post usque vitae: visus est eas minime convenire ex praedicto paliente, quapropter praescripsit Bals: Lucat: incidi attenuans, quo remedio intra aut 9 menses disparuit Schyrrus. Post: eo usu Bals: Lucat: et nigatur, ana: lib: cujus ultimi capit sorbillum a 2ram i pastu, et primi ad magni: qui ingerenda avellant aut instandis indicis, e hiberis sentit a paroxysmi nephritici quibus antea tantum vexabatur, ut multotiens in anno vita periclitaretur, calculosque magnos excernebat: jam vero arenam tantum excernit et absque dolore, calculos minimos. Praterea cutis et tegumenta corporis adeo sunt mollia ut tactu vix eum crederes 40 annos excedere, omnis provecta sit aetatis, et 70. ... gerit, optima gaudet valetudine, color est floridus, rugas nequaquam conspiciendae sunt, &c. Uno verbo, his usus est remedijs jam per 5 aut 6 annos, ipseque in aeternum se victurum credit. Utitur etiam aliquando pro dolore Nephritico sperm: ceti et pulv: millep: Stone. — Praefectus cohortis Hill utebatur urina polita pro calculo, liberque ab eo evasit. ✝ Cap. 6: 159.

Cap: 5. Hypochondria sunt spatia sub costis inferioribus seu spurijs, vel potius suprema abdominis pars, sub cartilaginibus thoracis, seu, spatia dextra laevaque, in quibus continentur viscera haec, sc: Hepar, Splen, Pancreas.
— Flatulentia in hoc affectu hepati et spleni plerumque tribuuntur, saepe vero in intestino Colon. Dr. D. Pitcairn. — Solita purgatione augentur in ... fluxus. — Idem morbus dicitur affectio Hypochond. in viris, passio vero hysterica seu suffocatio Uterina in foeminis. — Ut jam obtinuit ut patients Hypochondriaci non denominentur, antequam accedat alienatio seu aberratio mentis reliquis symptomatis. — Melanch: mentis a pecunia, &c jacturam, corporis vero a constitutione oritur; et aliquando etiam accedit a mensibus suppressis. — Cum adsunt flatus in hypochondrijs motus, borborygmi, atque austeritas, aciditas, cardialgiam &c cavitatis &c, atque his omnibus accedit alienatio mentis praeter nat; et in aliquo particulari, morbus appellatur affectio Hypochondriaca. Cum autem vapores hi austeri et acidi diaphragma elevant, et laryngem constringunt et suffocant, et alio ascendentes oculos lacrimant, aliosve sensus afficiunt, dicitur passio hyst: seu suffocatio Uterina, cujus praedicta sunt tantum diversi gradus seu progressus. — Hic morbus in essentia sua nihil aliud est quam indigestio, cruditas, austeritas (quae aliquando tanta ut abdomen ... ac vesceram usque contrahat) vapores viscidi acidi et aliquando austeriter. — Urina tenuis in hystericis certum est signum paroxysmi appropinquantis: turbida vero parox: praeteriti et liberationis a morbo per aliquod tempus; mala enim peccans excernitur, et obstructiones solvuntur.
Cura morbi fit alteratione totius constitutionis. (Sed symptomata cuivis magis urgentia ut respir: difficilis, &c. proprijs remedijs aggredi possunt.) Inde hic remedia sunt digestionem promoventia, ut omnia amara

amara, vina medic: amara &c. potiones chalybis contra auctoritatem moderate aperientia ad obstruct: solventia; attenuantia ad viscositatem. Ipse adhibere soleo massalia sanatif: cum Diagrid: & chalybem

Cap: 6. in Calculo Renum et ureterum cur uno rene affecto alter cessat à secretione? Resp. ob eundem nervum & ramos diversos utrique reni communicatum. Inde etiam fiunt vomitus in Calculo nim. quod idem nervus ad ventric: et renes descendat & sic reliqua in praxi. — Calculus ordinarie in angulo ureteris, ubi per coxendicis transitus habitat, et sic dolorem maximum creat. — Dolor in calculo vesicae est praecipue post mictionem ob contractionem vesicae, urinâ prius distentae, circa calculi angulos. — Dolor etiam in extremitate penis, & ob reverberationem motus in urethrâ (ob angulum in eâ, quae est tantum continuatio fibrarum longitudinalium tunicae internae vesicae; & ob alias rationes in praxi ipsâ traditas. — De generatione Calculorum in Renibus, vesicâ, & Intestinis, & paragraphis, primis hujus cap: in praxi. — Diuretica, ut post nauticos, Anglice punch, caute adhibenda nisi post paroxysmum et calculi emissum, ne calculus in ureteres ab iis motus, eos & non ingrediatur, & si ingrediatur, non facile pertranseat, ob magnitudinem aut rugositatem. — & S. in calculo Renum seu Ureterum, facit vasorum collapsum in Ureteribus, ita ut se magis dilatare possunt ad transitum calculo praebendum. Eodem modo operatur Laud: liq: in somno enim magis est vasorum collapsus quam in vigiliis, et Laud: sp: in partes influxum impedit. Sicque canaliculorum dilatationem adjuvat, doloremque tollit. — Regio renum cognoscitur circumductione fili ab extremitatibus costarum spuriarum infimarum in [illegible] lineâ circumcirca corpus. — Colica flatulenta aliquando nephrit: aliquando [illegible] affectionem [illegible]: emulatur: à urinâ erit distinguitur quod in colica pati[illegible] [illegible] se incurvare possunt, in nephrit: non sine summo dolore, quod est primus [illegible] sign. nephrit. 2dus est [illegible] Calculorum. 3tius. motus doloris à renibus per [illegible] ilei seu coxendices versus abdominis partem anteriorem seu hypogastrium. 4tus. Dolor lumbaris cum emissione sanguinis: quod est [illegible] secundarium signum nephritidis. — Distinguitur Nephritis in eam quae dicitur stony-gravel, et eam quae nomine sand-gravel [illegible], quae ultimâ causatur à mucô tenaci et viscidâ, multo, [illegible] eam [illegible]. — Signa calculi vesicae incipientis: sunt excretio muci tenacis, et emissio arenularum: haec tamen consuli & in Cap: ipso. — Arenula [illegible] (blaw) aut albicantis coloris ordinario viscida est, ideoque saepe degenerat in calculum; laterilius aut rubicundi coloris non, friabilis enim est et ad [illegible] inepta. — Instantiam nobis dedit Calculi vesicae membranaceâ hirsutâ vesicae alligatâ contenti et inclusi, in viro Edinburgensi post mortem dissecto: sensit calculo, nec tamen unquam Cathetere ~~[illegible]~~ explorari voluit. Vide.

Miles sana: à Calculo, irritis omnibus aliis, à muliere seq: remedio intra [illegible] [illegible] perfecte curabatur. et quoties fluxus sana: recurrebat eodem [illegible] modo. ℞ bonam quantitatem herb: viridis (quarum defectu uti possunt [illegible]) [illegible] collecta, et debitâ in umbrâ siccata) plant: continens: bursae pastoris: hyperici; consolidae; affundantur in vesicâ & cupreâ & stanneâ polig magnâ quantitas lactis vaccae recens: mulcti, et f. distillatio, quae etiam fieri potest in vase refrigeratorio. Recipiatur aq: quae reservetur ad usum. Exhibeatur ℥v & vi. hujus aq: cum ℥j syr: de alth: (quidem de symphyto) ter in die, mane, hora octavâ, quintâ pomeridianâ, et ingressu lecti, per dies 10, 12, 15. Mayern 366. & p: Praxeos 53. in margine.

Cap: 8. Unde urina sive Dysuria procedat, an a humore acrimonia, an a Calculo [illegible] ulcere & inflam. vesicae, & ejusdem sphincteris, [illegible] consuevere possunt. Pil: nephriticae Micholij magnae sunt effic

Sp. G. et Laudan.

[illegible] &c. mav. alth. cum ol. cum aq. [illegible]

aquae sint, hae pp. seq:

Pil: nephrit: Mickolij.

est causa in urina ardoris à tartaro luteo. ℞ Myrr: thur: mast: masstich: āā ℥ij. succin: praeparati, croc. āā ℥ʃ. camph: ℥ij. ℥ij. crust: antim: fixi: et albiss: ℥xv. Trita omnia ut alcohol exciprianq; s. q. terab: venet: in sp: vini tartarisato liquata, et mediante [illegible] aq: coi tartificata, f. massa pil. Capt ℈ʃ mane horis 3. ante prandium, et tantundem horis totidem à cena levi, superhausto aq: Lactis sq. parvo cyatho, idq; diu donec tota massa consumpta fuerit. aq: Lactis ℞ rad: alth: symphyt: maj: bulb: lil: alb: āā ℔iiij. fol: equiset: pariolar: molit: cum toto, āā fascic: iiij (fasciculus autem habet Miiij) fol: bolon: scabios: pimpin: lapat: barb: cum flor: āā fasc: ij. lagopod: portul: plant: vulg: et aqual: āā fasc: ijʃ. malv: viol: abrisitti hort: āā fasc: iij. fl: nenuph: utriusq; malv: ros: chamom: āā Mxvj. fl: Erice M viij. Melon: recent: à cort: liberat: maj: fragar: matur: ℔ iiij. Recentia omnia incidantur, iisq; affund: aq: hord: & lact recent: coct: non dum fermentata, alterutrius viz: liquoris fervent: ℔ xx. sinatq; fieri maceratio per noctem in ampla vesica × cuprea vel plumbea, aut ferrea ,: habeat, idq; ad leviss: cinder: tepid: calorem; mane autem affunde lactis recent: non cocti ℔ XL. et supposito capitello in refrigerat: ℥: distillatio in vase duplici, & saltem ad levissimum calorem, et quae exstillavit aqua servetur ad usum in lagenis lapideis exactissime obturatis, sed recondenda loco frigido subterraneo. Mayern p. 367.

× a Bolt-head, wherein aq: cinam: aq: vitæ, &c. are distilled. Germ: # i. e. alembicus frigidus cola stell: sub forma pyramidis, in qua aq: liminis coitur: distillanti. Glone: & a wooden vessel full of water wh a serpent or spira: runs in it often oneloas, we suffer ye water is to flow thro' to cool it. Et. either such a, as the commonly a q: vitæ, or such a glass Glone: Bolt-head.

Cap: 10. Mäa purulenta per penem, cum ex. excreta à vesiculosa distinguitur, per injectionem in prunas ardentes, unde oritur fœtor: & per concussionem in aq: et si facile discerpitur (ejus enim acrimonia viscositatem et cohaerentiam tollit et dissolvit, est purulenta: 2. urinæ odorem, qui fœtidus est cum pus ei miscetur; è contra cum pituita. & lib. 3. s. 4. c. 3.

Lib: 3. sect: 4.

Cap 1. gonor: non virul. (simplex, laves dor: lactis, running reins, Ripley's) maxime difficilis curatu; virulenta autem facilis, saltem respectu alterius. Pulsus in Phthisi celerrime, et sang: acris et mobilis valde; in Tabe vero dorsali pulsus languidus, et sang: maxe torpidus. proveniet ab indigesto (seu non bene fermentato) torpido sang: & à mollitie et laxitate musculorum seu solidorum.

Maxima portio maë seminis à nervis lumbaribus venit, unde afficiuntur lumbi in gonorrh: salivatio per ☿ d nihil proficit in hoc morbo, quoniam nulla in sang: acrimonia, et cum sane dulcorando et acrimoniam diluendo operatur. valde emaciat hic morbus, ideo cum videmus aliquem emaciatum absque ulla causa cognita et absque querimonia, semper de suspicandum morbo. Mäa evacuata in Gonorrh: simpl: non filat, quia aquosa, nec in virulenta, quia acris; quare cum post mod: usque filat, signum est consistentiæ bonæ, et absentiæ aquositatis in prima, et acrimoniæ in 2da.

nisi seminalis in secretis aque ac in fluidis.

Cap. 2. portio aliqua seminis semper revehitur et circulat cum sang: talitur obliciat seminalis maxe intumescerent supra modum, et inde fit ut toto corpore in hoc morbo afficitur. Quomodo potest quis affici lue vener: absque gonorrhœa? R ordinario per coitum parta corrosione, quæ radix sunt et luis et gonorrh: ad urethræ communicantur aliquando tamen parta hæ ab introitu in urethram impedita ob semen exiens; glandem efficiunt, et vasis penis ad communicantes cum sang: circulant, inlactis vel vehiculis seminalibus, sicque luem ven: absque gonorrh: causant. Aut lues ven: introduci potest absque gonorrh: sic etiam gonorrh: absque lue ven: unde coiter dicitur. Has clap'd but not pox'd. ☿ d. causam gonor: virul: et acrimoniam tollit, non vero gonorrh: seu fluxum ipsum. — si mäa per penem profluta sit flava, et multo magis si viridis sit, tanto cum curanda venit. — sarcomata, hypersarcosis interna et externa, chancres. — Cura. ad derivim: & ulcera removen: & dein

☿ d. Sexies sublimatus, opt: nam quo sæpius sublimatur, eo minus aptus est deorsum purgare; et ut sig: magis stimulans rodeans, et ad sang: et humores attenuandos ad promptiorem colliquati-

dem astring: ulenda. — Salivatio ulcera interna et externa curat. — Sal prunellæ aciditate acrimoniam corrigit, et austeritate astringit. — Gum Guaj: ... et Guaj: dolores ossium post usum ... tollit; qd etiam facit Merc. fulmin: dos. gr: iij. — Viride æris opt. mundit externorum ulcerum, et ideo ... interne ... Nota. si ptyalismus supprimatur, lac pingue, ejus cremor, vel butyrum, nondum concussione ...

Cap. 3. Gonorh: simplex virorum et fluor albus mulierum idem sunt, nisi qd posterior copiosior sit, et non sit semen ac est in viris; venit enim à glandulis uteri, et præsertim vaginæ; vesiculas etiam seminales non habent; et tamen symptoma doloris lumbaris, nervos esse affectos apparet. — ... extrahi potest in fila, non virulentus est, qd etiam dicendum de Gonorh: in viris. — aliquando colorem alb. mutat in flavum, et etiam viridem, et tum virulentus est, quamvis non semper à causâ malâ. (Modus distinguendi inter Gonorrh: et fluorem alb. in ... ad fluor. albo.) — Cura eodem modo perficitur, et sæpe colores flavi et viridis, ac si à verâ causâ virulentiâ, nam ... sudorif: ex China et Glycyrr: et ... in parvis dosibus, et mox ... æthiop: mineral: in magnâ quantitate. — ... Guaj: est firmans et siccitans, adeoque solida corroborat, et fluida attenuat. — ... hoc morbo laborantes ad concipiendum sunt inhabiles: viscositas enim mat. partes subtiles seminis intricat et obruit. — Gn... humor ex ... gravidis et Quinquagenariis non est morbus, et praxin. — Humor ex ... in sit pus et phlegma, noscitur filando, injectione in carbones ardentes, ... in urinam, unde dissolutione et supnatatione, aut è contra collisione et ... substantiâ dignoscitur et lib. 3. c. 50. — Dicitur hic morbus profluvium album, sive fluxus muliebris impurus. — ... omne humorem profluvium conveniunt ... tollit, dein lig: sudorif: ex santalis utrisque, et demumque alcalica, ut oc. 69. ... chel: 69. pulvis: ov: calcin: &c. et in hoc corroborandum lob. corpus et glandulæ.

Cap: 5 Nimio mensium fluxui remedium nunquam adhibendum est, nisi ex nimis ... frequentiis temporibus recurrit, et nimis diu manet; ut si singulis septimanis recurrat, et per plures dies continuatur; non vero ex statu et solito tempore, ... per mensem recurrit, et ad 3 et 4 dies durat. — Hoc morbo affectæ concipere ... possunt, sed sunt abortientes. — Mentes pollentia, seu stomachica corporis ... astringentia solida firmantia sunt opt. in hoc morbo remedia, ut pulv: linam: astringentia nihil prosunt, sed potius lædunt. — Tormentilla est aloxiph: ... gentia nihil prosunt, sed potius sistunt menses ipso conceptionis tempore ac astringens. — In prægnantibus ...

Cura, in debilibus, et ex absque accidente seu externâ causâ invadit, sang: et constitutionem alterando. quid tum hic culpanda sunt. Si autem accidat à mole, casu, ictu, aut alio accidente et causâ externâ, in subjecto alioquin sano, astringentia sunt opt. remedia; sang: enim mixtura non restauranda est.

Fluxus in gravidis à sim. causis externis curatur opt. et ... semel et bis, pulv: torment. pulv: ros: et sim. astring: ut et aq: myrtill: ex vino rubro pro potu ordinario; sed si invadat à causâ internâ, ut sang: serositate, acrimoniâ, turbatâ mixturâ, &c restaurantia et firmantia, non vero astring: ... foetus intra uterum quantum possit ad debitum parturiendi tempus retinendus est; Emplastra astring: contra aborsum, et rupturas, tergo &c. applicatis, ut et refrigerantibus.

Nimius Lochiorum fluxus raro et nunquam puerperis efficiuntur in frig: hoc climate, imo facillime, si non semper, oportet eos promovere possetis ex vino albo, ... ex croco imbuto; et ... hysterico umbilico applicato, ... — Nunquam dicuntur Lochia, ... enim ... Lochia ... et secundinæ. Si fluant post fœtum expulsum, ... auferuntur, fœtus et ... portionem, quam fœtus ...

Cap: 6. Fœtus esse mortuus dignoscitur 4 modis. 1. Nullus habet motus. 2. Cum mater

Sal Prunellæ.

... aromatica calida, ... dimidium ... sufficit, et magis certe absque purgationis motu ... 4 ... sublim: ʒj. ... pip: alb: ℥ß. ... cil: ... tragac: q. s. ut f. massa pil. N° XXIV. Dos: IV. omni mane et nocte ... ex Guajaco.

℣ Mauriceau, Portal, Peckey.

Tormentilla.

× Mauriceau contrarium.

℣ Mauriceau 274. 343. et alios.

ad fœt^m mortuu^m expellend^m dét^r succi hyst: ℥j. cum coch: j. sp: vini et aq: lapid: ℥ij.

mat. in hoc ψ a. inc. tact^s se convertit, grave invenit ponde^s. 3. Nullus est motus in vasis umbilic: 4. et infantis digitus intrusus non premit. ψ obs: 5 mas est fœtus. —— Aq: membranis contenta dicuntur the fore-spring, et earum fluxus, the breaking of the fore-spring, qui fluxus sponte fieri debet, antequam promoveatur partus. —— Causa 1°. Non accidit in unâ ex mille, et si acciderit, causa est fol potius abortus quam partus difficilis, quia eâ supposita, accretionem fœtus ad magnitudinem debitam impediret, sicque ante tempus expelleret. Scultetus instantiam de uxore suâ ψ in ejus libro. 2°. Hydrops abdominis, Hydrocephalus, monstrositas. 3°. Instantiam nobis dedit sarcomatis uteri ad magnitudinem capitis fœtus in uxore Dav. Jackson Perthensis. 4°. Hæc causa est ordinaria. 5°. ψ Mauriceau &c. 6°. Adhibeatur Mithrid: cum ol: succ: interne, et etiam externe umbilico; ψ borax cum troch: de Myrr: 7°. Eadem cum sextâ. 8°. Introducatur unus digitus, dein alter, et alter, et demum manus tota et: oportet immer sa et dilatetur orificium uteri quantum possit. 9°. cum oleis durum, adhibeatur Clyster laxans. —— Usus Laud: cum ψ sine croco, est ut fiat cessatio seu requies à labore, somnum concedendo per nervorum occlusionem, ut majores dein colligantur vires & spiritus; et sic non spo: aut vires dando, sed ne perdantur impediendo, operatur. †

Throws are the violent contractions of Muscles abdomen, &c.
Lochia, throwers white & red, or cleansings.
Lochiorum irritatio, grindings.
Febris erratica, waiting-on-fall.
~ tramamoly.

†—Lochiorum irritatio (Grindings) cum Lochijs, bonum; signum enim est activitatis sang: et humorum. —— Chamam: est vol: & emoll: ideoque & pellens & acrimoniam involvens. —— 1°. Uteri dolor distentivus ob vapores, oportet curetur hystericis interne ad Lochiarum fluxum promovendum, et fotu hysterico externe. 3°. applicentur ampullæ aq: calidâ repletæ pedibus, lateribus &c patientis feb: erraticâ laborantis; invadit enim cum frigore, cum fit ardor (glowing) & denique sudor. ——

Infans statim à partu proluitur et perfunditur vino Hisp: tepido, cum sacharo, et sim. ψ vino et aq: tepidis cum spongiâ ψ linteis, ψ ol: amygd. dulcis, si excrementa in habitu corporis tenacia. Nares et aures lurundis detergendi, oculi linteo raro tergendi, omnes aperturæ, partes sc. genitales, anus, &c inspiciendæ ne occludantur &c. Umbilicus ligandus ad digitum ab abdomine.

Puerperæ post partum ligantur supra lumbos, ne aer poros uteri ingrediatur, cumque nimis elevet. —— Mulier post puerperium nunquam intutò ante elapsum ab eo 7 aut 9 dierum.

Cap: 7. Si jactationes membrorum sint 1. sine contractionibus, passio est Hysterica, non Convulsio. 2. Quoties sint contractiones, si adsit bonus faciei color, est passio hyst: si verò patiens hebes, gravis, lividus, &c est Convulsio. 3. Si tempore parox: color sit bonus, et post parox: patiens hilaris ut ante, est tantum passio hysterica.

Liber 4.

Cap. 1. Scorbutus provenit à sang: salino fixo, unde halitationes & obstructiones, quæ diu permanentes, corrosionem acquirunt, quæ demum in tumores & scabies externas erumpit —— Quo sicciores sunt tumores & maculæ, eo plus est scorbuti et periculi; et quo humidiores, eo plus scabiei, et facilius curantur. —— Maculæ rubræ facilè, lividæ difficilius, nigræ omnium difficillimè curantur. —— Acrimonia et calida senibus, refrigerantia antiscorbutica i.e. temperata, juvenibus danda sunt, non verò è contra.

Cap. 2. Juvenes Arthritide fixâ non vexantur, 1. Quia sang: non mucilaginosus, i.e. salinis et acidis fixis partibus refertus. 2. Quia fibræ ita sunt laxæ ut transitionem partium salinarum patiantur; non ita in senibus. —— Arthritici prius & virgo qz scorbutici. In arthriti: parox: sumatur lamina ψ sluppa, in cujus alterum lato inungatur alb: ovi, et derosetur; in aliud lato inspergatur oleum aliquod forte penetrans ψ spiritus, ut ol: Spica. sp: ✱ii, &c et applicetur. —— Causa est eadem in

ψ dolor in obs: 5 mis.

Arthrit: et Rheumat: differunt tantum respectu loci affecti et mat. Locus Arthrit:
sunt articuli, Rheumatismi caro inter articulos. Mat. Arthrit: est humor tenuis
et corrosivus ex nervis et art: affectus: Rheumatismi vero mat. viscida, torpida, et
acris. — — Arthritis nihil aliud est quam humoris à nervis et arterijs in li=
gamenta et articulos depositio. Maxime Arthrit: dolor in causa est quod authores
censeant succum nerveum, qui maxime activus est, ad eam concurrere, atque bene
ac mat. acris ab arterijs — invasit extrema in initio, quia sang: ad hæc tanto pau=
per vigore ut maam pellat ad loca a centro remotissima; at in progressu tempo=
ris sang: sit languidus et diastole debilis, mat. deponitur et halitat in locis centro
propioribus. — Arthritis vaga aliter explicari non potest quam per depositionem
et secretionem mat. peccantis, ejusdem à vasis revehentibus resorptionem, et in
alijs loc: depositionem.

Cura fit sang. viscidi attenuatione, acrim: dulcificatione. Corroboratione et
postea fiant secretiones. partis externarum et internarum emollitione, ut facilis sit
aut sperata aere salinis, ut Caetiapolia, etc interne, et Catapl: emoll: externe, ut et
Empl: Germanicum, Goutplaister.

Juvenes sæpe Rheumatismo, raro arthrit: corripiuntur. — In Rheumat: sang:
copiose mittendus. in Arthrit: raro vel nunquam. — Ischiadici locus propior motus centra,
ideoque partes halitantes eam causantes facilius expelluntur motu sang. aucto. Poda=
gra, Chiragra etc locus in extremitatibus sit, et procul à motu centro, ergo raro
vel nunquam curantur. — Stercus equi non castrati constat partibus subtilibus et
emollientibus. — Cariocostinum commendatur non ob specialem aliquam virtutem
purgantis quod in eo est, viz. Diagrid: sed ob partes stomachicas quae in reliquis
illud componentibus reperiuntur. — In Rheumat: carnosæ partes afficiuntur, quæ
cum non sint rigidæ et tensæ, ut sunt ligamenta, dolor tantus non est ac in Ar=
thritide. — Dolores Rheumat: largiorem sensu comprehendunt dolores quos=
cunque præter eos articulorum, adeoque plenitudinem, etc in quibus membrana afficiuntur.
— Sang: est indigestus, viscidus, torpidus, et acrimonia conjunctus.
Cura eadem ac cum Arthrit: et præterea V. S. repetita donec cedat dolor,
sanguisque debita consistentia appareat. Dec. Sterc: equi non castrati, etc. Externe
ung. Opodeldoch et Bals. anodyn. Bat. ā part. æq.

Cap: 3. Hydrops interna in abdominis, thoracis, etc cavitate, Ascites, externa inter cu=
tem et musculos Anasarca dicitur. — Si tumor abdominis subito invadat, Tympani=
tis est non Hydrops. Glone. Hydrops seu Ascites est vel vera vel falsa; vera quæ in cavi=
tate abdom: vel thorac: est; Spuria quæ inter cutem et musculos abdominis, in=
quo differt ab Anasarca seu Leucophlegmatia, quæ totum externum corporis habitum
occupat. Nota aqua quæ Ascitem spuriam et anasarcam formant sunt dulces,
insipidæ et absque acrim; quare ijs laborantes febr: et siti non corripiuntur; eo=
rumque urinæ sunt dulces, crudæ et tenues: è contra in Ascite vera rubra, lixivi=
osæ, et laborantes patienterque siti maxima, febr: lenta seu hectica, et Dysuria=
, et saluræ sunt, patientesque siti maxima, febr: lenta seu hectica, et Dysuria
... Si aq: cistis includantur maxima ex parte incurabilis
habetur. Charr: 44, 45. Laug: Si aq: cistis includantur maxima ex parte incurabilis
de hydrops. vang. vel annot. ad lib. 3. S. 3. c. 2.
Sang: in hydropicis viscosus est, unde fiunt obstruct: et halitationes in tubulis
variis ex vasis excretorijs, in tantum aliquando ut sero viscoso vasa hæc et lympha=
tica ita distendat, ut extudet serum per fibrarum interstitia, materiam in cavi=
tatem, si eam respiciant; videmus enim in pedibus hydropicis et œdematosis
transudationem fieri, atque si per cutem leviter scarificentur, vel si acicula terantur,
maximam lymphæ quantitatem effundant. Glone. explicatio hydropis. — Authores
statuunt vasa lymphatica etiam aliquando rumpi, sicque hydropem causare. — Hy=
drops abdom: frequentius accidit, quia in eo plura sunt lymphatica quam ullibi
in corpore. Glone.
cap. 4.

Stercus equi.
Elect: Cariocost:

Cap: 4. Scabies & scabies scabiei vocat est, et tantum: partis mitta, ideoq; contagiosa: ea vero scorbuti est fixa et sola serositate, si aliqua humiditas conjuncta, ideoq; scorbutus non contagiosus. — Hinc (cujus scabies est una species) mad vero humiditate benignâ & balsamicâ gaudens, retropulsus, non tantum infert mali, (quia acrimonia balsam: partibus est involuta) ac illa sola serositate et acrim: constans, quale est scorbutus. — Etiler apud Medicos dicitur, scabies retropulsa est causa malorum morborum; at hoc præcipue intelligendum de ea quæ maxe ad scorbutum accedit, i.e. de scabie dura, ex sola serositate, non de ea quæ pure benignâ & balsamicâ comitatur. Quare scorbuticæ eruptiones promovendæ non repellendæ; scabiosæ vero aliquo tuto repelli possunt. — Sulphur operatur aciditate et distillatione enim prodit sp: acidus) nam acidæ partes aereæ et salinæ acidulat et refrigerat. Non operatur partes suas ♃eas, propriè sic dictas, et inflammabiles, quod evidens est ex eo quia Ung: Imperial: quod calidum est & Rom. ex butyro tam efficax est ac sulphur. Ego Ung: Imperial: pro infantibus utor. quod poros aperiendo, et partium aeriæ et salinæ evolationem promovendo operatur, non repellendo et infrigendo.

[Margin: Sulphur. — Ung: Imperial.]

Nott: Inunctiones nunquam fieri debere absq; præcedente, concomitante, & subsequente purgatione, et corrov: ex præcipito ut in Etmuller. & Chem: de ♃.

Cap: 5. Rachitis à plebe dividitur in eam Articulorum et Viscerum. In primâ adest latitudo corporis, genus, et magnitudo et granditas. In 2da vertebræ colli caput sustinere non valent, sternum carinatum, latera collabuntur et introsidunt, unde pulmones compressi difficilem & frequentem respirationem patiuntur. caput fit debile majus, nodationem faciunt in articulatione cartilaginum costarum ex sterno, &c. Atqz hac saga comitatur sympt: Rachit: Articulorum; sed aliquando Articul: rachit: absqz altera est, tamen eam præcedit. In utraqz adest maxima debilitas. — Cura fit medic: moderate aperiente & attenuant: ad digestionem & circulationem sang: per oes corporis partes promovendo. Ego utor Ung: Nervi: quod calidum est ad partes collapsas et concavas, non vero convexas; et protuberantes sunt nodulas, inungendas. At cuj calidorum usum improbant, ea quod poros aperiunt, sp: exhauriunt, & debilitatem augeant; quapropter ad immersionem in aq. et Ung: ex refrig: et temperatis, ut Hepat: tarax: rad: lapath: plant: ... crassica, rorim: &c facti confugiunt, quæ operantur externa roborando, poros occlud: et sp: intra corpus retinendo. — Æs Veneris admodum crassitiem attenuando, et vehiculum ejus sunt syr: oes moderate attenuantes, ut syr: lim: Epithym: de 5 rad: capill: ven: &c. Si ultra ter & qualer in die purget, sistenda est ejus dosis.

[Margin: Æs Veneris.]

Liber 5.

Cap: 2. omnia symptomata in hac feb: adsunt, et talia qualia fiunt inter ab auctis sang: motu, nam hujus essentia in hoc ferè consistit, et si alia adsint symptomata, est aliud aliquid cum ea quam sang: motus auctus. — Oritur ab iisdem causis ac Ephemera quoad causas procatarcticas; Continens vero est turbata sang: mixtura à mad aliqua ex talibus partium solidarum exerta, & ab extus ingressâ ut in peste, &c. — ... hic admittenda, quoniam vident vires ad expellendam maam noxias destruentis, quia cephalalg: vigilias, calorem, corporis jactationes (quæ oia vires maxè destruunt) minuit, sicq; quietem & somnum conciliando vires conservant, spiritusq; ... tum, tamen plus quam si non instituta fuisset. — Cura attenuantia & ... laxantia.

[Margin: Praxi; Edinburg: ... vesicantibus ... item ptisana ... ad aeva indurata ... Tamarind: ℥j. ... Rosarum ... solutio ... ad ... ulcerationem. Clyster: et oleum ... in hoc symptomate. — Nott: — Nott:]

Cap: 3. Ex quovis malo quovis affectu, quo minus apparet, eo pejus. — Anxietas circa præcordia prognosticon speciale in feb: malignis. — Spondines subtiles et nervorum, semper periculosissimi, et mors continuo ferè subsequitur. Urina oleam lanam similis, periculosus, et moriuntur tandem ordinariò convulsivi. Spondines subsultus oritur ab ipsorum vellicatione et corrosione in maa feb: causa. — Lingua ... crustatio primò alba, deinde nigra, ob maæ corrosionem. — Stilla sang: è naribus in initio feb: malig: malum; motus enim sang: in ea non auctus, sed oppressus, ideoque ...

[Margin: Nott. — Depotechiarum &c ad interiora raptus et retrocessus. & ... Bagl: ad Cap: 5. ... in marg.]

illa fit ob acrim: et à turbatâ sang: mixturâ, et quia pâcit ad acrim: fiunt maculae tenues et penetrantes. — Modo distinguendi eruptiones petech: à f[?]cibus tempore à pulicum punctionibus, hic est: quod posteriores radijs et inflam: circundantur, priores non. + Cap. 5. [?] ℞. S. confert in hoc ut in multis alijs morbis, non quod in se conveniat, sed quod quietem dat, et jactationes praevenit, sicque vires conservantur magis quam si non adhibita fuisset. — Effusio sang: post mortem provenit ex eo quod sang: à corde expulsio ad ultimum vitae momentum continuata sit, arteriae (cor enim primum movens et ultimum moriens) sita ut in corde et arterijs mortui nullus reperiri possit sanguis; hic autem sang: cum à venis revehi non possit, ideo et fiunt venarum anastomoses, et transudationes sang: per carnis poros cavitates respicientes. —

Si Diarrhoea accidat in feb: mal: actum est. alias Diarrh: à purg: supveniens errorbat mixturam sang: turbatam esse, quam in Praef: innuimus feb: naam partim constituere. — Cura feb: malig: fit attenuantibus, coagulat: praevenientibus, et sang: mixturam restaurantibus. — Præterea quod feb: à frigore differt à malig: 1. quod in illâ pulsus sit vehemens. 2. quod comitetur doloribus Rheumat: præterea gravedine. Ulterius, 3. à frigore lingua non maculatur, quia nulla corrosio materiae et pul[?] 4. tendines et nervi non subsultant, ut in malignis, et fere semper lethale sunt signa, præsertim si simul adsit spasmus cynicus [?] musculorum oris convulsio, ut in [?] de Methven vidi; et aliqua alia partium convulsio, ut labij, linguae &c. quae in omnibus morbis mali est ominis. 5. Nulla adest praecordiorum anxietas, aut faciei collapsus, ut in malignis; et in ea à frigore, et in Continuâ, imò potius adsunt in ijs rubedo et [?] benefactio vultus à motu sang: aucto.

Cap: 4. Nisi eruptiones aut carbunculi appareant intra tres dies, actum est de patiente: si verò apparuerint promovenda sunt. Carbunculi sunt cornea consistentia, ac Cancris similes. Non tractandi sunt refrig: et repellent: sed spirituosis et fortibus, ut sp: vini, sp: vini cum Angel: distillato, &c et Cucurbitulis. Bubones etiam pestilentiales cucurbit: promovendi, ut in Lue venereâ. Interne usurpentur expellentia, alexiph: et cardiaca, ut Ther: ven: Mithrid: Lap: Bez: Bez: min: Lapis Goa, pulv: Comit: Sal. Sp: et troch: vip: &c. — Anthraces seu Carbunculi sunt tumores (sub axillis) in diversis corporis partibus, Bubones in inguinibus, Parotides sub auribus; atque hae sunt tres partes in quibus erumpunt ordinariò tumores pestilentiales. — Omnes eruptiones cujuscunque generis et in quocunque morbo, fiunt à materia magis et minus acri et corrosivâ. — Sp: aceti opt. praeveniens pestis.

Cap: 5. Distinctio ardentis à feb: variolas praeunte haec est; in ardente non tanta dolores dorsi querimonia. 2. Non tanti subsultus ac in variolis. Causa quo[?] in est, quod in feb: ard: nulla materia ab externo introducta, sed tantum motus sang: auctus; cum in variolis acrimonia ab externo accedit in tendines, et in parte dorsi membranaceas. — Non timendae est in convuls: cum praexistente feb: solummodo erumpentibus: cessante cessant convulsiones. — Si feb: in variol: sit severior, tunc dari ℞. S. et usurpentur mot. sang: moderantia; si verò mitis, omittenda ℞. S. et eruptiones promoventia exhibeantur. — Nulla materia serosa tendit ad veram suppurationem. — Eruptiones fiunt primò in pectore, et superiori parte dorsi, ob proximitatem cordis motu, i. e. cordi. — Excretiones omnes virides periculosae: ut et omnes tumores subitò erumpentes et subitò retrocedentes. — Specificationes variol: proveniunt à materia acrimoniâ: unde quidam summitates variol: acicula aperiunt antequam maturentur, ne materia nimis fodiet. — Spodia in variol: debent esse omnes: et volatilia: — Variolae invadunt cum feb: per 3. dies sensim augente. — D. Pitcairn famosus est quod 2. et 3. die praedicit variolas lacteas, cutis. — Medicus cum variolas rumpere certior factus est, patientem relinquit usque ad diem 9 aut 10m, tunc reverti[?] ut

Nott:

℞. S.

nott:
Hartl. [?]
et Annot: ad
Syncope.

Parotides et
Bubones soli
in admibus
contingunt [?]
quære, et Willis,
De la Font, p.
109.

Starlings.

Nott.

Spirandi difficultas in variolis, a mat. fe. in pulmones, mo[?] test. semper mala. Bagl. Dissert. ad Pet. Hotton c. 1. Operum p. 569.

Variolas ad interiora rapias et retrocessas excitavit scarificatione totius corporis et eductione sang. ad ℥vj (in septenni) per cucurbitulas hinc inde applicatas; deinde involutione linteis calidis; et seq. die inunctione totius cutis ol. Amygd. dul. mixto cum sp. [illegible] id. ib. Eadem est cura petechialium &c in feb. malignis ad interiora recurrentibus. id. ib.

ut succurrat pacienti die 11mo. qui periculosissimus est, quia tum maturans, & [illegible] cant, materia tenuis evadens sang: per vasa capillaria refunditur, unde & secundaria, quae punct. 4 v. 3 dies tantum durat, nisi variolae sint mali indolis. — D. Pitcairn accersitus filiis natu maximi D. D. [illegible] variolis laborantis, retrocesserunt & disparuerunt variolae, quapropter ℞ G. instituit, & [illegible] exhibuit, unde seq. die apparuerunt, at dein introcesserunt, eandem methodum secutus iterum apparuerunt, pro tertio disparuerunt, et eandem method. [illegible] cuius pro tertio etiam, rursus eruperunt, nec amplius retrocesserunt. [illegible] eandem secutus est methodum in filia natu maxima D. de Nairn, in qua tamen semel tantum disparuerunt. Ante tamen ℞ G. tentanda sunt Cardiaca, ut pulv. Comitiss: Lap: Bez: Lap: Goa, Bez: min: sal, sp: & troch: vip: &c. in mixturis, vel [illegible] culo, & Syr: Cariophyl: vel Alkerm: vel aq. C. B. & vino Hisp: &c.

Morbilli: Invadunt ex feb: eodem plane modo ac variolae, i.e. augente ad 3 diem, et 4to apparent morbilli, & feb: paulatim mitigatur. — Sunt instar macularum scorbuticarum, sed ab iis distinguuntur, quod his apparentibus par. & [illegible] mitigatur feb: & contra in morbillis. A petechiis distinguuntur, quod morbilli apparent 4to, petechiae non ante 7mum diem: Morbilli majores sunt, instar capitis clavi minoris (atachel), petechiae minores, instar capitis aciculae minoris. Punctiones iis sunt minores, et radiis donantur. Vide cap: 7. praeced. annot:

Pirles[?]. Eodem modo ex feb: invadunt ac variolae et Morbilli. Cutem elevant instar pellis anserinae. Parvisculae sunt eruptiones, nec unquam ad maturationem perveniunt. Eodem modo tractantur ac praecedentes.

Crystalli pariter attendantur.

Cap. 6. Si feb: post macularum eruptionem non mitigetur, fit feb: scorbutica non morbillosa.

Cap. 7. Feb. Hect: dependet non solum ab ulcere pulmonum, sed etiam aliorum viscerum, imo et a quovis profundo in quacunque corporis parte; in talibus enim materia purulenta circulationem ex sang: obit ob vicinitatem ulcerum ex vasis majoribus.

Cap: 8. Si in hoc morbo dolor vomit: vel post amarg, transit in regularem [illegible] intermitt. — Differt a feb: hectica, quod in ea, ut et etiam in intermitt: rigores et ex frigore adstantibus perceptibili comitati sint; in Hect: vero rigores insensibiles. Patientes laetu calidi sunt. 2. quod in hac et intermitt: urina est tenuis, in Hect: crassa. 3. In Hect: pulsus semper eodem modo laedi afficit. in continua periodi et errat: remissiones et exacerbationes patitur. — In feb: Hectica, continua periodica et errat: fit tantum morbi Remissio. in Intermitt: fit intermissio. Vide lib: 2. c. 2. — Sal febrif. specificum est: Chamaedrys etiam febrif: est. — Ast feb: compositae ex continuis et Intermitt: et oportet tractantur medicamentis amaris, addito purg: post [illegible] 11mum diem, qui est Criticus ultimus; Dies enim critici sunt 7, 9, 11. — Feb: Hect: [illegible] remittunt et moderantur, aliquando exacerbantur. Supervenit sudor semel in die, post quem morbus et pulsus exacerbantur. — Hae febres sunt longae durationis et continuam viris dispendia a sudoribus quotidianis, adeo ut nulla in his fit Crisis.

Lidem[?] quamobrem [illegible] semel exhibita uno impetu ad finem perducunt continuas [illegible] quae per vices [illegible] intermitt. [illegible] Bagl: p. 150.

Cap: 9. Parox: frigidus durationis longioris, malus. — In Quart: parox: frigidus semper diu manet. — Quotid: materia Gallis pandemia, & corp. et frigus in ea [illegible] Tertiana [illegible], & frig. longius; Quart: [illegible], & frigus longitudinis, ut et totus morbus diu continuatur. — In Quotid: lingua phlegmate albo obducta, & qualis [illegible] pidus, unde ab Authoribus causa Pituitae tribuitur. In Tert: lingua flava, & [illegible] amarus, unde Bilis hic culpatur. In Quart: Patiens torpidus, melancholicus, unde Melancholia seu materia crassa culpatur.

Causa. Materia nunquam in sang: refunditur, nisi aliquantulum attenuata ut in variolis, in quibus sequitur feb: secundaria. Ex vero materia refunditur [illegible]

...unde et nat: sang: contrario alt, mole sang: sistit, unde pulsus parvus, frigus ... alter: mat: paulatim a sang: attenuata, insequitur calor intensissimus; a praece... ... enim frigore pori ita occlusi erant, ut nulla fuerat caloris transpira... ... unde calore tandem interne collecto et aucto, frigus superat. et fit intenso ... gioving; et dein violenter erumpens, sudorem producit quo mat... ... evacuatur. — Quo plus sudatur, eo citius fit cura, etiam aliquando absque ... — Si sudor est viscosus et lentore comitatus, redit parox: si vero ... liber, finitur morbus. — Caveatur alvi fluxus, periculosus enim est. — ... Haemoptoes et morbi pectoris prorsus non exhibenda. — Sudor ... eodem modo excitatur in feb: intermitt: ac ab immersione in aq: frigida. — Semper vomendum et purg: ante usum Cort: peruv:

... a fit per expulsionem et evacuationem mat: morbificae, per vomit: saepius repe... ... surg: repetitas forte; et sine evacuatione per cort: peruv: D. D. Pitcairn ... hunc morbum consistere in lentore et crassitie mat: morbificae, cuique ... Cort: peruv: eam radicaliter eruere, attenuando scil: et aperiendo, ita ut li... ... ei concedatur sang: circulatio. Omnia enim amara sunt attenuanti... ... Chamaem: Cort: sassafr: et hunc morbum curant. Alii asse... ... Cort: peruv: in hoc morbo concentratione et incarceratione mat: ... operari, hocque probant ex eo quod Clyst: et purg: levis post cessa... ... feb: ab usu Corticis, morbum redire faciunt, quae maxima est ob... ... difficultas contra hypothesin D. Pitcarnii.

Cort: peruv: ab effectu suo apparet esse opt remedium in omnibus sang: ... et turbata mixtura, ut Diarrh: immoderata; nimio lochiorum ... fluxu, qui a serositate procedit, et venae ... apparent, ... praesertim in debilibus accidit; in Haemoptoe et vomitu sang: etc. Quia ex ... comperlus est illud esse opt sang: restaurans; sed quibus partibus et ... modo operandi id agat, hactenus ignoratur. Vid Excerpt: ex Bourdf. ad fin... praxis.

Surrexit Febr: inter: mit: in genere est Vernalem, quae a Februario in Augustum, et Autumnalem, quae ab Augusto in Februarium dominatur. Distinctione necessaria ob varios mores, sym: ptomatum, exitus, durationem, urationemque febris; quin una etiam fugat. Boer: et oss. 1 maj.

Nott. Nott. Nott.

Cort: Peruv:

Chirurgorum Comes.

Flos calcis cum alb: ovi glutin bonum.

vel. ℞ Gum: Tragac: Mastich: Arab: thur: āā ℥v. alb: ov: Nº ij. agi=tentur opt albumina, atque dum spumam ejiciunt, quam aufer, et quod tubus est limpidus et aequale volvens, mox reliquorum pollinem inspergo, atque lotum ad quandam inter extrema mollia et dura studiose permiscendo consi=stentiam producito. p. 702.

Gossipium ustulatum ad haemorrag: sistend: a secta arteria opt. p. 703.

Ebulus, sambucus, sideritis, palmae, pini, taedae cortices, draconij fol: recent: quas fraga gignit, herba, anagallis, salix, androsaemum, astragalus, philomoneu... ... symphytum petraeum, araneae tela sed ea praecipue cui per pistri=no pollen insederit! haec enim valenter exsiccat, equisetum, Chamaepitys, Arnoglossum (quod in jungendis vulneribus nulli remediorum cedit), salix, Cen=taurium minus, fol: pentaph: oramia, fol: hederae recent: gummi seu hu=mor glutinosus folliculis ulmi inclusus, coralli ex combusta et Empl: bar=barum: sunt exsiccantia et moderate astring: et medici naturae inter cica=trizantia et incarnantia. ib. 688.

Bals: Lucatel: vulner: internæ et Diureticæ opt. in Empyemate.

Sang: et Urina dicunt flatulenti, et bullæ et spumæ generant à flatu viscida mat. incluso, et quia exhalare non possunt, maxim in humores attollunt, suntque hæ bullæ variorum colorum pro natura humoris in quo flatus includitur. Nulli sunt proprie flatus in Sang: aut Urinâ, quæ fluida sunt, sed ita viscida sunt, ut aerem semel ingressum includant et retineant dum rarescat et impulsus in bullam faciat.

Bonitas Sp: vini hoc modo opt. probatur. Sumatur vitrum parvum [illegible] et angustum, impleatur ad medias Sp: vini, concutiatur, et quo diutius persistunt bullæ, eo melior est Sp: vini. Hæcque methodus præstat omnibus [illegible] aliorum. ✝ Instit: ss. 62.

I. de Glene Invenis cujusdam curam agens dum [illegible] laboraret, Patiens dimidium circiter horæ ante mortem ei in aurem dixit, se in coitu esse cum [illegible] feminâ et statim semen effudit. ac [illegible] 23 [illegible]: acula.

Pollinctus ✝ est lotus abdominis; ex quo exemptis intestinis, omento, mesenterio omnibusque sub diaphrag: sectione abdominis cruciali facta, cavitas bene mundata et Sp: vini lota, repletur gummis aromat: pulverisat: ut Myrrhâ, thure, Benz: [illegible] aliisque [illegible]
odoris suavis, ut major: origan: Rosm: et sim. cum [illegible] thure. ✝ est etiam thoracis, quod fit ablatione sterni, ut in Analomiâ, et exemptis [illegible], pulmonibus, et corde, ✝ non exemptis, [illegible] cavitates Sp: vini et [illegible] siccis, et replentur thorax. [illegible] ac abdomen. ✝ Excerpta Salmon in Chartâ initii libri.

Quomodo pus farinam ✝ alios excernitur: fit ✝. [illegible] miscendo cum Sang: ut circulatione fertur ad renes, aut intestina, ubi secernitur à Sang: et transit per ureteres ad vesicam; ✝ pori diaphrag: ita sunt aperti ab [illegible] calore [illegible] nim. est Empyema ut pus transudet et ✝ in intestina, ✝ in vesicam per poros foras intro spectantes transit. ✝ Instit: ss. 80. 8.

Exploratorius argenteus ulceri maligno introductus, voluti ab igne, coloratur.

Pus ✝ aq: (in Hydrop:) si nimia copia extracta, gangrænam et [illegible] ✝ [illegible] quia inde fit frigefactio nimia partis; pus enim ✝ aq: dum in corpore morantur, suum habent calorem, imo aliquo maximum. ✝ 2º quia inde sæpius fit vasorum collapsio; fibræ enim partis incumbentis prius distentæ et recedentes [illegible] constringuntur et coarctantur, unde fit [illegible] in vasis, et exinde Sang: circulatio sistitur, unde fit Gangrænæ ut et etiam frigus nimium partis.

Aurium lotio fit injectione per siphonem vini [illegible] [illegible] ✝ vini [illegible] Sp: [illegible] Sp: vini simul mixtorum; ✝ hydromellis calidi ope siphonis.

Feminæ hystericæ suffocatione (hysterick faintings) habent pulsum paululum nihil mutatum, colorem ordinario remanentem ✝ potius meliorem; sed si in veram syncopem accedant, ex facie cadaverosâ, [illegible] [illegible], etc. [illegible] [illegible] sunt.

Ubeii cancro affectis faciei color à naturali non recedit, sed genas potius roseas habent. Bagl. 113.

Compendium Cau[illegible] et Cura[illegible] omnium Tumorum.

v. [illegible]: ad hoc.

Tumor est eminentia partis extra vel supra aliam, à partis vel humorum [illegible]tione vel influxu. Hic excluduntur Tumores naturales, ut Apophyses et Epiphyses, et non-naturales, ut Uterus gravidus.

1. Ra[tio]ne partis fiunt 1°. Hernia Abdominis, Umbilici, Inguinis, et Scroti; ut [illegible] a [illegible] Enteromphalos, Epiplomphalos; Bubonocele; [illegible] ab Intestinis, [illegible] ab Epiploo, Enterocele, Epiplocele. 2. Ani et Uteri prolapsus. 3. Ganglia à [te]ndinis ruptura, vel extensione nimia. 4. Staphiloma et Mydriasis à Corneae [ru]ptura vel relaxatione nimia. Cura. Hae omnia uno eodemque modo curantur, viz. [a]stringentibus et fasciis, aliisque instrumentis commodis. Sic in Herniis post par[t]is in situm naturalem repositionem ulimur Empl: contra Rupturas, oleis et fomentis [a]stringentibus. In Ani prolapsu pulv: Gallarum, decoctis ex vino rubro austero, vel [illegible] terrata. In Ganglio, Lamina plumbea, succo Acaciae, et Hypocistidos, et sim. ex Empl. resolvente, denique omnia ut fibras laxatas constringantur.

2. Ra[tio]ne Humorum dantur Tumores multiplices, imo et innumeri, ex non solum pro causa fluida nostra naturalia, sed etiam praeternaturalia, omniaque quae in sanguinem inducere possunt, renovant. Sic 1°. Ra[tio]ne Sanguinis in Art: laxatis fiunt Aneurismata, in Ve[nis] Varices, ut in Cirsocele, Haemorrhoidibus, aliisque venis à corde remotis. 2. Ra[tio]ne Sang. in partibus solidis extravasati fiunt Sugillationes, Ecchymoses, Ecchymomata. [illegible] omnia si [illegible] astringentia ex succo Hypocistidos, Acacia, praeparationibus ex [illegible] [illegible], [illegible], ex [illegible] [illegible] curare nequeant, ad Chirurgi[am] [illegible] recurrere; sed. 3. Ra[tio]ne Sang. in fibris vel poris [illegible] stagnantis, fiunt [illegible] et inflammationes omnes, quae varia [illegible] partem affectam sortiuntur nomina. Sic Phrenitis et inflammatio membranarum cerebri, Ophthalmia oculi, [illegible] musculorum oculi, Gargareon Uvulae, Paristhmia Amygdalarum, Angina Colli, Pleuritis pleurae, Peripneumonia membranae pulmonum, Paro[nychia] a unguium, Phymosis et Paraphymosis Glandis et Praeputii, Priapismus [illegible] caverno[sorum] corporis penis, Ranula venarum et musculorum sub lingua, Anchylops [ca]runculae lachrymalis, Bubo Inguinis, Bronchocele Gutturis, Dermo [illegible] [illegible], [illegible], Gutta Rosacea totius corporis habitus ex praecedente febre, [illegible], et Chalazion palpebrarum. vel Gutta Rosacea numquam repellenda.

[C]ura: Hae omnia, nisi vel Critici sunt, ut in Gutta Rosacea, aliisque febribus ter[mi]narum, vel in corpore cacochymico vel morboso, ut in Bubonibus, Phygethlo, [illegible] Phymate et tumoribus sub axillis et parotidibus, vel [illegible] profundè sita et [illegible] Repellentibus satis tutò aggrediuntur, ut ol: Ros: Cer: [illegible], ling: Diapom[pholygos] [illegible] et sim. ex [illegible] potionibus frigidis, et internis evacuantibus; [illegible] intra [illegible] vel quinque dies non proficientibus, ad resolventia confugiendum; [illegible] ad Fomenta Cataplasm: ol: et sim. ex fl: Sambuc: Chamom: Melil: [illegible]: [illegible]: Majorana, quae non solum discutientibus sed et paulatim emolli[entibus] [illegible] omnia [illegible] majorem vel minorem tumoris progressum, vel [illegible] maj: [illegible] min[illegible] stabilientis causam vel obstructionem, nunc Resolventis, nunc Ma[tu]rantis [illegible] mica panis ex lacte [illegible] [illegible] effectu. Hos vel aliquot dies [illegible] et [illegible] dolore et tumore augentibus, Maturantia sola [illegible] maxima ex parte mollia, in usu sint, ut Cataspl: ex farina [illegible] [illegible] Althaeae: Malva, Melil: Ung: Dialth: Butyro, [illegible] [illegible], et sim. In caeteris ut in Ulceribus procedendum.

4. Ra[tio]ne Lymphae [illegible] in cavitatibus [illegible] vel influxu, fiunt [illegible]:

vel etiam [illegible] ab intern: in [illegible] Epiphora, et sim.

Ra[tio]ne partis.

Cura: vel [illegible] ad Ann: et annot. Chirurg. vel Operationes.

2. Ra[tio]ne Humorum. et 1mo Sanguinis. § 2.

3. v. Boer: [illegible] [illegible] in genere. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in glandulis. Boer: [illegible] vel Ophth. ad hoc Comp: [illegible]

Cura. vel maligni sint, ut in [illegible]

℞: vini Camphorato. [illegible] Camph. [illegible]

[illegible] vini, [illegible] [illegible] Ros: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nigra [illegible]

4. Lymphae. [illegible] 1.

2. 3.

..., Hydrops Thoracis, Abdominis, Hydrocephalus, Hydrocele. 2. Ratione quidem in exterioribus corporis stagnantis, fiunt Ascitides, Anasarca. 3. Ratione quidem tuberculorum parvulorum more in superficiem corporis expulsi, fiunt Crystallinae et Hydatides. Quae omnia poros interne et externe reserantibus aggrediuntur, vel purgantibus Hydragogis ex rad: Ebuli, fl: Sambuci, cort: Frax: aliisque, cort: rad: et ... aperientibus, ut in Hydrope. Diureticis interne et sudoriferis ex volat. ... et obs. ad. ...

2. Crassit: seu Phlegmatis. ✝ Bronchocele in collo ✝ Chirurg. Δ majorem opus deterrere ... fugiat: Quo Melanchol: et Spissitudinis.

5. Ratione Lymphae magis vel minus crassae fiunt Oedemata, Meliceridesque, Atheromata, Steatomata in corporis habitu, et Scrophulae et Strumae in glandulis; Quae similiter crassitiem illam attenuantibus, et e corpore educentibus non ... dant, ut violenta purg: Phlegmagogis, Diureticis, ... praeparatis ex ☿, Liq: Sudorificis et sim. excepto forte solo Oedemate; ad Chirurgiam devenienda erit.

6. Ratione Crassitiei et Spissitudinis, fiunt Schirri, Modis emollientibus et discutientibus et interne et externe curanti, ut pil. et empl. ex Gum: Amon: Galb: Myrrha, Empl: de Melil: compos: et sim. Hic etiam commendantur fomenta emollientia et discutientia, praeparata ex ☿, pulv: alcalicis, et sim. aciditatem nimiam sanguinis infringentes, quae aliquibus in omnibus fere tumoribus usurpantur, eo quod aciditatem humoris in omnibus fere ... culpent. ✝ Boer:

^ et Ulceri,

4to. Salsedin: vel Acredinis. seu Bilis.

7. Ratione Acredinis seu Salsedinis, fiunt Aphthae in ore et lingua, Achores ... Tineae, Favi, Phydracia in Capite, Lentigines in facie, Sudamina, Formicae, Epinyctides, et Phlyctenae in cute; Erysipelas in partibus membranaceis, Herpes miliares, Scorbutus, Impetigo, Scabies, Psora, Lepra, Contantiae ejusque species, Vitiligo alba seu leuce, alphus et Morphaea, et Vitiligo nigra. Quae omnia varias induunt formas, pro ratione maj: vel min: acredinis, tenuitatis vel fixitatis, pro ratione maj: vel min: ex aliis humoribus commixtiones; et idcirco nunc magis nunc minus ... naturae inflam: participant. Hic commode ... sori possunt Arthritides, ut Ischialgia, Chiragra, Gonagra, Podagra, ... Salsedinis fixae ... in ... depositae sint effectus. Sic scorbutica et Arthritici differunt solummodo respectu partis affectae. Hic etiam ... vere ... Carbunculi, similesque tumores venenatos a mâ ... inductâ. Cancer etiam ex causa ... corrosiva ... in sanguinem inductâ. ... maxima ex parte in acrimonia fibras magnopere depascente, et earum texturam mirabiliter alterante, consistere resultat. Salivatio.

✝ ... Oper. Cancri mammar: ✝ Boerh:

Cura.

Cura. Haec omnia variis salsedinem illam sive involventibus, sive ... fingentibus, sive obtundentibus, sive educentibus aggrediuntur modis, ut primo ... Robaslis, Refrigerantibus ex Sempervivo, Portulaca: Violi Borag: Buglos: Fumar: Hepatica, et sim. 2o. Modis temperatis frigidis respective et ... ... ut omnino ex Scolopend: Ceterac L, Herb: Capill: et rad: Aperientibus ... quae omnia vel cum vel sine purgantibus. 3o. Modis sanguinem dulcificantibus ut omnibus ex Liq: sudorificis. 4o. Modis Alcalicis. 5o. Modis acidis ... solvis, ut Acetosa, Succ: Limon, Aurant: Aq: mineralibus, &c. 6o. Modis ... ... vol: donatis, ut rad: Raphani, Cochlearia, Nasturt: Aq: Trifol: Aquat: Bardana, et sim. vel cum vel sine purgantibus. Quae ultima in adultis sanguine languido et fixo, et ad expulsionem incapaci, praeditis, sunt necessaria. His non proficientibus, ad ☿ ... confugiendum erit.

3. 8. Ratione Flatus

8. Ratione Flatuum, fiunt Tympanitides, Tumores Flatulenti, Pneumatoceles, Pneumatoceles. Quae Modis Carminativis Diuretis externe et interne curantur. Causantur a poris intestinorum et cutis obturatis ... ✝ ab intestinis ... ... quadam ... ✝ a ... crass: ... Diuretica ✝ carminativis quae plures in stomacho vapores attenuant ... ... minime potest. ✝ Waltham. Zyp.

9. Ra^ne Puris, fiunt Ulcera, Abscessus, Aposthemata, Empyemata, Sqi Corpor:, Pulmonis Vomica.

10. Ra^ne Nutrimenti ψ imbelliti, ψ copiosioris, ψ ra^ne dissolu^nis praeter: fiunt Polypi in Naso, Condylomata, Mariscae, Thieg, Mora, et sim. Sarcomata in a̅no aliisque partibus, Parulis et Epulis in gingivis (Vari et Anchyloses in articulis, Nodi, et exostoses in ossibus,) Pterigium et Pannus in oculis. Quae omnia Medicis astringentibus, ut Bolo, et Acidis corrosivis, ut Vitriolo, aggrediuntur; ψ pulv: ex calce viva cum vitriolo.

11. Ra^ne partiales ψ totalis Nutrimenti Defectus, fiunt Gangraena et Sphacelus ... [illegible] ... extracto et sacch: rubro, ... Charas 294.

12. Ra^ne Ferm: ... fiunt Morbi ... Petechiae omnes, Quae Alexipharmacis et Cardiacis ... expulsionem adjuvantibus aggrediuntur, ut in omnibus aliis tumoribus venenatis faciendum.

13. Verrucarum, Myrmeciarum, et Clavorum, et Tumorum in infantibus à Matris imaginatione apparentium consulta fere obliti sumus, cum ad nulla praedictorum ... referri queant. Delentur maculae ... Charas 162. ... ψ postea.

Dracunculus est genus Vermiculorum ex poris ... in magna copia erumpentium; etiam genus tumoris planus, albus, et non admodum latus qui frequenter ... [illegible] ... Burnet.

Herniae umbilici. Pneumatomph: Hydromph: Enteromph: Epiplomphalos. Entero-pneumatomph: Epiplo-pneumatomph. etc.

Inguinis. Bubonocele.

Scroti. Enterocele, Epiplocele, Pneumatocele, Hydrocele (umbilicus Horizontalis.)

Ad verrucas conducunt pulv: sabinae, ψ fol: portulacae ... in palpebris. Item vitr: pulv: ... Item ... agrim. Rutae, bene contus: ... Charas ... ex aceto ... Item ... ad ... sang. effusionem ... ψ ... farin: ... Lini cum ... ψ terram urinâ ... ψ Racemos ... in cineres ... in quo infundantur ... Ung: ... Ol. Tartari tangantur quotidie, saepius per mensem vel amplius, et decidunt. Tangantur succo Tithymali minoris.

... formae dicimus flos ... Burnet ... fa 8.

Ra^ne Puris.

Ra^ne Nutrim:

V. Exostosis ... et inclusis.

ψ Pannel. Chirurg. ... Charas.

Ra^ne Ferm:

Succ. Sedi majoris, ut et folia, ablatâ membranâ interiore, clavos et verrucas sanant. Item Mica panis subnigri cocta cum lacte ad consistentiam ... cui addo Ung: Rosati q. s. ψ ... Aloes. Item Empl. ... Item fol. Sedi maj: depilat. et lintea ... cum pane ... immersa ... clavis. ... Burg... ... ammon:

Chirurgiæ Pars Prima.

De Operationibus in Chirurgia utilibus.

Lib: 1mus. De Fracturis.

Cap: 1mum. De Fracturis Capitis diversis.

Sect: 1ma. De Fracturis Capitis in genere.

De his in hac sectione vide la Charriere p. 197 ad 224.

vide annotata.

Cau. [illegible] est vel 1. Contusio, quæ duplex est; Una, quæ pars in profundum [illegible] sicut in [illegible] accidit; altera, quæ pars constringitur in sua substantia sicut in corpore spongioso. Prima fieri nequit, cum [illegible] fracturâ vel fissurâ, eaque vel manifesta visui, sensui et instrumentis; vel [illegible], ut in contra-fissura; vel intermedia, ut in fissurâ capillari [illegible] in fragmenta rumpatur, quæ vel separantur à se invicem vel non. [illegible] vel quæ partes sano ossi adhærent, vel quæ non, vel quæ [illegible] [illegible] relinquit. Præterea fracturæ sunt vel simplices vel compositæ, [illegible] longæ, latæ, vel profundæ; rectæ vel obliquæ; transversæ, rotundæ, triangulares; anticæ vel posticæ &c. Fracturarum ergo genera quatuor aut quinque: 1. Contusio. 2. Fractura. 3. Fissura. 4. Sedes. [illegible] contra-fissura nulla datur.

Signa fracturæ cum [illegible] sunt vomitus biliosus, [illegible] immediatè à [illegible] [illegible], vertigo, [illegible] [illegible] [illegible] contusio [illegible] p. 93 [illegible] [illegible] [illegible] non. Et [illegible] si cutis non sit integra, [illegible] signa. [illegible] [illegible] atramento loco notetur, ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non in principio [illegible] ut vomitus [illegible], [illegible] motibus, tumor, [illegible] [illegible] si in vicinia sit [illegible] nequit sanari, [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] etiam [illegible] [illegible] rima [illegible] duram matrem penetret [illegible] [illegible] vel rimam [illegible]. 2° [illegible] cranii [illegible] atramentum non videatur. Si dura mater vulneratur, adsunt vomitus et [illegible] [illegible] continua.

x vide duas instantias Bibl. 560. ex Dionis

+ Ensi. Mss. p. 212.

De fissura cariosa [illegible]

Signa.

[illegible] si vomitus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Charr: 218.

ichor.

§. 2. De Fractura Cranii non penetrante vel Annotata.

Si talis fractura accidat cute integrâ, instituenda est [illegible] [illegible] cranii crucialis vel triangularis [illegible] [illegible] [illegible] est pericranium, ut fissura detegatur. Deinde os nudatur plumaceolis siccis [illegible] tegendum [illegible] [illegible] labia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] atramento maculando est, ut prius, tegendum, et vulneris labia [illegible] [illegible] fissura [illegible] est instrumentis [illegible] [illegible] [illegible] fissuras quas atramentum absorpsit penitus aboleatur, et os [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apparatu plumaceolis siccis tegendum est et labia vulneris [illegible], imo [illegible] [illegible] apparatus laudabilis: Deinde ossi inspergantur [illegible] [illegible] [illegible] plumaceolis siccis tegendum, et labia vulneris [illegible] [illegible] plumaceolis [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ergo [illegible] [illegible] cranii, [illegible] fissuræ profunditas detegatur. 2° Ut [illegible] amoveatur. 3° Ut sanies in fissura non detineatur, et os corrumpat. [illegible] etiam [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] Cephalicorum [illegible] inspersorum et plumaceolarum siccarum [illegible] [illegible] [illegible] ablegavit [illegible].

– ad conti in fronte.

– a communi, Bals. [illegible] [illegible]

– Aquapone. Munk. 21.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impone [illegible] [illegible] Manna thuris, Sarcoc: [illegible] rad: Opopanacis, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

aro iuvat os generetur. Sunt tamen qui satis tuto ossis alterati exfoliationem naturae relinquunt, et magna cura prolongant, attamen satis tuta

§. 3. 2° Fractura cranij penetrante, signa ejus praecedentia

Fractura vocatur est, vel larga & spatiosa (de qua postea) vel parva et arcta, vaga, vel solitaria, vel depressione comitata.

Cura. Si sit arcta et solitaria et exitus materiae detendentis sup Duram Matrem impediens, vel si ossis partes Duram Matrem pungant, omnino trepanandum est. Dilatata igitur plaga (si adsit, et non satis magna sit) in crucem, vel incisa cute et pericranio (si nulla adsit plaga) iterum vel triangulis, ut loci diversitas postulat) et vulnere tractato ut Sect: 2. seq: die, aut ad summum tertio, casiolo pulvinari imposito, et vulneris lavis linteolis (carpiis) bombyci obductis, loco, osse ad situm latus infimum imprimatur vestigium terebro, modo perforatorio, in quo immittatur modiolus mas, qui firmiter et aequaliter circumrotandus est manu dextra, et sinistra fronti imposita premendus, donec vestigium conveniens pro firma circumrotatione modioli feminae cranio imponatur, qui modiolus magis caute usurpandus est, et saepe lavandus (praecipue postquam obtigentur ossis ad Diploen, quod cognoscitur Haemorrhagia & mutandus ne nimis caleat, vel oleo Rosarum immittendus (quod pluribus a multis improbatur, eo quod oleum ossi inimicum sit, et instrumenti aciem obtundat) donec ossis pars incipiat movere, quae vel levatorio vel forcipe folio myrti eximenda est, vel instrumento in foramine circumducto prehendenda; deinde levigandae foraminis labra instrumento lenticulari dicto, ne carae ijs radiis et inaequalibus vexetur laedatur; detergenda etiam omnia sunt quae intus oberrantes Duram Matrem possint attingere, ut limatura ossis, sanguis, etc. Postea sattis applicetur Durae matri sindon filo appensa ex serico rubro, vel panno lineo, & colore et: ros: tepido, imbuto (ut puris acrimonia emolliatur & inflammatio prohibeatur) foramen trepani obturetur plumaceolis siccis, ut imbibatur materia in Duram Matrem descendens, et reliquus ossis detecti ubi ille injicitur, tegatur, vulneris labia digestivo tractentur, et partes vicinae ol: a. unguentibus: pure apparente laudabili quod singulis diebus singulis relinquendae vero Meningophylacis expelli debet, sindon imbuatur melli rosaceo donec membrana valida appareat postea usque sit sola, modo plumaceolis siccis, tamen vero meninge quam pro foramine et alterati pulv: Cephalici vel ejus praeparati tractentur (si sc. opus sit, aut natura relictus) ut et vulneris labia laxentur, et Empl: Diapalm: compressis in vino rubro aut Dec: Cephal: madefactis, et facta (convenienti) dieta. Empl. de Betonica loco supra apparatus, vel spl. in modo... cerato eiusque apparatum usque et ordinariam ... adu...

Obs. Non trepanandum (si ullo modo evitari potest) 1. in suturis. 2. in ossis temporis. 3. in fracturis largis. 4. in sinu ossis frontis. 5. in ossis parietalis superioribus. ... 6. Raro in partibus capitis in ... quam frontem... et ... 7. ... ob periculum. ... tamen nonnulli qui trepanum omnino improbant ob periculum, et existimant materiam noxiam posse per arte? naturae expurgari, quovis topica sunt: alii ... ma: ut ... alii aiunt consumatur ex Gum: Elemi, Bdellio, Ca: Arom: Bacc Lauri, Aristolochia, etc. exhibent etiam propolu composit... ex ... Galang: Cardam: Cariophi: vino salv: Rosmar: spir: longo ... et hoc primo inflammationem deinde febrem et tandem mortem inducant, rejicienda sunt.

Cura. Si fractura sit tam larga & spatiosa, ut materiae exitus sit liber, non trepanandum est; nec vulnus scalpello dilatandum, sed eodem modo procedendum, ut prius, post trepanationem, sc. sindone, modo Durae matri imposita

---

Pannolata ad ossis exfoliationem impediendas fiant Foraminas penetrantia ad Diploen cranij, vel ad medullam in ossibus ... praeditis. ... Glandis infortis.

vel Bl. ad Modiolus. Lamina plumbea de Bellosta non alienda sit sub... vicio sang: coagulati sup D: Matrem, donec ille evacuetur, et ... potest ... dies vel ultra, ... symptomata ... utile et saepe maturus pars lini optimi, vel serici crudi.

Bals: album. ... rosi et panno sp. vini. ... Bibl. 554. etc.

Figura Laminae plumbi Bellostii



Antiqui et moderni convenient in hoc quod ... sit membranam et ... vibrationes ... maxime. Bellosta. ...

... solvata ... cum supercilio.

... 7. in medio ossis coronalis, aut occipitalis, et ... D. matri conjunctam. 8. supra sinus ... laterales qui a latere ossis occipit. situantur. ...

... ut carnosas fibras ... 225.

+ Bibl. 550.

imposita, et: Ros: tepide imbuta, et filo appensa, etc. Si Dura mater vulne-
rata, eodem etiam modo procedendum erit, usque dum membrana mundificetur;
Dein incarnetur Ung: ex Betonica tepide foramini infuso. Sed si Pia mater vul-
neretur (quod evenire fere impossibile sine laesione Cerebri) tunc oleosa et unctuo-
sa omnia suspicanda veniunt (eo quod cerebrum molle et humidum corrumpant) et de-
siccantia approbanda, qualia erunt Mel ros: Syr: e ros: siccis, cum pauco ali-
quo Aq: vitae, Ung: etiam calidum Fabricii ab Aquap: a multis commendatum, ut
et ejus empl: Cephal: supraimpositum. Dein in his omnibus os plumacealis siccis,
et vulneris labia, sarcoticis, ut prius, tractanda.

§. 4. De Fractura Cranii depressione comitata cum cute integra.

Cum nulla in adultis dari potest Cranii depressio (ob ejus duritiem) sine
fractura aut fissura, statim incidenda cutis et pericranium in crucem ✝ triangu-
lum, et plaga plumaceolis dilatanda. Seq: die fissura hacce apparente ✝, o
In depressionis medio (quae si larga est, ope Elevatorii triploidis in eam
immissi et perpendiculariter elevari, debitum debet) si e contra, ita arcta
sit, ut instrumentum admitti nequeat, trepanianda erunt bis aut ter depres-
sionis latera, et foraminum interstitia incidenda (non solum ut os depressum facilius
elevetur, sed ut ossa cerebrum pungentia eximantur) ✝ 2do. In depressionis latere,
qua si larga sit, ope Elevatorii in eam immissi, restituenda est depressio; si
contra arcta, trepanandum erit semel aut bis (prout depressionis magnitudo re-
quirit) supra latus sanum fissurae, et foramina in sectilibus incidendum, ut ope Elevato-
rii commode restituatur depressio.

Obs: Si aliquo in adultorum craniis depressis (post crucialem incisionem, ut
prius) nulla appareat fissura, et adsint gravia symptomata, vomitus etc. ✝
circumspecte in depressionis medio infixo, elevetur depressio, et ossis plaga tracta-
tur, ut Sect: seq: Sed si e contra symptomata vexent, nullo modo dubitandum erit cra-
nii tabulam ✕ secundam fracturam ✝ fissuram pati, adeoque sine mora trepani-
andum erit in depressionis latere, non solum ut elevetur cranii depressio, sed ut ma-
teria per fissuram ovatam in Duram Matrem descendens evacuetur.

✕ In omnibus Contusionibus cranii simplicibus sine plaga aut depressione; imi-
tatione procedere cutem agminam calida caputii imposita, ut et fomenta, Cephal: et empl: Cephal: (in infantibus ... in ... imo, in his, quoniam contusio depressione comitata (cum ... alio modo depression- adhuc molli sine fractura accidere potest) neque ulla ✝ empl: applicata, nam
... in his tractari possunt (nisi cum Pareo, ...) parti applicata, nam
es in his tractari possunt (nisi ex Pareo, cucurbitulis; parti applicatis, nam
in ... nec incidendum est Pericranium, nec immittendum in medio depressionis
... Elevatorium, ut quicquid aliud ut in
... pressione eam majorem efficias) Elevatorium, ut quicquid aliud ut in
adultis faciendum erit.

§. 5. De Punctura, sive Dolatione Cranii. ✝ annotata

Punctura hacce, si cranium non penetret, efficienda erit terebris ✝ radoriis
a Scultelo descriptis Tab: 34, et incarnanda pulv: Cephal: plumaceolis
tectis (quum etiam incarnationem admittit Dolatio cranii, et nullam opera-
tionem manualem requirit) Sed si punctura cranium omnino penetret,
trepanandum erit modiolo primo mari puncturae immisso, dein lamina
etc. uti prius. In omnibus ossa dolata et vulneris labia ut prius tractentur
Intermis etiam adjuvandae curae, ut Clyst: Purg: potion: etc. Aer etiam
circumambiens, [pruinis] calidis temporibus, et victus sit maxime ex parte ex
Panadis, Ptisanis, Jusculis, et similibus.

§. 6. De Fractura Nasi.

Si sit ex ossis partis prominentibus, ✝ in cavitatem depressis, ope
...

^ fiat ✝. 3. Si inflam:
mata, et apparente
parti inflammata
pars ol: amygd: dul:
ov. viol. ✝ pomu-
plavis, quibus etc.
Sp. vini. Charriere
321. fiat etiam ✝.
Si cerebri pars
tumentiatur; si vero
violentiae, Cephale
etc. ib.

✝ Annotata.

Curatur etiam calu
aquae uti aut qu-
ibus molaris in
partem affectam
semel ✝ saepius in
die. Pitcairn.

✕ ✝ Bibl: 253 et seq:
de depressione
cranii infantis. etc.
✕ licet fere fastenda
to the perforator
... Bibl.
✕ tali ...] [5. 4.

^ ✝ trepanno raspa-
torio, seu Exfoliativo.

✝ De vulneribus
Nasi.

frustuli ligni panno tincto ꝑ colore involuti, et in aceto imbuti; et ope digiti indici ꝑ pollicis exteriores conformati, et applicati ꝑ de primordio ꝑ observanda erit; deinde canula plumbea intus, et Emplastro, compressis, et fascia (de Solis d'Amintas dicta) extus, spatio 12 dierum, si ossis caries non superveniat, cura perficiatur.

Inungitur pars ol: Ros: et acido, et imponitur Empl. Defensivum ꝑ Cerati Defensivi.

§. 7. De Fractura Maxillæ inferioris.

Fit ꝑ longitudinaliter ꝑ transversaliter, ꝑ in plurimas partes, quæ pressione digitorum intus et extus restituenda est, et compressis, et fasciâ (Chevestro dicta) usque in 20 diem (quo tempore curari solet) conservanda est. Quidam instrumento ferreo, colore investito, loco compressarum utuntur. Cibo Patientis talis esse debet, ut fuci possit ꝑ canalem. Dentes si alveolis excussi sint, reponendi, et filo sericeo ligandi.

et fractuæ ... galeriis optimis.

Cap: 2. De Fracturis in Extremitatibus.

§. 1. De Fractura Claviculæ.

Fractura ... ossis tracti nunc palmis manuum, nunc digitis, restituenda est, et compressis ... et fascia (Capelina dicta) ... fractura sit in medio; ... Spica dicta, si sit prope articula humeri et Omoplatæ ... conservanda; ... carnem continuò pungentis ... ulterius extendatur. ꝑ Instrumenta usurpata in hac fractura Bibl. 465.

genu retrahentis in longum Patientis pectio.

Restitui etiam potest posito pila palmaris sub axilla patientis, et approximato cubitum ad costas. ꝑ Decubitu patientis in longum, et posito ... cujus corporis convexi sub scapulis, et in pressione humerorum.

§. 2. De Fractura Omoplatæ.

Fit si in ... ꝑ in ... fractionem, manibus reducenda est, ꝑ ... Spinas ... Brachii ... hic ope Emplastri, Compressarum, et Fasciæ (Stellæ dictæ) conservanda, ut spatio 40 dierum curetur. Brachium suspendatur, et cubitus paulò anterius tendatur. B: 4. 467.

Stellæ ... ꝑ chartalata bulata.

§. 3. De Fractura Humeri seu Brachii.

Hæc, post extensionem ꝑ manibus ꝑ laqueis à ministris brachio inferius ... versus terram inclinato, et cubito plicato institutam, Chirurgi manibus conservanda est, et apparatu convenienti spatio 40 dierum curanda. Si fractura sit prope articula humeri et Omoplatæ, fascia (Spica dicta) in usum venit. Suspendatur Brachium.

§. 4. De Fractura Cubiti.

Hæc post extensionem pollice ... digito minimo terram respicientes ꝑ ... eodem ... ambo ossa frangantur, ꝑ minorem ... conformanda ..., et eodem apparatu ut in Brachio spatio 30 dierum curandæ. Suspendatur Brachium.

... ante cubito. una in mediani ... altera in exteriori parte. Bibl. 40 ...

§. 5. De Fractura Metacarpi et Digitorum.

Hæc, manu supra tabulam posita, digitis dorsum et Carpo sursum retractis, restituenda est, et fasciis convenientibus conservanda.

ad Carton ꝑ ferulis.

§. 6. De Fractura Femoris.

Hæc (ut in Brachio) post extentionem ope laqueorum, uno prope genu, et altero prope inguen, et subjectis compressis palmis manuum et pollicibus elevatis, ab inferiori ad superiora, donec sit ejusdem cum membro sano longitudinis, conformanda est; dein ope apparatus cum quatuor fasciis (nisi ope fractura sit prope collum femoris, tunc enim Spica in usum venit) et artificii, Spanons dicti, spatio 50 dierum perficitur cura.

vel aliquo instrumento Moulinetto ..., ossa ... supinum ... Gant.

In fracturâ ... Vide de usu ... 1253. et Bibl. 470.

§. 7. De Fractura Rotulæ.

Hæc, si longitudinaliter sit, ope fasciæ ... spatio 30 dierum curatur. Si transversalis, impotentia liberam extendendi, et laetu. ... si sit transversalis, imposita ... tunc post reductionem manuum ope, fasciâ ... dicta ꝑ ... non ... curâ quæ antea Authores ... claudicare ...

§. 8.

... ex ... Reduta sana ... quo in casu ... et Rotulam in ...

... ope ... extendat ... infra pollicem ...

§. 8. De Fractura Tibiae.

Haec vel composita, quo duo ossa simul fracta sunt, vel incomposita, quo unum solum os frangitur (quae divisio etiam in membris ossibus uno constantibus locum habet), quod sc. totum os, vel ejus solummodo portiuncula fracturam patitur. Prima contorsione membri totius antice, postice vel lateraliter dolet, et extensione facta, vel a ministris manibus (supra aut infra) vel a laqueis, quod sc. extremitates ossis fracti sibi invicem superincumbunt, palmis manuum Chirurgi ejusque pollicibus reducitur et complanatur. 2da vero dejectione ossis interna (quo sc. os Tibiae frangitur) sine ulla curvatura (ob os Peronei sanum) sibi manifestat; sed vix os peroneum fractum dolet ob ejus parvitatem, crepitationis defectum, ejusque in musculos implantationem. Utriusque cura eodem modo perficitur, sc. impositione Empl. defensivi (ex membro tensis extensis) compressarum, ferularum, fasciarum, ut in Cap. de fractura simplici recitandarum, et denique novatione apparatus singulis septimanis, si ligatura commode sit injecta, et denique circiter 40 diem immersione repetita totius membri in vino rubro calido herbis aromaticis alterato.

> vid. Bibl. 457. & 461. etc.
>
> In fractura obliqua [...] mira in Mss. [...] Bibl. 479. [...] instrumento Moulinetto.
>
> vid. Engl. Mss. 212.
>
> [...] quatuor

§. 9. De Fracturis Tarsi, Metatarsi, et Digitorum Pedis.

Eodem modo ut ossa manus reducendae, et fascia Sandalo dicta, curandae.

Cap: 3tium. De Fracturis in Trunco.

§. 1. De Fractura Sterni.

Haec inaequalitate tactu, crepitatione, dolore, respirandi difficultate, palpitatione cordis, et sputo sanguineo dolescendi; quae patiente supra lectum, supposito re aliqua dura (ut lapide) jacente, depressione humerorum et extremitatum lateralium et anteriorum costarum, ut elevantur partes ossis sterni fracti, peragitur: dein ope fasciae quadriga dictae, ut perficitur cura. Quidam facta incisione terebro utuntur.

> × Haec symptomata causantur a compressione [...], Hilaire, Bibl. 472.

§. 2. De Fractura Costarum.

Haec, si fractura extus emineat, inclinato patiente versus latus sanum, ut in manus suam palicatam fortius inflet, Chirurgi manibus deprimenda et reducenda, suam; per spatio 24 dierum, quo etiam tempore requiritur in fractura simplici sinit, et spatio 24 dierum, quo etiam tempore requiritur in fractura simplici [...] ossis ex suo loco depositae) ope fasciae Scrivetto dictae (nisi in casu quo plures costae rumpuntur, tunc enim fascia quadriga dicta in usum venit) est curanda. Sed si fractura sit ex osse intus inclinato, ex dolore, aliisque stimulantibus et vehementioribus, tunc sc. manibus et vehementioribus symptomatibus; sed quin in eo vehementioribus, tunc sc. manibus et vel, et repetita Empl. glutinantis et tenacis, ejusque in tione, habitus, 2do applicato horum repetita evulsione, reductio tentanda erit, quâ non succedente, incisionem supra costas, ossis inclinati elevationem, et partium ejus pungentium amputationem deveniendum erit.

> ^ Ex [...] Mss. [...]

§. 3. De Fractura Vertebrarum.

Haec, si nullo funesto symptomate signis satis evidens quod apophyses spinosae solummodo sunt fractae) comitetur, tunc facile ope digitorum reponitur et ope fasciae quadriga dictae curatur. Sed si medulla spinalis ex laesione tensio brachiorum vel pedum offendatur, ex post omnia conamina pro reductione frustra usurpata, fere semper lethalis erit.

> [...] Sarpe [...]

§. 4. De Fractura Ossis Sacri et Coccygis.

Haec, immissione duorum digitorum manus, ossis mundorum et totius manus extus applicatione complanda erit, dein post apparatum injectum, patiens toto quadraginta tempore supra circulum mollem vel intra vel extra lectum sileat.

> [...] Coccyg[...] Bibl. 457 ad 471. [...] Mss. [...]

Cap: 4tum. De Fracturis Simplicibus.

Quae ex toto semper transversa vel obliqua sunt, raro secundum ossis longitudinem euntes, quatuor operationibus curandae veniunt, utpote primo,

Extension:

9.

1. Extensio. quæ ꝓ primo sed, ꝓ ac minimo ante tertium institu-enda erit, ne fluxus humorum, et inflammatio supervenientes, usque in diem septi- quo tempore inflammatio oportet fomentationes ex aq: calida ꝓ Hydro: ac, ꝓ Dec: malvæ, althææ, et lin: ꝓ applicatione pellis vitulinæ recenter solutæ impedimento sint ... laqueis, instrumentis mechanicis. ꝓ p. seq. ad Extensio.

2. Coaptatione, quæ (ex membris extensis et ita situatis tentis, ut ejus musculi ab omni motu cessent) Chirurgi manibus sine violentia et dolore cum post eminentias ossis sic repositas membrum sano sit conforme, et dolor diminutus peragenda est. ꝓ Bibl. 527.

3. Deligatione. Quæ (post fomentationem partis, oxycrato, vino rubro austero ꝓ 10, ꝓ ol: ros: et alb: ovorum ex paulo aceti, et applicationem Defensivi ordinarij & Empl: de minio) fasciis, compressis, et ferulis, priore liquore madefactis, peragitur. omnes sine tamen ferulas usque ad inflammationis tempus sit prodeunt, rejiciunt. Si ferulæ sint ligneæ, linteo tegendæ sunt et latere quo libique incumbunt. Si ex charta tabulata cooperiendæ sunt linteo duplicato.

4. Positione. Quæ in parte molli et æquali ꝓ supra pyxidem stupæ ... ꝓ operatione, stanone gallicè dicti, instituenda erit. Hisce factis, si omnia bona ligaturæ signa adfuerint (qualia sunt: pressio levis, præcipuè supra pedem affectum 2° doloris remissio, 3° ... eadem non ultra ligaturam, ꝓ die seq: ex augmentatione aliqua doloris, ꝓ tumoris parvi mollis et laxi obedientis apparitione, fere magis stricte quam initio sentiatur) tunc non nisi 4 ꝓ 5to diem defacienda erit; sed si tumor sit durus (ob ligaturam nimis strictam) ꝓ si nullus adsit, ob eandem nimis laxam, et humorum ex loco affecto expressioni ineptam statim deliganda erit fractura, et de novo iterum liganda. Ratio verò cur 4to ꝓ 5to die renovetur ligatura, quia bona sit, est, 1° quia tunc fasciæ relaxantur, 2° quia tunc pruritus vermis incipit, 3° apparatu qui ad summum ante diem decimum instituitur, omnino incipit ... ab aliquibus inducitur. Sed ... inflammationis motu deposito ferularum usque ab initio usurpamus (nisi nos sine ulla necessitate ex ... sit inflammata) et apparatus ante ... non renovamus; postea singulis diem ... si omnia bona ligaturæ signa adfuerint, ... applicamus, et apparatus relinquimus, ubi prius, usque septimanes Empl: aliquod corroborans applicamus, et ... in curam perfectionem continuamus.

Cap: 5tum. De fractura complicata.

Quæ si sit ex plaga simplici sine deletione ossis, post extensionem et conformationem bonè factas, fasciis circularibus et aliis (sæpius ꝓ minus proratione suppurationis plagæ deligandis) eodem modo ut in fractura simplici curanda est: tamen qui fasciis (multo minus ferulis) non utuntur ante plagam consolidatam, tamen qui fasciis (multo minus ferulis) non utuntur ante plagam consolidatam membri sæpe induci. Sed si 2° quando incaute ex casu pravo ex curvaturam membri sæpè inducit. Sed si 3° quando ex ... portiunculis separatæ extrahatur, tunc fascia ... os non deest. ... sine remotione sæpius ... separatæ ossis ... capitum (ut membrum ...) sine ... et multò magis in deletione ossis, præcipuè si ... in usu venit, et multo magis in ... si 3° os fractus extra plagam emineat, et si sine violentia ... nudetur. Si 3° os fractum extra plagam emineat, et si sine violentia ... motu (ob inflammationem, duritiem, et contractionem musculorum ...) moderate oportet extensionis et immissionis ... quantitatem partis eminentis) moderate oportet extensionis et immissi- ... Elevatorij inter duo ossa rupta reduci nequeat, necesse erit ut pars ossis prominens (pro reductionis facilitate) abscindatur, neque inde claudicatio ... in tibia (si unum solum os fractum fuerit) metuenda erit. Deinde oportet fasciis duodecim capitum, ꝓ ope fasciarum circularium, et Emplastrorum, et supra plagam portionum ... singulis diebus modicè applicatur) perficiatur cura.

... in usu sint plumaceoli ... sp: vini, in quo dissolvuntur ... gumm: ... quæ remedia est maximi momenti ad aliq ... ossis sanandi ... Chirurgie 321.

---

oxycrato, vel ol. Ros: et aceto. vino rubro. linteis immersis aq. vitæ et aq. calc. summitatibus absynt. et Camom: Salv. ro: romar. ros: damasc. hyperico, ex coctis in vino rubro et aq. ferrata.

Cartons, frustula galbani, ꝓ chartâ ... tabulata, ope ... postea Empl. ... ex succis, stipticis, oxycroceo, ꝓ de Gacamahaca, et in genere Empl. firmantia et discutientia. Cerati defensivi. Cerati refrigerans, etc.

ꝓ p. seq. ad Deligatio.

Bibl. 528. 529. ... 212.

ꝓ Bibl. 457 ad 471. de ... luxatio prius reducenda.

Hæmorrag. sistenda antequam fiat deligatio.

Bibl: 530 ad 534.

ꝓ aquis ꝓ Moulinette.

... Bandage ... Cost.

... quibus reponenda membra ... in usu sunt.

Left margin (vertical): ... fracturæ ... ꝓ Bibl. 409

Lib: 3us. De Luxationibus v. Dislocationibus.

X Cap. 1mo. De Dislocationibus simplicibus.

Dislocationibus simplicibus, eodem modo ut in fracturis, quatuor operationibus succedendum erit, ut pote

1. Dislocatione Extensione. Hac per manibus (si luxatio parva sit) per laqueis (si mediocris) per scala per Amb per tabula Hippocratis (si inveterata sit) observata fibrarum, musculorum et ligamentorum rectitudine ante lectis per ad summum quarta die, ne inflammationis superveniat: usque in 7mum diem v. 8vum inflammationis, ope fomentationis (periodo ordinario) impedimento sit, peragenda.

2. Reductione. Hac, ut membrum sit sano simile ... collocetur, et dolorem diminuat, chirurgi manibus est instituenda.

3 & 4. Deliga et situ ... Deligatio et situs varii, pro diversitate membrorum (ut infra videbimus) in usu veniunt; hisce bene factis, et si nec ... neculus omnino tumor ... neque tumor durus ligaturam nimis strictam, ... eam nimis laxam significans; addit, tunc apparatus ... ante diem 7mum inflammationis terminis, non instituendus erit, qui ... corroborans sit, ante inflammationis finem à quiescam non removetur, nisi sit ut, fricetur pars, et motu parvus articulo pro dissipatione humorum communicetur.

Cap: 2dum. De Dislocationibus in Capite.

§. 1. De Dislocatione Nasi.

Hac omnino ut ejus fractura restituenda est.

§. 2. De Dislocatione Maxillae Inferioris.

Hac v. sæpe eminentia condylæ in latere luxato, et oris ab eodem latere aversione (adeo ut dentes superiori et inferiori non respondeant) signum intactis est condylus antice, ut sæpe accidit, luxatus, ... manifestatur; alias vero in luxatione condyli postica, ... processum Mastoideum in qua nulla datur condyli eminentia, nec tanta oris quanta in priore aversio; utriusque tamen cura introductione pollicis unius per duorum bene tectorum in os, et deprimendo condylo ut in cavitatem impellatur, requisita, eodem ... mo ... ad perficiendum. Deinde fascia ... ulnarum, Chevestre simplex dicta, munivendum. Sed si maxilla in utroque latere luxetur, tunc supra pectus pendet, et musculi temporales ex maxima periculo tenduntur. Ejus igitur restitutio introductione pollicum in os ubi prius, pro condylorum depressione, et tractione forti ab inferius ad superius ope fasciae sub mento maxillae applicata, prompte expedienda est. Cura ope fasciae, Chevestre composita ... 16 dicta est perficienda.

Cap: 3tium. De Dislocationibus in Extremitatibus.

x Engl. Ms. 211. §. 1. De Dislocatione Humeri.

Dislocatio humeri subtus axillam (ex cavitate supra humeros extraordinaria, acromii eminentia, capite ossis subtus axillam rotundo, elongatione cubiti à costis, difficultate per impotentia levandi brachii versus ... humeri, ex opposito, longitudine brachii majore quam sani, denique ex plicâ subtus axillam magis infima quam in axillâ sanâ) patiente sedente, ... chirurgi manibus et digitis subtus axillam et manibus circa corpus firmiter dolente, Chirurgi manibus et digitis subtus axillam et pollicibus supra caput Brachii collocatis; interea ... altera inter Chirurgi tibia: situata extensionem à superius ad inferius per manus ... laxatis officiis) elevatione et impulsione observata, eadem via qua qua egressa est, restituenda erit; et eo melius, si inter extendendum mappa sub axilla

Marginal notes:

Ex. L. pag. 4 ... in ulla.

Bibl. 534, &c.

... ex ol. ros. et aceto, per ex vino rubro et per praeced. Extensio et Deligatio.

... pruriens, si palienti molesta sit, aq. calenti, lacte tepido, per infuso ... fomentetur. ... per sp. praeced. Deligatio. ... parti affecta fomentetur vino ... tepido. Si adsit excoriatio aliqua ... fascia prima ... aq. calc. Si adsit inflam: ulatus ... fomentetur et ol. ros. et sp: vin: Si ab ... symptomatis libera sit, ... humectentur fascia oxycrato per sp. vin. arom: Bibl. 467.

In luxatione postica ... ... ferrea vel ... ...

Luxatio unius lateris restitui potest ... et luxatum ... periculosior. De Verney.

... ad finem ... contortio.

axilla plicata et suis extremitatibus à ministris prehensis, et circa Chirurgi collum ligatis, elevatione et impulsione adjuvantur. His sic factis, ex patiens anticè supra caput et posticè supra tergum manus suas flectere potest, apparatus reliquus Empl. de Minio, et astring: inflammationem inhibentibus, compressis, globulo molli sub axilla, et fascia spica dicta perficitur. Alii dantur Reductionis hujus methodi, ut pote: patientis axillam supra extremitatem humeri hominis robusti et altioris stante patiens pendeat, sicque Brachium extendatur ponendo, et interdum Chirurgi manu dextra caput ossis sub axillam, dum palmâ manus sinistra extremitas omoplatae deprimitur, in suam cavitatem elevando. 2do. Patiente supra tergum jacente, Chirurgus dum manibus extensionem instituit brachii, calcaneo caput ossis dislocati supra acromium; interdum dum servus post patientem sistens, mappa sub axilla plicata elevationem adjuvet, et planta pedis humerum deprimat. His sic omnibus si luxatio restitui nequeat (quod raro evenit) adjuvandum erit. Dantur alii Scalam, Glossocomium, et Ambe Hippocratis devenienda erit. Dantur alia Luxationis in humero species ex Galeno, sed ex Hippocrati ignota fuerunt, etiam et nos eas ignoramus.

§. 2. De Dislocatione Cubiti.

Dislocatio Cubiti est quadruplex. 1a est, quando Apophysis Coronoides ossis Cubiti interna externa locum occupat, ex hujus Apophysis eminentia, et alterius ex cavitate in loco ex quo egressa est impressione, et denique ex impotentia flexionis brachii. Quae luxatio ex postica dicitur, patiente sedente ministri unius manus circa corpus ejus plicatis firmiter detento, à Chirurgo (dum extensio à duobus ministris, uno partem superiorem brachii, et altero eam carpi prehendente) observata manus et brachii figura naturali, [illegible] inde patientis tibias collocato ex plica sui brachii quatuor aut quinque pollices sub cubito (ut lonis viris [illegible] extus [illegible]) applicatas restituenda erit. 2da Luxatio Antica dicitur, quando Apophysis Coronoides externa internae locum occupat, ex continua brachii plicatione, et palma manus versus tergum conversione: quae (patiente per duos ministros, uno per corpus, altero per partem brachii superiorem detento, à Chirurgo manu dextra carpum et manu sinistra extremum cubiti firmiter prehendente, ut ambabus simul cubitus ex impetu elevetur, et patientis manus suum humerum attingat) reducenda venit; et semel si cubiti plicatio fascia intorta circa eum injecta, et a ministro retracta, inde reducendum adjuvetur. 3a Luxatio superna dicitur, quando se eminentia supra Condylum brachii externum, et cavitas supra internum discernitur; quae post extensionem necessariam facillime pressione à supernis ad inferna reducitur. Sic è contra, Luxatio 4ta Inferna dicta, quando os Cubiti Condylum brachii internum ex eminentia occupat, pressione ab infernis ad superna, succurrendum erit. Demum Cura apparatu ut alibi et fascia Dolorie dicta perficiatur. Observando interdum flectendum et extendendum esse Cubitum singulis ejus tractationibus, ne Anchylosis in ejus cavitate generetur. Suspendatur brachium.

§. 3. De Dislocatione Carpi.

Quando se ossa ejus superna tria cavitatem Radii relinquunt, et vel anticè (ex manus reclinatione) vel posticè (ex ejus inclinatione) vel lateraliter (ex ejusdem vel contorsione) inclinat. Quae, manu supra mensam posita, et singulis digitis retractis, ut tendines in situm naturalem remittantur: post extensionem convenientem, depressione eminentiae palmae manus versus pollicem vel digitum annularem [illegible] ope [illegible], uno trahente digitos, altero cubitum.

in brachium pars affecta ol. Ros. tepido. Compressis, immergentibus Oxycrato, aut ol. ros: et aceto, aut vino Rubro calido. [illegible] corallo astring. perfrigerante. + 4 Bol. Armen: Sang. Drac: Myrtil: Balaust. pulv: [illegible] ex alb: ov: ad consistentiam mollis. Bibl. 544, &c.

a fustulo ligni lato et linteo tecto.

et Carionis, charta tabulata,
(vulcando) manu Chirurgi, restituenda sunt; compressis, et fasciis tribus circularibus (?) curanda. Eodem modo restituuntur ossa carpi interna luxata, post eminentiâ solâ et vix manus mutatione manifestantia. Suspendatur Brachium.

§. 4. De Dislocatione Metacarpi & Digitorum.

Horum Dislocationes inde extendendo, eodem modo ut in Carpo reducuntur, et fascia, Demi Gantelet, & Gantelet entier dictâ, et Cartons & ferulis curantur.

§. 5. De Dislocatione Femoris.

Dislocatio haec est quadruplex, quarum 1a. dicitur Interna, quae omnium est frequentissima, ob cronam in latere interno cavitatis Ischii, et post suo capite in inguine, et pedis et genu ad extra conversione; et longitudine totius membri majore quam sani, ejusque movendi impotentia, manifestat. Paciente ergo supra dorsum tabulae (versus inguen affixae perforatae, promissione fustuli ligni longitudinis pedis panno involuti) imposito, et duabus ligaturis femori infectis, uno supra genu ab homine robusto fortiter intra; et altera paulo infra fustulam ligni supra rectâ lineâ trahendis, ut primâ extensio ope ligni praedicti efficiatur, et 2dâ, quae non tam fortis ac prima trahenda est; interea Chirurgus genu et reliquum femoris caput ossis ad intus ad extra (interea Chirurgus genu et reliquum femoris ...) sub fustulo ligni ab extra ad intus versus alteram tibiam flectit; pellatur, reductio expedienda est; quae si non succedat, ad machinas recurrendum est. et reductio expedienda est; quod si non succedat, ad machinas recurrendum est, et praecipue ad eam Moulinet dictam, quae laqueorum circa fustulum ligni, quod duobus tranvis fixis circumvolvi potest, intortione, ut extensio et fortis et aequalis fiat, perficitur. In caeteris eodem modo ut prius procedendum est. 2a Luxatio est Externa, quae in caeteris eodem modo ut prius procedendum est. abbreviatione membri, genu et pedis ad intus, calcanei ad extra contorsione, digitorum pedis declinatione, et calcanei retractione sese manifestans. Quae Patiente supra ventrem jacente, et extensione facta (ope laquei supra genu injecti) Chirurgi manibus, laqueo parti superiori et internae femoris injecto, adjutus, in suam cavitatem facilius quam prior reducitur. 3a Luxatio, ex capite femoris supra os pubis, aequali tamen membrorum longitudine, Antica dicitur, cui, quod suppressionem urinae comitem habeat, prompta extensione ut prius instituta depressione capitis ossis ope genu compressâ rotundâ et durâ armati, succurrendum erit. 4a Luxatio ... est. Postica ex abbreviatione tibiae, tumore sub musculis ... manifestatur, et in cavitate inguinis; quam post extensionem magis violentam ... in cavitate inguinis; quae post extensionem, eadem via per quam exivit, reducenda est, depressione capitis ossis in rectâ lineâ ... Cura ope fasciae Spica dictae ... (nisi in casu quo ligamentum ... rumpitur, uti fore creditur in omnibus luxationibus nisi interna) expeditur.

§. 6. De Dislocatione Rotulae.

Haec, Patiente stante, et homine robusto sustento, palmis manus Chirurgi in suum locum (quae femoris supra, infra, et lateraliter luxetur) reducenda est, et sic ... fascia ... dicta ... conservanda.

§. 7. De Dislocatione Tibiae.

Haec etiam 4plex est, quarum 1a est Interna, quae Condylo in latere interno apparet, et tibia ad extra convertitur; quam Chirurgus inde patientis tibias collocans, ope genu super eminentiam ossis et manum extus, supra femur et tibiam applicans, restituere debet. 2a est Externa, ut prior se manifestans, et eodem modo restitui debet. 3a est Interna, quae duo condyli simul ... et calx ... reducenda. 3a est Interna, quae duo condyli simul ... et calx reducenda, ... Patiente sedente, et à ministro ... longitudinis unius pedis panno involuta sub genu in parte postica applicata, et per suas extremitates alterius ministri manibus ab inferius ad superna fortiter retracto: interea Chirurgus manu sinistra retractionem ope fasciae ... sub genu injectae ... et manu dextra tibiam ... approximando calcaneum versus posticam restituenda venit. 4a est Superna, ... Patiente supra dorsum jacente, à Chirurgo ope genu, eminentia ossis depressione; interea Chirurgus tibiam à supernis ad inferna, et alia parte

(margin:) finter extendendum supra et infra)

partem superiorem femoris ab infernis ad superna fortiter trahunt. reduci debet.

§. 8. De Dislocatione Astraguli.

Haec vel est incompleta, quo sc. per dimidium ex cavitate tibiae excluditur, eaque vel antica, cum magna eminentia in parte laterali et interna pedis, et cum calcanei, plantae pedis, et digitorum ad exterius conversione; vel postica, cum eminentia ad externus, et plantae pedis ad interius conversione. Sed si luxatio completa sit, quo vel ut astragalus totaliter cavitatem tibiae relinquat, et vel peronem sub planta pedis, inferiori et malleolus interno ejus loco occupat, dejiciatur: utriusque tamen reductio, patiente sedente et firmiter retento, a Chirurgo, et extensio a duobus servis (uno partem superiorem, et altero inferiorem tibiae prehendentibus) instituitur, plantam pedis ab interno ad externo, vel e contra, pro luxationis modo, fortiter premente; dein fascia sandaliata dicta et curetur. Sed si dislocatio sit complicata vel cum ulcere, ... pixis seu cerea expedienda est.

§. 9. De Dislocatione Peronei.

Haec vel est antica vel postica, eaque vel superna ubi articulatur cum tibia versus genu, vel inferna ubi articulatur cum ea versus astragulum; eminentia in latus in... reducuntur, et manibus testantibus quaeque facile post extensionem ope laqueorum institutam, a Chirurgo restituuntur, et fasciis dictis et curantur.

§. 10. De Dislocatione Calcanei.

Haec saepius est interna, rarius et peronei externa, quae ope fasciae sandaliatae dictae, et Chirurgi manibus ab interius ad exterius prementis facile restitui potest.

§. 11. De Dislocatione Tarsi, Metatarsi, et Digitorum.

Dislocatio Tarsi (quae vel antica vel postica esse potest, sed non lateralis) Metatarsi (quae etiam lateralis esse potest) et Digitorum omnibus modis fieri potest. Omnis reductio eodem modo depressione eminentiarum vel rota per plantam pedis supra fastulum ligni instituitur: et cura ope fasciae sandaliatae dictae perficitur.

+ Dislocationem Carpi etc.

Cap. 4tum. De Dislocatione Ossium in Trunco.

§. 1. De Dislocatione Costarum et Scapulae.

Costae vel in partes superiores luxantur (quae patiente manu deprehensa suspensa vel in partes inferiores, quae patiente reclinato, vel verso sua genua inclinante) intrusione eminentiarum in suam cavitatem per palmam manus Chirurgi restituenda sunt, et fascia quadriga dicta et curanda.

§. 2. De Dislocatione Vertebrarum Externa.

Haec patiente supra tabulam extento, et extensione facta ope laqueorum a duobus servis aequaliter institutam uno supra ossa Ilei, et altero sub axillis) a Chirurgo verteram eminentem duabus manibus deprimente, reducenda venit; et... molis, si utriusque vertebrae lateri apponantur frustula lignea panno involuta; exinde enim impeditur apophysis spinosarum ... dein fascia quadriga dicta cum compressis appropriatis et in usu sit.

Appendix 1a. De Ossium Carie.

Ossis Caries vel rasoriis deradenda, vel ferramentis candentibus, vel oleis causticis consumenda est, ... os album solidum et sanguinolentum appareat.

Appendix 2da. De membri Distorsione sive Curvatura. + MSS. Engl. p. 711.

Haec si nativitati adfuerat, machinis curabitur. Sed si per ... malam extensionem unde membri abbreviatio, vel ... conformatam ... ligaturam, unde membri incurvatio, distorsio haec proveniens, tunc in homine juvene et robusto callo, si sex menses non excesserit, emolliendus erit per 15 dies fomentationibus, balneis, et emplastris; dein membri extensio per vires vel manuum, vel laqueorum, vel machinis, eique conformata et tractatio ut in fractura simplici instituenda erit. Sed si fragmentum ... ossa rupta ... sit, post incisionem usque ad os, ... eximendum erit; dein tractatio ut in fractura complicata procedit.

+ ad finem hujus libri.

+ De Dislocatione Claviculae et ... Scapulae ... Clavicula.

per instrumenta Mou... ...

... etiam ... in ... Bellostio et ...

Videmus ergo nullo modo membrum male conformatum denuo esse frangendum, nisi fractura loco novi ossis accesset. + [illegible] ad P. 3. c. 22. oper. 4.

Appendix 3a. De ossium dislocatione ex plaga, et ossium dolitione.

Dislocatio haec quae in magnis articulis, ob tendinum et ligamentorum vim, sine convulsione rarissime reducitur, et quae reducta gangrenam et saepe mortem inducat, a multis sine ulla tractatione in eodem statu (nisi quod dolori et inflammationi succurrant) relinquitur, + saltem reductio ex malo prognostico instituitur + denique membrum amputatur.

Pars 2da. De operationibus in Carne, Medicis solis quae manu Chirurgi perficiendis.

Cap: 1mum. De Vulneribus.

§. 1. De Vulneribus in genere. + Boerhaave.

Vulnus est continuitatis solutio a causa externa.
In vuln. exhibenda Clysm. [illegible] pura et Diaphoret. ut 2 [illegible]. Diaph. [illegible] 69 ℥ij. Spor: Cal. ℈j. Creta ℈j. Sal. Sat. gr: iv. [illegible] et exhib. in aq. C. B. valida sudorifica + 2 aq. menth: [illegible] ʒiß [illegible] 69 ℈j. Anf. [illegible] ℈j. Sal. [illegible] Spir. [illegible] [illegible] [illegible] Spasmos [illegible] [illegible] Hamorrh: [illegible] alteri[illegible]
Inflam: sedantia.
^ + P. 3. c. 23. 2da.

Diff: Vulnera secundum [illegible] vulnerantis, qualeque sit, [illegible] scindens, [illegible] 2o. [illegible] 3o. [illegible] 4o. [illegible] vulnus insequentes. [illegible] dolor, [illegible] sang: in [illegible] gravamen, pulsus, inflammatio, febris, vigilia, debilitas, horror, rigor, convulsio (quoties partes nervosae in consensum contrahuntur) fluxus sang: et [illegible] longitudinalis [illegible]

§. 5. [illegible] Vulnerum simplicium Carnis.

Cura. 1o. [illegible] immediatam removendo. 2o. [illegible] sang: sistendo. 3o. [illegible] [illegible] prohibendo. 4o. Labia vulneris conjungendo. 5. Conjuncta conservando. 6o. quid labiis intercedat: ut et 7o. substantiam laesam conservando. [illegible] [illegible] 1o. Digitis [illegible] 2. pulv: ex Bol: [illegible] sang: Drac: pil: [illegible] [illegible] [illegible] ovorum. 3. Ligatione vasorum. 4. Adstrictione transversa, ut extremitates retrahantur. 5. Caustic: actuali + potentiali ex ⊖ usto, [illegible]. [illegible] prohibetur dicta via: et incrassante, [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in cura Phlegmonos. Labia conjunguntur ligatura [illegible] glutinatoria stringendo vulnus, et [illegible] [illegible] quibus postea [illegible] glutinatoria [illegible] conducendo extrema, + si placet circumductione utriusque extremi facta. Et [illegible] apponantur [illegible] pulvinaria: 2o. Sutura [illegible] sang. [illegible] [illegible] de quibus postea. 3. glutinatoria, quae fit primo trajectione [illegible] per labia vulneris quot puncta volumus facere, quae [illegible] relinquantur [illegible] circa unamquamque [illegible] (quem modum eligimus) et [illegible] trajectione [illegible] [illegible] (quem modum eligimus) et primo in eius medio, [illegible] [illegible] in [illegible] per labia vulneris, et primo [illegible] puncta [illegible] [illegible] deinde fiant alia quot necessaria puncta [illegible] vulneris, et sic [illegible] media parte inter puncta et extremitates vulneris, [illegible] puncta quot ad contactum labiorum necessaria. Ex: gr: si vulnus sit longitudinis duorum digitorum, unum punctum in medio sufficit, si trium duo, [illegible] [illegible] pro conditione vulneris [illegible] de [illegible] Relinquantur [illegible] sutura pro [illegible] ne cicatrix sit indecora. 3o. [illegible] + sic in facie [illegible] per unum diem ne cicatrix [illegible] + sang: Drac: [illegible] [illegible] fili duplicati et intorti. 4o. Glutine, ut sang: Drac: [illegible] [illegible] coll: Mastic: [illegible] ov: — glutine [illegible] quibus addere [illegible] [illegible] humiditati puris resistunt. Hae in [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] locum suum habent. [illegible] vero si [illegible] [illegible] [illegible] in parte declivior [illegible] tudinem exacte uniri nequeat, foramen in parte [illegible] [illegible] relinquendum, non vero in omnibus vulneribus, ut aliqui [illegible] faciunt. [illegible] etiam inter [illegible] glutinum esse [illegible] [illegible] [illegible] possumus, [illegible] conservatur, + [illegible] humorum in partem.

Boerh. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 54 — 5. de die. in [illegible] [illegible] in vul [illegible] [illegible] [illegible] 21.

Regula [illegible] Vulneraria vid. annot: chirurg. p. 9.

15.

partem hanc debilitatam influentis, & influxorum absorptione post. si suturam, se imbibendus ut Spongia vino austero. X pulv: astring: super vulnus non intra inspergendi est. Sic cavendum ne quid tabis miscendae, iisque & mitioribus (pro conditione vulneris) ut ros: plant: tormentill: Sambuc: ulmo, coralli, de cornu cervi, de mumia; & mediocribus ut mod. caud: equin: salic: fol: mastic: corall: vin: austl: & valentissimis, ut Bol: sang: Drac: Nuc: cupress: Balaust: gallis, pyris, pulv: &c X Medela vulnera curante intra 24 horas, ex ol: ℥iij hyperic: ℥viij frumenti ℥j, Sem: Hyper: ℥ij rad: C: B: Valer: aa ℥j, thur: ℥ij. & biduum in vino infundantur, et coquantur ad vini consumptionem; expressione facta, addantur therebint: et thus, quo vulnus inungatur, et dein sudetur & deligetur et tertio quoque die inspiciatur. Si labia vulneris ob distantiam et magnitudinem nequeant adduci, cavitas in profundo carne est implenda (dicitur quae vulnus cavum seu compositum) ad quod requiritur 1° concoctio seu digestio materiae (donec puris natura aequalis, non foetidus appareat, quod in parte praestandum est, ut excitatur ex vitell: ov: therebint: ℥ij: farin: tritici, thure, aq: q. s. pro consistentia, & his et detergentibus mistis, ut mell: ros: succo apij et croco. 2° Sarcoticis. 2. detergentibus ex succ: apij, & cal: vino, melle cum axungia. 3. Sarcoticis Bals: Guarint: Ung: fuscum Apostol: Ung: de Gutia, & Cornu cervi in tritum, et Basilicon in hyemae X pulv: ut thure, sal: Coloph: sarcocoll: sang: Dracon: Myrr: aloe &c de est: in doctrina ulcerum. Curato vulnere, si 1° manet cicatrix cava, in juvene scarificanda est, et sarcotica, multa sunt sine pulv: ut Ung: de Bolon: Hunc faciunt medicinam interius labia 2. Si sit eminens, et Catharetica, quae admoto plattino attollenda. 2. Si sit eminens, et Cathareticis quae in usu sunt. 3. Si citrina, viridis, nigra, livida, subnigra (sunt & purg: ex Helleb: & cum arugine plumb: ... Calaminth:) & alba vicina, sunt purgata ex cucum: asin: color: Elater: topica, ut lamina plumbea: etc. si rugosa sit saarit: dein eradentia et epulotica. 5 Si dura & rubra usque sit ol: de Bem: de vitell: ov: pinguedo: humana.

§. 2. De Vulneribus Vasorum & Ligamentorum

Tractione de vulneribus vasorum sang: nunc de Nervis, cujus signa sunt, dolor insignis, inflammatio, pulsatio, convulsio, delirium, et si nervus perforatus, est mitigandum, et sensus torpor. Si tendon vulneratur, adsunt praedicta, sit fortis, motus et sensus torpor. Si in partibus ex carnibus, ut in manu et pede circa musculorum fines et in partibus ex ... Cervini, Costini, &c & pro grana ... & est punctio, quae curatur ol: therebint: Cervini, Costini &c & pro ... Ung: Frid: Calx lota cum ol: pompholix lota cum ol: Rosarum 3. Contusio, quae si sine vulnere sunt &c: ex majoran: &c. Si Ligamenta, usus sit ol: nardin: mastich: aliorumque calidorum et astringentium, non aq: calida ut cavetur putrefactio.

§. 2. De Vulneribus Capitis

X §. 1. De Vulneribus Capitis simplicibus

Quaer: An vulnera haec capitis, simplicia consuenda sunt. Resp: Dolor si pericranium nullo modo laesum sit; sed cum, cute penitus incisa continuo suspicanda sit ejus laesio, melius erit vulneri solis incarnantibus prospicere. Ratio vero cur pericranium non consuendum est 1°. Ne ejus punctione dolor et inflammatio (quae Durae Matri ob continuitatem facile se communicare possunt) oriantur. 2°. Ne impedita perspiratione ... consuatur, tamen ob ejus tenuitatem pericranium colligatur sanius. 3°. Quia ...

... spiritus ... rigore et aetu frigidis ... ad fluxionem praeveniendam ...

Digestiva. opt. digest. ex vitell. ov. tereb: et ad. pars mell. myrr: Bals. peruv: et gr. Elemi ... &c.

Dolorum Sarcotica

& Bals: Samarit. (Cinci: opt. ex ol. et vin. aa p. e. coctis &c.

seu Escharotica.

De punctura Arter: ... cinis &c in & 5. Bibl. 379. ... p. 11.

... De tendinum vulneratione ... ol: ... Cura. distillato ... Colle ... 180. Styrax liquida, im- storax, myrrha, ... Bals. Peruv: ol. hyperic: thus, ... sp: vini, et omnia medica firmantia et discutientia. ol. ... philosoph: ... Bals. ... Hypericum ... Zw. ... plura ... 75.19.

Si vulnus sit superficiale, curatur aq. Reg. Hung. & potius Bals: ... Hispan. ... superponendo empl. de ... ton. & chirurg. ... 193.

... ex Dum.

[illegible] cavitatem incapax est agglutinationis.

[illegible] in omnes [illegible] incisione [illegible], quia fieri [illegible] tam tenuis et firmis cranio adhaerentes [illegible] cranii 2° quia [illegible] ab aere alteratur [illegible] superficies [illegible] plana et polita, adeoque [illegible] ut caro ei adhaereat [illegible] reddatur, et [illegible] extremitates pro carnis generatione [illegible]. (Unde Raspatorium in usum venit. [illegible])

Post [illegible] et [illegible]; [illegible] pag. [illegible] digestivis [illegible] dein sarcoticis, dein cicatrisantibus, [illegible] applicando super os [illegible] [illegible] Ol: [illegible] Aristol: Myrr: [illegible] nudatum sit. (Caveatur ab unctuosis ossi applicandis.) [illegible]

§. §. 2. De Vulneribus Musculi Temporalis.

Si vulnus hoc satis sit profundum, et vulnerentur vasa temporalia, inter vulnera periculosiora recensendum erit, 1° Quia musculus hic Aponeurosis [illegible] aliqui, et omnes fere in hunc usque diem pronunciarunt esse [illegible] culi frontalis et occipitalis tegitur, et 2° quia in his vasis sanguis [illegible] [illegible] difficulter sistitur. Empl. tamen Galeni [illegible] defensivum etiam [illegible] con[illegible], ex aloe, thure, pilis lepor: et alb. ovi [illegible] ordinarie [illegible] Rosaceo [illegible] applicatum, et gr: 4 vel 5 [illegible] [illegible] crocus [illegible] assumptis, ut sang: [illegible] diminuatur [illegible] [illegible] Rosei (et [illegible] quasi [illegible] in ampulla [illegible]) [illegible] futuros [illegible]. Sanguine suppresso et incarnatione [illegible] mam [illegible]. quod fit [illegible]) ut in reliquis [illegible] rotundis [illegible] [illegible] dein cicatrisandum. Sed si vulnus [illegible] [illegible] quinem [illegible] labia approximanda sunt, et sic conservanda [illegible] [illegible] [illegible] vicinas [illegible] astringentibus, ut [illegible] illinenda, ut et etiam aceto vel ol. Ros:

§. 3. De Vulneribus Faciei. et annot.

§. §. 1. De Vulneribus Frontis.

Vulnera hac si profunda sunt cum attentione [illegible], ut reliqua [illegible] [illegible] capitis vulnera tractanda, conservationis [illegible] qm [illegible] si alias faciei curam gerendo. Sed si [illegible] contra sint superficialia [illegible] [illegible] rectitudinem sequentia, ejus labia approximanda [illegible] [illegible] sicca [illegible] glutino et [illegible] pag: descripta et fasciae unitiva [illegible] [illegible]. Si vero sunt transversalia [illegible] sunt [illegible] non [illegible] [illegible] quae etiam [illegible] sutura sicca conjungenda veniunt, [illegible] conservanda [illegible] angustis, una supra, altera infra plagam [illegible] maxime distantibus, quo in casu necesse est ut sutura separata [illegible] [illegible], quae tamen secundo vel saltem tertio apparatu removenda est; [illegible] loco sutura sicca substituenda ne cicatrix induatur deformis.

Si vulnus est cum deperdita substantia, suppeditanda est sarcoticis [illegible] [illegible] inungendo adipe [illegible] catrix induatur [illegible] (non pulv: siccis) [illegible] no ut formosior evadat.

§. §. 2. De Vulneribus Superciliorum.

Si longitudinalia vulnerentur, cura erit eadem cum ea frontis; si tran[illegible] [illegible] [illegible] necesse est ut sutura satis profunda utamur (ne [illegible]) [illegible] nequaquam [illegible] modo attendenda erit cicatricis deformitas, cum hoc in loco [illegible] [illegible] venit. Si vulnus illud sit cum deperdita substantia, sarcoticis [illegible] in cicatrisantibus mollibus utendum erit, ne cicatrix nimis dura [illegible] [illegible] retractionem efficiat, quae [illegible] ob hanc causam incidenda [illegible].

§. §. 3. De Vulneribus Palpebrarum.

Si per ductum fibrarum orbicularium vulnerentur, labia [illegible] sutura [illegible] glutinis adjungenda sunt; sed si transversalia, glutino solo [illegible] [illegible]

Si vulnera superficialia Ol: Hyper: Bals: peruv: Empl. de Bolon. sufficiunt [illegible] Empl. de Bolon. [illegible] [illegible] Bals: peruv: [illegible] vulnibus superficialibus [illegible] ol: Hyper: [illegible] ol. Aris: Chymici bonum. [illegible] [illegible]

Cura.

Pulv: exfoliantes sunt pulv: Myrr: aloes, Aristol: [illegible] florent. [illegible] Euphorbii. Instrumentum Raspatorium [illegible] in usum venit. pulv. Euphorb. [illegible] exfolians [illegible] 233.

[illegible] ex thure, mastich, bol. arm. pilis lepor: et alb. ovi.

In [illegible] arter. gossipium [illegible] [illegible] 708. [illegible] Bolus Armena, sang: drac: vitriolum [illegible]

[illegible] Empl. pro sutura sicca in annot. ad Chirurg. P. 2. c. 1. §. 3.

In vulner. faciei parcendum incisionibus, [illegible] praecipue utenda Bals. [illegible] [illegible] Quarant. [illegible] [illegible] suppuratio [illegible] 195. Bals. Hispan. [illegible] peruv: [illegible] possunt.

[illegible], Empl. glutinante [illegible]

Sutura enim à fibris musculi orbitus contineri nequit, neq acu penetranda est membrana subjacens, ne filo continua attritione globus oculi lædat.

§. §. 4. De Vulneribus Oculorum.

Si 1o. horum vulnera ita sint superficialia, ut nec corum tunicas penetrent, nec ullus humor effluxit, tunc 1o. levi huic incisioni, 2o. dolori 3o. inflammationi succurrendum erit medelis expellentibus (in Cap: de Ophthalm: descriptis) ut aq: ros: plantag: troch: alb: Rhasis. &c. ex quibus aliqui plagam sæpissime lavant, et alii optime ex successu illa plagæ non immediate applicant, sed in dorsum palpebrarum, ut et aliquid aq. portul: alb: ovi, mucil: psyllii: cydon: fragar: &c. papav: hyosc: Gallar: nuc: cupress: Balust: &c. Anodyna etiam in dolore vehementi in usu sunt, ut carne pomorum, vitell: ov: mucil: Alth: farin: hord: &c. Si 2o. vulnera humoris aquei effusione comitata, ejus ulterior impediatur deperditio remediis Emplasticis plagæ et toti oculo externe applicatis, et mucil: psyl: ol: cum gum: trag: fragar: āā ℥ißs ex aq: rosar: in flis amen, nisi in infantibus humoris huius reparatio expectanda non est. Si 3o. humoris crystallini et vitrei dolor effluxus nec sarcotica in usu veniunt, dein cicatrisantia, (&c. cerussa, tutia, Bolo,) et in oculis inflatis et 3o. oculi artificialis positio. Si denique vulnus ... et in oculo instrumentaliqua parte in eo haereat ... cui tunica attingat, attendendum ne instrumentaliqua per ... in eo haerat. ... via sarcotica uti prius in usu sunt, et dein enerscat partibus vicinarum, excelso et legendis ... etiam amissibilis. Obs. In omnibus oculorum ulcibus improbandum esse, et legendos esse amicos quoniam ungulanti lædatur, quia malo uno movetur alter.

§. §. 5. De Vulneribus Nasi.

Si superficialia vulnera sunt, solâ suturâ siccâ approximanda sunt ejus labra, et ope cerati alicuius Emplastici, ut omnes hic evitetur cicatricis deformitas. Si vulnus incisione et fractura ossis comitatur, ejus unio ope ligni et ferri intus et digitorum exteriis facienda est, et canula et aurea et argentea et ex pluma anserina, in conservanda ut respiratio sit libera et nares deligantur, plagæ postea uti prius continuandum erit. Interea sis memor fasciarum et compressarum pro tali fracturas quæ sit transversalis, eodem modo, sed alterâ fasciâ tractanda erit. ... si pars amissi cartilago nasi lædatur, omnino ut ejus fractura tractanda. Sed si pars ampu... reuniri nequit, reparari tamen potest (quamvis ob difficultatem vix veniendum est,) ut legere est in Ambrosio Pareo.

§. §. 6. De Vulneribus Genarum.

Genarum vulnera si superficialia sunt ut ea frontis tractanda sunt. Sed si profunda sunt, intra suturam siccam necesse est ut relinquatur apertura pro evacuatione materiæ, qua ... intra suturam quasi in sacculo continetur, cui etiam fasciis et compressis convenientibus prospiciendum erit, inhibendo interea omnem Genarum motum.

§. §. 7. De Vulneribus Labiorum.

Vulnera hæc ope suturæ siccæ et acus (ut in labio leporino) reuniri possunt.

§. §. 8. De Vulneribus Aurium.

Aures si superficiales ... sutura sicca et panni linei alb: ov: et Empl: obducti ... reunienda veniunt, quæ tamen si maxime distant suturis ex punctis ... opus ejus ... ne acu pungatur cartilago subjacens.

§. §. 9. De Vulneribus Linguæ.

Vulnera hæc denique quoniam sint tractanda, si modo vera sana adhæreat, non amputanda est (ut nonnulli faciunt) sed consuenda (acu sola per ejus unicam cutem non per ejus substantiam, ne impediat pondus quam ob finem lingua et oracnus et ceonis pannis lineis munitis humidis extra os tenenda est, dein ... a... exsiccantia, ut pulv: Bol: Armen: sang: drac: In usu etiam sunt vera granat: aq: alum: plant: &c: psyl: Balust: Maiorum, ... si pars omnino amputetur, et adstringentibus hæmorrhagia sisti nequeat, ad Lap: infernalem aliqui confugiunt.

Hilliona de Fabri ferrario cujus oculo inhærebat limatura martis, quam tollebant mole-penna deplicatam huc illuc post animum mucil: psyllii. cydon. et fragar. proectam. aliq. hæc ope sunt oculorum remedia. Falsum Magnes oculo quam proxime applicatus.

De fractura Nasi.

§. 4. De Vulneribus Colli.

Si partes carnosæ solum læduntur, ut eæ aliarum partium tractanda. Si 2º. Art: aut Venæ læduntur, post remedia sang: sistentia (ut Empl: Galeni) vel adhibita her[illegible] stra, liganda (contundenda et) sunt vasa, et vulnus ut prius tractandum. Si 3º. Trachea Art: læ= datur, vulneris labia supjacentia leniter lanta sunt adducenda suturis, et ag= glutinantibus mollibus tractanda, ut sanies exitus per labia vulneris non im= pediatur, sicque non cogatur per vulnus Tracheæ in pulmones descendere. Si 4º. Pharynx aut Larynx læduntur, eodem modo tractentur. Sed quod sæpe inflam= matio supveniens, suffocationis metum inducat, necesse est ut introductione canulæ in plagam dilatatam, per novam factam Laryngotomiam, respirationem facilem conciliemus, donec symptomatibus sedatis, ad plagæ consolidationem accedere possumus. Si 5º. Colli vertebræ læduntur, post doloris sedationem (alb: ov: ol: ros: Lumbric: caloris[que] defensivis, et mundificantia et [illegible] [illegible] deveniendum est. Si 6º. Nervi et tendines læduntur, curam vide Sect: de vul: vas: et Ligam: Si ultimò Oesophagus læditur (quod raro fit sine omni partium prædictarum læsione) cura fit ut in vuln: Laryngis, ut sanies intra col= [illegible] per labia vulneris effluat, et intus non detineatur, quod etiam fieri potest si in infima vulneris apertura relinquatur.

§. 5. De Vulneribus Thoracis. (et post Empyema et remot[illegible] et praxim.)

[et dilatatio primò,] Si hæc Thoracem non penetrent, ut alia simplicia tractanda. Si 2º. pe= netrantia sunt (sine læsione partium contentarum) eo quod sang: saniem et humiditatem in thoracis cavitatem deponant, hæc evacuationi (ne putre= factione mortem inducant) studendum erit, 1º. diureticis et expectorantibus (in plaga sc: parva, et hæmorrhagia minima comitata) 2º. Dilatatione [illegible] qa. si non satis magna sit, et sang: in thoracem depositio sit copiosa. Si 3º. Pulmones læsi fuerint (quod sang: copiosi rubri et spumosi sputo exitus, et in tho= racem depositione, tussi, respirationis difficultate cognoscitur) fiat statim injectio ex pulv: adstring: [illegible] [illegible] (Chrysocolli) alb: ov: et aq: plant: mixtis, et vulnus obducatur. Plumacolis ad= stringentibus oblinitis (ut præcedentibus sine Aq: plant:) compresa interim [illegible] [illegible] [illegible], consolid: adstring: [illegible] emollientes, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quem apparatu evacuata mãa ad [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prius. Si sang: fluxus nondum supprimatur; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] porta sunt conservanda, donec mãa minuatur diminuere, dein foraminis obturatione sarcoliis studenda erit; prius tamen usurpata injectione vulne= rarias et ultimò omnis detergentis ex Scord: Mel: ros: et aq: [illegible]. Si 4º. vulnus sit tam altum ut mãa in thoracis p. [illegible] nequeat evacuari, Paracenthesis [illegible] [illegible] inter [illegible] [illegible] [illegible] digitos distan[illegible] [illegible] in loco declivo inter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Si ultimò, Cor, portio Diaphrag: nervosa, et sim. vulnerentur, mortalia cen= sentur; et signa alia in Chirur: Vang: [illegible] quem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Boerh.

§. 6. De Vulneribus Abdominis. (et Annot: ad Gabber)

[illegible] [illegible] vulneria [illegible] in cavitatem penetrare, et intestinorum exitum [illegible] comitata, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reducantur, potius prius reduci possunt (quia extra abdomen [illegible] [illegible] [illegible] spatio vento inflantur) fomentanda [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et vino calido [illegible] [illegible] madefacta, et dec: Carminativo, donec venti dissipantur. [illegible] non obstantibus, si digitis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], necesse est ut dilatetur plaga [illegible]. Si vero omentum extra abdomen sit, [illegible] nondum sit frigidum, statim reducendum erit: sed si aliqua [illegible] pars rigida et nigra fuerit, statim post ligaturam inter illam et sanam [illegible], amputanda est, dein reducenda, pla= ga dein consuenda, ut in Gastroraphia, et [illegible] tractanda. Si [illegible] intestina vulnerentur (quod nunc [illegible] [illegible] [illegible], nunc [illegible] [illegible] [illegible] sutura qua Chirothecarii utuntur consuenda sunt, dein vino rubro austero calido [illegible] [illegible], et pulv: mastich: Bol: Armen: sang: drac: [illegible]: granat: [illegible] [illegible]

[Margin notes:]

et Chyli nutrientes [illegible].

Boerh: 55.

Sang: in cava corporis per vulnus delapsus inde edu= cendus situ corporis, suctu per fistulam, si incom= [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nova [illegible] ignotis et Ex= plorat. per vacillantes flamma candelæ vulne= ri admotæ, [illegible] et na= ribus obturatis; injectione.

Excerpta Boerh: p. 350.

Si vulnus thoracis utrumque latus penetret, et si Em= pyema necesse instituatur in ambobus, opus collectum in utrisque plaga non simul aperienda, ne suffocetur patiens; aer enim in= [illegible] non potest per a= perturas duas opposi= tas [illegible] pulmones com= [illegible] thoracis [illegible] [illegible] [illegible]. Charr. 157. Chir. 290.

Si vulnera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sem. anis. flor. [illegible] cymin. [illegible] caryoph. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sat. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] injectionem. et

Sutura (ut plumaceo[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2. aloes, myrr. thur: Clerc.

plagae, et reponenda. Illis reductis, ubi prius consuatur plaga (nonnulli nonnulli volint, aperta tenenda est) faeces interdum emolliendae sunt, et intestini glutinatio per os assumptis accelleranda. Si ventriculo vulneretur (qd chyli per vulnus exitus et sang: vomitu dignoscitur) medela interna adstringentia in usu veniunt, Clysteres item nutrientes, et plaga externa solum sarcot: tractanda. Si Hepar, Lien, aut Renes vulnerentur, internis sol. agglutinari possunt, ut dec: thur: mastich: cum vino aut aq: Sed omnia haec vulnera maxima ex parte sunt lethalia. Patiens decumbat in ventrem post intestinum gastroraphiam. Clerc. chirur. Spilorum extremitates extra vulnus pendeant. Spatia est mappa extra pull:

§. 7. De Vulneribus Articulorum.

Si superficialia sunt cum aliquorum tendinum, nervorum, et vasorum laesione, ut priores in aliis: tractanda. Si cavitatem attingant, et ligamenti orbicularis per capitis ossis portiuncula scindatur, necesse est ut medelis admodum desiccantibus utamur, ut Ung. Styracis, pulv: myrr: aloes, mastich: ros: abietis, [illegible]. ut exterius tamen prius consuenda est plaga (ob metum Gangrenae) relinquenda est apertura [illegible] aerem frigidum) et in ejus parte infima relinquenda est apertura pro mat. evacuanda. + P. 3. c. 23. de operatio.

De vulneribus aliis + P. 3. c. 23.

Cap: 27. De Ulceribus et Fistulis.

In ulceribus internis Bals: Lucat. et Bals: [illegible] terreb. opt. sola. Clerc.

+ P. 3. c. 23. oper.

§. 1. De Ulceribus in genere. + Annot. + Boer: aph. 419.

[illegible] a [illegible] erodente provenientes [illegible] [illegible] afficiunt. + 2o. Ratione Sperma, + 3o. Ratione Symptomatum. + 4o. Ratione [illegible] quae omnia [illegible] sunt [illegible] + non. Cura sit 1o. Suppurantibus [illegible] partibus [illegible] applicatis, ut impediatur corruptio [illegible] in [illegible]. 2o. Detergentibus. 3o. Sarcoticis. 4o. Cicatrisantibus [illegible] morbo [illegible] in [illegible] mali symptomatis [illegible] Suppurantibus ex farin: [illegible] comitatur [illegible] tractandis [illegible] Suppurantibus [illegible] vitell: ov: [illegible] adipe Anat: Gallin: [illegible] Sapon: [illegible] cum vitello ovi [illegible] myrr: Sp: vini, [illegible] Detergentibus ex melle, Linimen: Arcei [illegible] 3o. Sarcoticis, i. e. medelis [illegible] humiditatem nimiam [illegible] desiccantibus, et ad putredinem detergentibus, quâ [illegible] incarnatio [illegible] Ung. Apii: + Si velimus carnem ex Ung. Beron: [illegible] Bals: Lucat: [illegible] coctâ, Aloes, Sarcocolla [illegible] ex thur. [illegible] 4o. Corroborantibus supra et circa [illegible] Myrr: [illegible] ex vino rubro [illegible] applicatis. ex Cerato de Cerussa, Diapalma + ex vino rubro [illegible] Myrt: [illegible] granat: [illegible] 5o. Consumentibus carnem superfluam et callum, ex plumaceolis [illegible] 6o. Cicatrisantibus [illegible] infernali, [illegible] et corros. [illegible] et sim. [illegible] plumaceolis [illegible] saturnino [illegible] Myrr: C.C: [illegible] Ung. Diapomph. [illegible] de minio, Diapal. [illegible] lapi. Calamin: [illegible]

§. 2. De Ulceribus difficilis Curationis.

Ulcera + [illegible] sunt [illegible] i. e. quae difficilius admittunt cicatricem, [illegible] comitatur [illegible] magnâ humorum (calidiorum acrium) fluxione [illegible] egregiam [illegible] ulceris [illegible] et [illegible] cura [illegible] apportant, nisi fluxioni [illegible] Ligaturis [illegible] Sudor[illegible] unctionibus calidis, et sim. Ulcere [illegible] ut priori Articulo, [illegible] desiccantibus [illegible] ut Cadmia, [illegible] Aloe: [illegible] priore, + ex [illegible] non [illegible] sunt [illegible]

[illegible] facti: [illegible]

spolia suppositorio + plitam. curante alendus, praesertim vi intest. magna. Ca: dantur. Clerc. 199, 295.

+ Boerh.

P. 2. C. 1. S. 1. §§. 2.

+ Excerp: mea ex Barb: ac p. 32, 83. Dissert: et hic Sit. part: 3. c. 23. [illegible]

Cura: [illegible] Aq. Bened. Bat. opt. in ulceribus internis et externis. Dos. ʒij vel 4. [illegible] Suppurant. lac cum mica panis, pulvis hor [illegible] cum butyro. [illegible]

Arcei: Bals. samarit. Clerc.

Corroborant:

Consument:

Cicatrisant: [illegible] vulnerario in quo dissolvitur ʒj + ʒij [illegible] Clerc. [illegible] Croco metall: [illegible] Seipt. Vang. 14.

Lap: inform: [illegible] + Lilalo, + [illegible] Aq. Phag.: Colophon: [illegible] opt. [illegible] 2.

in [illegible] marus, [illegible] et ossis ca[illegible] rid, fiat apertio in parte [illegible] causae potentialiq[illegible] ut mollis mundificantibus injectionibus, aliter cura non bene succedit, [illegible] in[illegible] [illegible], ung. & duo transversim [illegible]

[illegible] in temperie sua comitatur et labiis aridis, rudis, et [illegible], et qui [illegible] [illegible] puris, quod curandum venit (quamvis omnium difficillime) fomentatione partis aq: calida donec rubeat, etiam in aliis ulceribus vino [illegible] quia siccantia [illegible] [illegible], deinde [illegible] ulcus plumaceolis & spongia [illegible] [illegible] & ung: [illegible] althaea, interdum unctibus ut purgatione et sim[illegible] [illegible] succedendum erit, donec [illegible] [illegible] hac auferatur, postea ulceri sarcoticis mollibus et cicatrizantibus [illegible] endum erit. 2º. est humidum et carne humida et flacca et magna quantitate puris, cui siccantibus succurrendum erit, ex absynth: marrub: Bolon: Salv: [illegible] usto, Litharg: Cerus: Cadmia, Alum: Draq: Sulfur calce [illegible] (non [illegible] nisi aliquo cera ut [illegible] mediis consistentia) vino et aq: ferrata &c. et quo et lavari possunt partes circum circa, additis aliquo [illegible] astring: dein sar[illegible] coticis et cicatrisantibus suis ulceri prospiciendum. 3º. est calidum et [illegible] rubris dolentibus et pure acri, quod alterandum erit Ung: Santal: [illegible] Ung: Sulfur, Ceruss: Sach: Sat: ol: rosae: Myrt: ving astring: [illegible] balaust: Myrtillis, galis, Cort: granat: Camphora &c. Dein sarcoticis et [illegible] santibus non multum siccantibus curandum. 4º. est frigidum et labiis mollibus et albidis, et aliquo lividis, quod curandum erit Ung: [illegible] Apostol: Ol: Hyperi: [illegible] di, Rutae, anethi, Resina Laricis, Empl: Bolon: et [illegible] vini pro fomenta tione, ut et vino albo [illegible] & [illegible], Salv: Calaminth: Origano, mentha, et aq: etiam calcis, et sim. Dein sarcoticis &c ut antea utendum.

3. liv.

Ulcus est verminosum (de sic inquo sunt vermes) qui [illegible] sunt aliquo instrumento, & prius [illegible] (quia carni firmiter adhaerent) [illegible] ex ab synth: Marrub: Centaur: min: Dictam: [illegible]: [illegible]: aloe, Myrr: [illegible] no, viridi aere, succ. [illegible] &c: [illegible] pyreth: Urina &c. Ulcus [illegible]

[illegible]

detergendum Aristol: Marrub: Ung: Aegypt: &c et incarnandum uti prius.

Ol. [illegible] 4 op[illegible].

Ulcus est carie ossis comitatum, & ob frigus externum, & ob [illegible] nimiam [illegible] humorum, deinde aliquo acrium & malignorum, quod [illegible] manifestat & 1º. [illegible] [illegible] unctuoso, dein flavo, et ultimo nigro et inaequali. & 2º. si os non apparet [illegible] [illegible] caries erit 1. fistula praecedens, 2. Ulcus recurrens post cicatricem [illegible] 3. Caro flaccida, spongiosa, pallida, livida, 4. si exploratorius introducatur [illegible] tentiam non invenit [illegible] inaequalitatem, et 5. pus clarum, fetidum et nimis [illegible] piosum pro magnitudine ulceris exit. Os igitur si detectum non sit incisione carnis (nisi in manu et pede ob tendines et nervos, in quibus non [illegible] erit

& medulla sambuci

ut rad: Gent: & spongia pro dilatatione utamur, aliquo et cauterio actuali [illegible] nalem immisso) [illegible] longitudinem partis detegendum erit, et tractandum [illegible] ex Aristol: Myrr: aloe, Mumia, Sarcor: [illegible] vini, [illegible] Alum: [illegible] [illegible]: 4. Borace Euphorbio, &c quorum ope si ossis squama non decidat, dera dendum erit os; sed si corruptio sit profunda, necesse erit ut & [illegible] trepanno, & cauterio actuali utamur.

§. 3. De fistulis. & La Charriere.

Fistula est sinuositas arcta [illegible] et callosa, aliquo [illegible], aliquo [illegible], nunc simplex nunc multiplex, nunc in [illegible] in venam, nervum, arteriam, tendinem, &c [illegible], et labiis albis duris, [illegible] aliquo humoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exploratorius [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible] si in [illegible] [illegible] 2º. [illegible] mollitiem et exitum puris albi et copiosi, si in carnem. 3º. [illegible] [illegible] [illegible] pus rubedine tinctum, si in venam & arte[illegible] [illegible] et [illegible], si in nervos. 4º. [illegible] et 5º. [illegible] pus nigrum et fetidum, si in os corruptum.

Prog: [illegible] fistulae sunt difficilis curationis, si non incurabiles, praecipue ea quae desinunt in tendines, nervos venas, art: ossa juncturas, vertebras, cavitatem thoracis, Abdominis, matricis, vesicae, & intest. [illegible] &c.

Cura est vel 1º. Palliativa, quae fit desiccantibus et consolidantibus exterius, ut

Detergentibus [illegible] in ulceribus fistulosis sunt ol. Hyper: ol. [illegible] et viride aeris mista [illegible]: et lavandis applicandum fit ex Ung: & Empl. viridi et q. s. viridis aeris. Consolidans [illegible] fit ex aq. calc. et pulv. 129 [illegible]: & Charriere [illegible] [illegible] in ulcer: fistulosis sunt lateralos [illegible] [illegible] fistulosa un[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

Linim:

Lixivio aq: calcis, aq: minerali, &c quorum opere omnis fistulae orificium obturdetur, tamen brevi iterum aperiuntur nisi et victu convenienti, purgatione, [illegible] praevaeniamus. Cura igitur haec non rejicienda, praecipue quod aliquando Obturato orificio accidat ut sinuositas sese renovat, quod nunquam fieri potuit eo aperto. 2°. Cura vera fit in ulceribus praedictis, praecipue aperiendo venarum haemorrhoidalium vulnerariis, Balneis naturalibus et artific: ex [illegible], alum: [illegible], &c. 3°. Remotione calli vel in ejus orificio vel in tota ejus cavitate quod exploratorio detegitur, ppti ex Hellob: Aro, Goni: Aristol: Euphorb: Succ: Chelid: Ostrutha, virid. aer. auripig: [illegible], phlegm: et sp: [illegible], lixivio, calid: alum: Ung: Ægypt: Sulco acido forti, &c. 3°. Dilatatione orificij fistulae rad: Gent: vel Sponiae. 4°. Mixtionibus (in fistulis profundis) ex Lixivio, vino, aq: mellitis, aq: marina, aq: salsa, aq: calcis, aq: vita, aq: Hord: aq: aluminosa, melle rosac: Ung: Ægypt: Soluto. Quod omnia media si frustranda fuerint, oportet incidere fistulam, et amputare tota callositas, et putrefactio vel scalpello vel operatione cauterij vel actualis vel potentialis, ex pulv: Asphodeli, Arsenici, Argenti vivi sublimati. &c circumcirca applicando refrigerantia. Ultimo, Sarcoticis et Cicatrizantibus ut alibi tradentur. Exemplum horum fit in fistula Ani, ut postea, ubi dextro eorumque vel Cacherione.

Ideo scarificanda et abradenda praevenienda, vel lixivio capitali Lap. Infernal. &c.

Balnea artific: fiunt ex [illegible] in aq. com.

vel medulla Sambuc:

vel ol. Terebinth. opt.

Chirurgiae Pars 2da.

De omnibus Operationibus quae exercentur in corpore humano à capite ad calcem.

Cap: 1mum. De Operationibus quae in Capite exercentur.

§. 1. De Cauterio in sutura Coronali, et Ventriculo ibidem contrarianti.

Illud exprimatur ex S. in loco in quo sutura haec et sagittalis sibi occurrunt, deinde ope cauterij actualis, in canuliam (ut defendantur partes vicinae) immissi, donec ad cranium perveniat, vim praebere [illegible], ut imprimatur cranio aliquot [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]. [illegible] morbis capitis à [illegible] Epilepsia, Asthmate, [illegible] in oculis, Aures, nares, et stomachum [illegible]. arthriticis [illegible] hoc remedio curari [illegible] [illegible] qui [illegible]. Applicare etiam potest prominentia [illegible] [illegible] occipitis.

§. 2. De Sectione venae [illegible].

De vero venarum temporis, occipitis, summitatis capitis, infra aures, et pinnae [illegible] [illegible] [illegible], ut et incisionis capitis in [illegible] [illegible] [illegible], ut et cauterij in nucha. In stibiis [illegible] [illegible] ligatura circa collum ut per V.S. Radulaus, et Compressa, et Fascia Discrimen dicta. [illegible] [illegible] [illegible] conexis in [illegible]. Sed vix nobilis [illegible] [illegible] frequentissima. vel f.s. [illegible] [illegible] Humores, et Authores.

§. 4. De [illegible] [illegible] vel Cautum [illegible].

Cap: 2. [illegible] [illegible].

1a [illegible] [illegible] [illegible] conglutinatas palpebras, vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] majorem (quo in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible], vel palli curvi (fibula in extremitate munita) et ejus [illegible] [illegible] ita tamen ut ejus dorsum sit appositum oculi globo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], quod sic Separata [illegible] [illegible] [illegible] palpebrarum cohaerentis [illegible], vel cornea vel Conjunctiva [illegible] [illegible] [illegible]. De his [illegible] in Schultet. Armament. fabricato [illegible] [illegible] [illegible] separanda [illegible] [illegible] [illegible] et eodem modo ut prius tractanda. [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] palpebrarum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel loc: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tract.

Amodo invenientur hunc locum vel Nuck, van Meekeren et: Chirurg. Scultet, Solingen &c. Hoc loco fit [illegible], vel ex [illegible] [illegible] [illegible], Cuivre [illegible] [illegible] [illegible] &c.

Incisio venae debet esse longitudinalis. Patiens concutiat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appareat.

vel operatio obstetrica [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

tractari ... cora calidi; ut dissolvatur. Sed si suppurat, aperiatur ut materia exeat. Datur et alter tumor parvus albus, transparens, mobilis, hinc dictus Chalazium, ... grano grandinis assimiletur, qui separandus est ... variolos sanis ope scalpelli. Est alius tumor ... dicitur, qui ... pand...

3tia Operatio est ea ... in medio palpebra et ... consumma ... curata fuit. Sed nos omissa hac crudelitate, glutinantibus et suturis siccis, ut palpebra aperta tendatur, ... temporis spatio curatus ... tractamus.

4ta Operatio est ea Lagophthalmiae (seu vitio mali in quo oculus palpebra non tegitur) quae etiam incisione palpebrae a cantho uno ad alterum, et vulnere ... lateris ... sarcotica repletione tractari solebat, sed ... nos eam ope suturae siccae palpebrae superiori et inferiori ... temporis spatio ... curamus, et eo melius, si decoctione malvae ...

5ta est ea Ectropii (seu mali in quo palpebra inferior non satis ascendit), quae omissa crudeli incisione, sutura sicca pariter curanda venit.

6ta est ea quae Cilia oculum laedunt, cujus pili universi evellendi sunt digitis vel tenaculis, dein pars ... limatura ♂ in vino cocta fomentetur, ... collyrio ... cauteriis ... acubus candentibus. Si pauci sunt pili qui laedunt, reduci possunt ... naturalem ope glutinis, ex mastich: ... tragac: alb: ov: etc.

Cap: 3tium. De Operationibus in oculis utilatis.

1a est ea Cataractae jam concretae, maturatae, et perfectae (mollis enim ... qua in Praxi acui non resistit) quae fit introductione acus ... aureae ... argenteae sed potius ferreae (Fricalo prius ... nonnullos oculo in medio albi oculi prope ... sine ulla violentia (cavendo humorem Crystallinum aut Vitreum ... donec ad ... eas, aut pupillam, quarum ... non promittada ... inferiorem pelliculam perventum sit, quae movetur acu a superius ad inferius, et ... contra a pupilla separatur, et deprimatur in oculi obscurum, quae ... oculo per quadrantem horae detineatur, ne resiliat; dein ... acu ne resiliat pellicula (quae ... in parte non separanda est) ... tiente jam jam pars videntis, oculo (sano etiam occluso) pulvinulo ... bulis Aq: Ros: ... cum paulo pulv: Croci et ... : vel potius ... Psyl: et Cydon: in aq: Ros: ... quater in die et post ... fronti applicati ... (inflammationem omni ...) grad: lumini ... assuescat. Interea ... abomni ... motu violento cavendum. + Annol. nunc duabus utitur acubus una acuta et ... ovata, altera ... acuta.

2da est ea Staphylomatis, seu tumoris representantis uvam passam, ... ob ... membranarum oculi nigri, ... saepe ... visu ...; qui si fit cum basi arcta, acu duplici filo munita ... cujus duae extremitates supra et aliae duae infra ... ab iis ... et decidat. Hoc etiam modo ... si fit cum basi larga (continuo Medicis ... alb: ov: ... duobus acubus ... ut unius ope filum quod alter ducebat, circa ... ... detineatur, ... decidat. His tamen operationibus ... reparatio non expectanda est, sed solummodo aliqualis formositas.

3tia est ea Pterygii, seu membranae oculi canthi majorem ... quae si diu duraverit et indurata sit (mollis enim ut in Praxi ... curanda est) oculo aperte conservato per ope Hamuli vel suturae siccae ... tendatur Hamulo parvo, et acu filo munito ... dein ... extremitatibus ope ... scalpelli separetur (cavendo excisionem Carunculae

---

Marginalia:

... crocus ... ovi ... in plures ...

vel mica panis et lacte.

vel annol.

Brachys Chirurgi ... tabula ... et pulvinaribus, ... vel pannus ... a liquoribus ... ut pars ... calefiat, et asperitatem ... oculo ... non necesse ... tandem quaedam momenta sufficiunt.

vel Aq: ros: alb: ovi conquass: et paulo alum ... duplicato. ... Blanc ...

Oculus tractandus Dec: ... psyllij et Cydon: ... mag: ros: vel ...

vel unico filo ligetur.

D. 10.

[illegible] lacrymalis, ne Rhagas sequatur; postea pulv: [illegible] alb: ovi. [illegible] tractetur.

4ta est de Fistula Lacrymali ex carie ossis subjacentis (ejus enim incipientis in pag: 20. Praxis curam habemus) quae sic cauterisanda ossis foramento ovalari (idque ter vel quater) in canulam immisso, dein ejus plumaceolis siccis tractanda donec exfolietur; dein agglutinantia in usu sunt. Quidam prius incisionem usque ad os instituunt; alii si foramen satis magnum sit, eam omittunt; quidam denique os nasi cauterio penetrant (ut pus et humor per nares descendant) quod revera improbari nequit, si omnia alia remedia sint frustranea. Oculis applicanda defensiva ex aq. plant. ros. alb. ov. et Ros. [illegible]

(cunulo lana prius claustro, et modo compresso, et cochleari [illegible])

Cap: 4tum. De Operationibus in Naribus utilitatis.

1ma est de Polypi (qui post frustra adhibita media primo desiccan[illegible], dein corrosiva, ut in pag: Praxeos) incidendo erit instrumento ab Aquapendente et Scarpelo descripto, [illegible] (curvis seu corvinis) [illegible] post inde [illegible]tam radici ejus ligaturam arctius et arctius quotidie ligandam, ut nutrimento [illegible], et radices ejus [illegible], et post aliquantos dies cadant sine violentia gyrantes, ut radices ejus aliquantulum separentur, sicque facillime evellerentur; dein fluxui sang: et ejus reliquiis, ut in Praxi prospiciendum. Quidam sunt qui post prehensionem Polypi [illegible] vel hamulo vel tenaculis et scalpello separant; sed et vix fieri potest [illegible] sine laesione cartilaginis cum ad [illegible], et copioso sang: fluxu, aliam methodum [illegible] praeferimus. Nott. Polypi lividi, nigri, cancrosi, duri, et dolorosi non evellendi sunt; tantum albicantes, rubicundi, molles et penduli.

2da est de Ozena, [illegible] naris, quae [illegible] sit primo, inde [illegible] cariei, idque et vel sine [illegible] [illegible], et tamen [illegible] tam inter[illegible] introducti[illegible] [illegible] in pag: Praxeos descriptis, non cedat [illegible] solidam alb: [illegible] ferramenti candentis reiterata in canulam omnino [illegible] cavitati naris in magnitudine cor[illegible] et cauterisa[illegible] [illegible] canula calefacta per vices descendens usque, et cauterisa[illegible] curandus venit. Sed si 2o. Carie ossis sit comitatus [illegible] vicem subeat, curandus venit. [illegible] 24 horas in narem affectam, [illegible] [illegible] immisso panno lineo plicato per [illegible] introductio: [illegible] quae os corruptum tangit niger evadit, [illegible] erit) introductio ne stylo candentis ter aut quater in canulam foramine uno laterali [illegible] exacte respondentem [illegible], et linteis vino austero imbutis [illegible] cauterisandus erit; dein dolore sedato, et ossis carie ope siccantium spatio 15 dierum separata, dein ad Cicatrisantia deveniendum erit, ut pag: Praxeos, [illegible] canulam debere semper nari inhaerere, donec fiat ossis exfoliatio, ne [illegible] [illegible] nasi.

Cap: 5tum. De Operationibus in Labijs utilitatis.

1ma est de Labii leporini seu mali in quo pars e medio labij superioris [illegible] ob vulnus, vel a nativitate deest, et partes laterales gingivis agglutinantur, [illegible] lati: et separatione labiorum a gingivis panni linei inter eos, [illegible] interpositione, fissurae cutis vel labiorum forcipibus excisione, [illegible] nonnullos scarificatione, [illegible] sang: emittunt ope suturae siccae approximatione, aut ope Balsami Hispanici aut copaivae agglutinantium) curandus venit. Sed si tantum labij [illegible] ut nequaquam facile ope hujus suturae approximari [illegible] labra nec scarificanda [illegible] exscindenda, donec spatio temporis eadem [illegible] sutura. Sed ordinis duplicis, extendantur labias et sese inosculent. Sunt [illegible] aggrediuntur acu una aut altera [illegible] sufficiente [illegible] curam [illegible] immissis, et fili circa eas per labia ducendi post [illegible] cutis [illegible] farlos;

rgd ut fiat, in usu sunt et quaj: vel pulv. [illegible]

vel Praxin.

liquore stiptico, vino austero per nares attracto; vel pulv: [illegible] et [illegible] in canulam nari [illegible] immisso, vel solo sp: vini et mel. ros.

Injectio R Myrr: [illegible] cum sp: vini, et plumae [illegible] imbutae applicandae sunt.

non instituitur in infantibus ob [illegible] [illegible], aut [illegible], Scorbuticis, aut [illegible] venerea infectis, ex [illegible] male ordinatis. Nuck. [illegible] non in magna [illegible], non in labio inferiori, non in [illegible] laterali [illegible] in [illegible].


forma Empl.

Nott. Empl. Diapalma imponendi exbrem... (margin notes, partly illegible)

...tarlorum mordem... rola ... dem iis supimponatur Empl: de Bet... calis ... applicandis, et post octo dies removeatur aeq. et apertura glutinantibus tractetur. ... liquida:

2da est ex Cancri labiorum, qui si medliis artibus et topicis in ... mori ... amsuiando ... simul ex labio, ex parte argento acuta aq: forti madefactâ; dolor sedandus, et inflammatio inhibenda plumaceolis imbutis alb: ov: et suppurantibus, sarcoticis, et epuloticis cura implenda est. Sunt qui forcipibus Cancrum hunc excindunt, sed vix ... vestigii aliquid relinquunt sine recidivi metu; ... infra excinditur tamen caustico actuale applicatur ...

Cap: 6tum. De Operationibus in Gingivis utilatis.

1ma est ex tumoris dentes fere abscondentis, qui ... in dies, cauterisandus est ferro tenuissimo, quod et valde prodest in Gingivis lividis et putridis, et vino mellito lavandus. ✝ Drac. l. 1. c. 12. Bibl. 350.

2da est ex Epulis, seu parvi tuberculi, et

3tia est ex Parulis, seu parvi abscessus, quae incisione et postea plumaceolis siccis curantur. Datur etiam aliquando caro dente putrida et tumida propter dentes maxillares, quae sola cauterisatione, praemissa aliquali ... curatur.

Cap: 7mum. De Operationibus in Dentibus utilatis. ✝ annot.

1ma est ex Dentium ita firmiter conjunctorum, ut nihil in os ingeri possit ✝ ex melancholiam ✝ ex convulsionem, tum etiam ✝ fluxionem in musculis Mandibulariis, quae in casu alimenta liquida per infundibula, cum Scultetus p. 156 descripsit, vertenda est; prius, si opus sit dilatatis dentibus ope speculi oris; quod si hoc arctat dentis dolore comitetur, emollientia ante dilatationem in usu sint, ✝ vel patientis nutritivis Clysteribus prospiciendum est, quod etiam faciendum in inflammatione Œsophagi, ... partium, quod si 3o dentes ... ceterum coarctentur, obturatis naribus, vel solummodo per os ... aperiatur, alimenta danda sunt ...

2a est ex Dentium impolitorum, et quasi crusta testacea obductorum, qui instrumentis Raspatoriis tenuissimis poliendi veniunt, et postea pulv: Lap: Pumic: ✝ ossis Sepia, ✝ annot. ... Pharmac:

3a est ex dentium Cariosorum et perforatorum, qui gutt: aliqua ol. ... similis per infundibulum parvum foramini dentis impositum immittere ... mentis candentibus diversis pro magnitudine foraminis cauterisati... repolitâ, et ultimo repletione foraminis auro, argento, plumbo, ✝ ceria ... foliato, curandi veniunt.

4ta est ex Dentium Contusorum & Ruptorum, quorum eminentiae pungentes limandae sunt.

5ta est ex Dentium extra locum natum crescentium, qui si linguam interius ✝ buccam exterius laedunt, extirpandi sunt instrumentis commodis, ut Rostro corvino, Pelicano, et sim. qui et in usu sunt in dentibus laxis, dolentibus cariosis, perforatis, fatidis, et post eorum separationem à Gingivis, si non maxime vacillent; hac enim praeparatione omissâ tota maxilla ... tenuis, porosa, & spongiosa saepissime ... si ✝ minimo ... hendatur, ad haemorrhagiam sistendam ... ✝ succo ...

Cap: 8um. De Operationibus in Palato utilatis.

Habemus diis ossis cariem, Cauterisationes et ... spongiis ... foramini impositas pro tempore ... separatis partibus ossis cariosi ope Cauterii repolitis et ... ex incipiat incarnari. ... mixtura ex Melle ros: sp: vini, sp: ... Empl. ex plumac. ... Cap: 9um

Margin notes: Epulis, Parulis ✝ Dion: 2. Bibl. 382. 390. — ... ✝ Curor. Bibl. 392. — ✝ ad finem libri. ... Anchi... dentali & varii, Dentiscalpii, ... Pelicano, ... Ampulsor ... Dion ...

Cap: 9. De Operationibus in Uvula utilatis.

Habemus 1. putrefactionem et sphacelum (...) enim relaxata in p: praxeos diximus) quae ideireo extirpanda erit, 1. forcipibus, 2. instrumento à Scultelo tab: 11. fig: 1. descripto, et cauterisanda ut fig: 4. 3. filo circa eam ligato, ope annuli tab: 9. à Scultelo descripti. ... aliorumque.

Cap: 10. De Operationibus in Lingua utilatis.

Habemus 1. incisionem fraeni linguae (...) longitudine loquelam et linguae motus impediente ... omni tempore praetenta lingua ... tenaculis, in infantibus, digitis manus sinistrae linteolis tectis, manu dextra forcipibus scalpello curvo munita instituenda est; evitanda interea sunt vasa sub et ad latus linguae, ob quae non unus ... sed duobus aut tribus ictibus scalpelli utendum est. Hoc malum tam rarum est, ut inter centum mille vix accidit, unde miranda est mulierularum ignorantia, quae in omnibus infantibus fraenum hocce unguibus lacerant (credentes eos alias nunquam loqui posse) cum vitae maximo periculo ob inflammationem, fluxum sang: ... ob impotentiam et dolorem mammas (quae ideireo nimis humidae fiunt) sugendi, unde ob defectum alimenti saepe moriuntur.

Habemus 2. tumorem seu abscessum sub lingua ranulam dictum, qui primo incidendus est, ut ... saepe ... et 2. cicatrisandus vin: rub: et pauco alum:

Habemus 3. linguae ... ope spatulae, et 4. ... dorsionem ... ope panni rubri spongiae (gargarismate madefacti) extremitate stipitis alligati.

Cap: 11. De Operationibus in Guttare.

Habemus exemptionem spinarum, aliorumque ossium et corporum ibi haerentium, ope ... si sint visibilia; si non, ope candelae cereae spongiae filo ... alligatae, frustuli panis, ficus siccae vomitus; quae si non sufficiant ... relinquantur, ut temporis spatio consumantur ... ung: Dialthea ... cataplasmata emollientia ... impediens ...

Cap: 12. De Operationibus in Maxilla.

Habemus 1. ossis ... cariem, quae pulv: Aristol: thur: aloes, sp: ... ferramentis candentibus, denique extractione ossis per tenaculis curanda venit.

Cap: 13. De Operationibus in Auribus ...

1ma est extractionis corporum in aures illapsorum inconsiderantia ..., sternutatoriis, quae post aurium dilatationem ol: amygd: ... immissione instrumenti (quo ordinario ... tenaculorum dentibus armatorum ...) si non sufficiat ope ... praetendenda sunt.

2da est ... Auris artificialis ...

3tia est ...

Cap: 14. De Operationibus in Collo utilatis.

1ma est ... tumoris inter cutem et tracheam art: Bronchocele dicti, qui post incisionem cutis, digitis scalpelli manubrio cum suo folliculo separandus est, et plaga lavanda aceto cum pauco salis et nitri. Sed si totus folli:

Ad mel. ros: gargar. astring. eandemque.

Nach 7172

ubi pars ... in: ungendum mel: rosa: ... si vero contingat vas aliquod laedi ... curatur admoto penicillo, vitrioli Hungarici particula instructo.

... tendinis vituli ... filo alligati, et ... aliquoties.

Nucks Exper: Chir: animalcula extrahuntur: spongia portiuncula ... filo alligata ... amygd: amar: ... et sim. necantur et eruuntur.

folliculus eximi nequeat, ejus reliquiis (sed vix mihi vena Nutrimentum iis ad-ferens incidatur) pulv: caustici prospiciendum est.

2da est ea **Laryngotomia** in suffocationis metu in Synanche, quo reclinato capite (ut interstitia Laryngis majora sint et magis appareant, et digitis saltem investigantur) et cute inter 3tium et 4tum annulum atramento notatâ et transverse elevatâ (una cum membrana subincumbente) scalpello curvo secundum Laryngis longitudinem incisa, et dilatatis vulneris labiis vel digitis vel hamulis obtusis, apparentibus musculis sternohyoideis scalpelli manubrio separandis, in conspectum venientibus tracheae annulis, sectione transversali lanceolâ, linteo armatâ inter tertiam et quartam vel 4 et 5tam (cum iis sc. longo collo praeditis) cartilaginem, donec ad cavitatem Art: tracheae, eruptione venti cum impetu cognoscendum, perveniatur, instituenda est. Deinde trachea plagae immittatur canula argentea alata et duobus filis circa collum ligandis alligata, et brevis ne latera tracheae attingantur, quae post inflammationem diminutam exempta, vulneris labia scarificentur, et si opus sit approximentur per suturam, fasciâ convenienti et suturâ siccâ adjuvandam. De col: consulatur p: Praxeos ubi de Angina. vel annot. ex de Valn. coll.

Cap: 15. De opera^tionibus in Thorace utilibus vel de Vuln. Thoracis

1ma est ea Incisionis Thoracis in Empyemate (post medic. maxime & ...) frustrà usurpata, quae inter 3 et 4 ... tussim, vel per urinas vel sedes materiâ evacuatur, frustrà usurpata; quae inter 3 et 4 ... in sinistro latere, et 4. et 5tam costam in dextro instituenda est. Notato itaque loco atramento, nec nimis antice ob sternum, nec nimis postice ob costas inter nimis ad invicem accedentes, sed in lineâ sub mammis perpendiculari, incidatur primò cutis et subjecti musculi, deinde leniter inter duas costas paululum reliquis incidatur scalpello curvo (panno lineo vel licinio tendatur armati) extremitas uno latere obtusâ (ne lædantur vasa) et pauculum infra; ne lædantur pulmones, deinde pleura vel minimum pertusa, plaga dilatetur scalpello ... in extremitate munito, vel digitis laceretur, pus semel vel ... ad quantitatem ... plus minus, pro patientis viribus evacuato, plagæ immittatur turunda ex ... nec crudo filo alligata si nulla sit metus quod materia ... ... dam erupat; sed si è contra sit tenuis et serosa, statim immittenda est canula argentea (in extremitate curva) alata foramini exacte respondens, quæ turundâ durâ, foramini ex lino confectâ obturanda erit; cavendo tamen ne nimio ejus usu plaga fistulosa deveniat. Si materia tam crassa sit ut non queat facilè evacuari, in usu sunt injectiones ex Aq: mellita, vino albo, et ... ol: vel dec: detergentibus et consolidantibus mistis. Hic notandum est eandem plagæ, ne modo instilui perforationem Thoracis in Hydrope ... dilatato foramine ...

2da est ea Fistulæ Thoracis, quæ si primò in cavitatem penetrat, ... cum ... emollientibus vel corrosivis vel cauterio actuali, vel Musc: medicamentis et cutis pleuram (quam aliqui agglutinare desperant) supincumbentes agglutinentur, curanda est. 2º Si flexuosa, sinuosa, et in extremo imperforata, scalpello fistulâ cereâ in extremitate munito, incidenda erit. 3º Si carie ossis sit comitata, pulv: desiccantibus et ferramentis candentibus curetur. Si 4º sub costas ... immittatur ei canula argentea, vel ... filo munita, ejus fundo penetret, in quo ... facilem ... inveniente ... liquidorum detergentium tandem curetur.

3a est ea Cancri mammarum, qui post medica ... frustrà usurpata, ... erit duabus acubus fila ducentibus ... filorum extremi ... manu ... et manu dextra scalpello utrinque acuto fiat radicitus cancri extirpatio ... in ejus ... et ... ferramentis candentibus ... plagam ... sanguinis ...

Symptomata extra... vulneri ... applicando ... ex Bals. Copa. ... Hyperic. ... compositis; reliquis ... ordinariis consolidantibus ... ad cicatricem ... Ung. ... mastich. ... Ung. ... indatur ... ad aerem ... supra ... applicentur empl. glutinosa, compr. & fascia ... Charr.

... p. 145 ...

Nuck, Clerc, Garng. Charr. aiunt ... directionis esse ad distantiam 4 aut 6 digitorum transversorum à spina, & 4 sub inferiore mucrone scapulæ. At si tumor appareat, eo in loco ... incisionem fieri oportet. ... Nuck ... Charr. ... Herba ... ol. ... Solid. ... injectio.

Hydrotes.

... ol. ... Ung. ... q.s. ... oblinit.

... Fistulis.

... de fistulis.

... in quâ ... mamma ...

facam ... in libris: cura dein impleatur suppurantibus, farcolicis, et emollientibus.

Cavemus etiam in mammis ... ... lac in iis coquiatur) qui statutitis ... aperienda est, ... relinquendo. Habemus praeterea Papillas introductionem, ... suctione, ... ope vitri pro ea re ordinarii, ... ope phialae angustioris ... aq: coquenis impletae, dein aq: evacuata calide papillae impositae succurrendo. In mammarum inflam: coque micam panis triticei in lactis q. s. add. oleum liliorum ʒj. f. pultis.

4ta. 5ta.

Cap: 16: De Operationibus in Abdominis utilitate.

Vide Tumores et Ossions: item Annot.

... ... prominentia Umbilici est dicta nem ... ... quae varia ... nomine pro diversitate corporis et distendentium, ut sunt Enteromphalos, Hydromphalos, Pneumatomph: Epiplomph: Sarcomph: et ex his composita, ut Hydro-Enteromphalos, ... de quibus ... Si eminentia haec sit ... ab Intestinis ... Epiploo ... ambobus, Empl: astring: et fascia pulvinari aliquantulum duro et versus umbilicum praedita curanda venit, si scilicet parva ... si sit magna patienda; crudeles enim sunt Authores operationes: quarum 1ª fit penetratione basis tumoris (post intromissionem Intestinorum) acu filo duplici munita, et ejus constrictione: ut in Staphylomate diximus, donec tumor ob defectum alimenti decidat. 2da etiam eodem modo fit, sed sine acu. Si prominentia haec (ob ruptionem Peritonaei) fit in ulla alia parte Abdominis eodem plane modo ab aliquibus tractatur; sed melius est sutura ... et Musculis incisis, ut et laviis (si scilicet cicatrisata sit) peritonaei ruptura, ut et postea, ubi procedere sutura in vulnere abdominis ex exitu Intestinorum, ut et prominat.

Vide de Herniis in genere. Charr: Paing.

Vide alias curas et operationes in Nuck.

2da est ea Paracentesis in Hydrope, quae si Umbilicus non prominat, distentio et relaxatio, filumque transparens, ad latus musculi Recti supra musculum distentionem tribus digitis infra umbilicum, ... lateribus linea alba instituenda erit. Notato igitur loco sedentem ... semper in sinistro latere, eo quod hepar semper sit affectum, attramento, ... cum Scalpello curvo ... recto fiat incisio transversalis parva, ... ex ... Scalpello ... in cavitatem usque aquarum exitu et defectu ... ... Scalpello cognoscendam. Dein introducatur canula argentea, aut Plumbea, polita, et lata, in extremitate tribus aut quatuor foraminibus praedita, et curva aut recta, aperturae exacte in longitudine et amplitudine respondens, quae Empl: glutinante ... spongia, ... panno lineo quadruplicato, et fascia convenienti ... post extractionem duarum aut trium librarum, pro aegri viribus, aquarum semel aut bis in die, donec tota aq: extracta sit. Singulis viribus obturanda venit, nequaquam eam eximendo. ... 2do ex Nolerius, acu parva canaliculus inclusa, ejus cavitati in magnitudine (sed magis longa) respondens, qua postquam circiter duas libras aq: extraxerint, eximunt, et Empl: glutinante ... plumaceolis siccis aperturam sine ullo nota effusionis aq: (eo quod foramina peritonaei et Musculorum non correspondent) cooperiunt. Dein post duos aut tres dies, examinatis aegri viribus, aperturam de novo ... ... foraminis instituant. Siccque lente et tuto procedunt.

ex παρα, trans, et κεντεω, pungo, stimulo, quod a κεντω, findo, et εντος, intus. In lentioribus, cachecticis, pueris, aliisque morbo tenuiore laborantibus, vix instituenda operatio; sed fame contabendo; et in aliis melius instituenda operatio, nisi aq: moles nimis aucta, viscera male affecta, febris continua, respiratio molesta, virium prostratio eam dissuadeant. Nuck.

Operar.

3tia est ea Gastroraphia de qua in vulneribus Abdominis.

4ta est ea Fistula Abdominis, quae si externa sit et fundo imperforata, ut ea thoracis tractanda. Si sit interna ex perforatione Intestinorum, solis Medicis, ut Balneis minor: cut supra de Fistulis, curari possunt, si unquam.

Cap: 17mum. De Operationibus in Vesica utilitate.

1ma est ea immissionis Catheteri: qui manu dextra (postquam oleo aliquo imbut-

imbutus fuerit, lineâ cum lineâ albâ abdominis perpendiculari prehensus sine ulla violentia in penem manu sinistrâ aliquantulum elevato, deinde in vesicam per urethrae curvaturam introducatur, quo cum pervenerit, ejus pars convexa ossi pubis applicetur, deinde cum pene à sinistra ad dextram circumvertatur, ut ejus extremitas extra vesicam umbilicum occupet, et ejus convexitas intra perinaeum occupet; deinde si hujus ope urinam extrahere velis, oportet ut extremitas umbilicum supincumbens in linea recta deorsum ducatur, ut ejus convexitas vesicae fundum occupet; deinde si calculum explorare velis, immisso uno aut altero indice digito oleo inunctis prius secundum vertatur Catheter faciendum est.

molior methodus. per introducitur Catheter unâ extremitate latus umbilicum versus, alterâ anum respiciente, cumque in ultimis est longius non habet penis et Catheteris circumversio. Kuck. Clerc. Charr. Vaug.

praemissis generalibus, ut v. g. clyst. purg. cardiac. et diaphoret.

2da est ea Extractionis Calculi, quae 1o. fit apparatu minorem in infantibus, ligatis manibus ad pedum plantas, et pulvinari supra hominis recumbentis posito impositis, et separatis genibus, immissione unius aut duorum digitorum oleo inunctorum manus sinistrae in anum, pressione abdominis supra os pubis, ut calculus in perinaeum descendat; deinde incisione in Perinaei latere sinistro, et calculi digitis, per cochleari, per tenaculis exemptione, instituenda erit. Sed cum haec operatio nec in calculo magno, nec in adultis idonea sit, et cum pressio abdominis satis dolorifera sit, omninò apparatum majorem flagitant. Patiente vero mensae pulvinaribus tecta imposito, et fascia duplici, primo Kucka injecta, deinde sub axillis, deinde circa brachia, deinde circa femur, et denique circa carpos et pedes intortâ, convenienter ligatas et genibus ut prius separatis, introducatur in vesicam Itinerarius, et uti prius circumvertatur, ut pars ejus convexa perinaeum occupet, supra cujus crenam per aperturam firmiter in latere sinistro propter perinaei suturam inde digito indice alicujus servi, qui eidem deorsum quasi supra patientem reclinatus prehendam scalpello utrinque acuto panno lineo armato, donec ad Itinerarii crenam pervenerit, fit incisio pro magnitudine Calculi diversa instituta, in quam introducto Conductore, eximatur Itinerarius, deinde per digitis, per cochleari, per tenaculis diversis pro magnitudine patientis et calculi immissis, eximatur Conductor, prehendatur Calculus et post aliquales gyrationes educatur. Deinde explorandum si ulterius alter calculus in vesica remaneat, quo in casu iterum introducenda sunt tenacula supra eminentiam Exploratorii, quod postea eximatur. Denique a Urina: compressis et fasciis Oxicrato madefactis vulnus et abdomen tractentur, et femora prope invicem tenentur, ut vulnus citius consolidetur, nisi quod necesse est per sang: coagulati, et arena exitum expectare; ubi enim canula argentea per tres dies vulneri immissa in usu est. In foeminis post commodam situationem, uti prius, introducantur duo Conductores tenues, sed in uno latere aliquantum prominentes, in urethram, inde quas prominentias introducatur tenaculum parvum in vesicam, deinde eximantur Conductores, et Calculus uti prius, si sic parvus sit, per urethram educatur; sed si magnus, per tenaculis frangendus est, vel incisio in latere sinistro facienda est, sic inde Elitoridis erectores; deinde in usu sunt [illegible] uti prius.

v. d. ang: a renum [illegible] vesica [illegible]

per fiat seminum [illegible]

[illegible] eon: Quirei.

per Blanc. Vaug. Charr. Kuckà p. 138 ad 141.

Sequitur incontinentia post Lithotomiam per Kuck ubi modo et instrumenta.

Cap: 18vo. De Operationibus in Pene usitatis.

1a. Est ea Phimosis, seu glandis praeputio tectae, quod immissione Conductoris inde scalpello curvo in Conductoris crenam ducto, vel scarificatione per penitus incidendum, et ante operationem tentanda est [illegible] ppta.

per Charr. Vaug. Kuck Spumosus.

Lac. alterum cum Hic: [illegible] mem. [illegible] per aq. R. plang. aq. malv. [illegible] phoi. ana ℥ij. sp. matricul. ℥j. misc. [illegible]

2da Est ea Paraphymosis, seu glandis detecta, cui scarificatione et modulis succurrendus est. In utrisque dilatari potest praeputium vel spongia vel modulla in flammatione, ulceribus, et gangraenam provenientibus.

cū Sambuci pro mundis int ex se glandem impositis, ḡeralanda pries Spongia ppta.

3ia est ea extractionis calculi ex urethrâ ope Instrumenti cochlear parvi referentis, et digitorum pressionis, vel incisione laterali urethræ, vel incisione, vel immorata.

4ta est ea Separationis præputij et glandis ope scalpelli manuarij.

5ta est ea Excrescentiæ carnis in glande et præputio, quæ vel modus, ut vulo: secundo, vel ligaturis si earum basis sit arcta, vel incisione; cavendo ne sanguis corruptæ partes sanas exiens corrumpat, vel deniq; causticis vel potentialibus vel actualibus, curanda venit. Conspergantur aq. sublimata, qd opt.

6ta est ea Hypersarcosis in meatu urinario, de quâ vide Praxim. vel annot.

7ma est ea glande non perforatâ, quæ fit cultello exiguo, et penicilli epuloticis inunctis et in foramen immissione. ~~ximen:~~ — vel Nuck. ubi plura de penicillo quolidie fit mictio.

Cap 19mum De Operationibus in testiculis usitatis.

1ma est ea Bubonocele, quæ elevata cute et pinguedine inguinis transversaliter earumq; incisione, ope scalpelli recti, longitudinaliter, et labijs hamulis obtusis diductis, separatione tuniâ ope conductoris crenati, et instrumenti curvi in extremitate paululum obtusi, [ubi sit concavum] ne ex improviso pungat, donec ad peritonæi processus perveniatur facilè instituitur; postea intestini reducto pro viribus tentetur, quæ si succedat, consuta plagâ ad ejus cicatrisationem venire sufficienter venit; si non ipse peritonæi processus penetrandus est, sed sufficit; dein ea cautelâ, ope instrumenti prioris obtusi ne intestina lædantur; dein digitis vel ope conductoris dilatetur ejus plaga, imò et ejus annulus si adhuc intestina nolint reponi, ope scalpelli fibulâ muniti. Intestinis reductis foramini immittatur turunda ex lino confecta alb: ov: et ol: ros: imbuta, ~~vel vitello ovi et ol rosarum~~ abdomen et calore vulneris plumaceolis eodem imbutis digestivo tractetur; etiam deorsum illinatur: dein unoquoq; die vulnus plumaceolis novis tractandum est, quæ postea vel de est, sed turunda ante 4tum vel 5tum diem non renovanda est, quæ postea quater ejus usq; vulnere consolidari incipiente, rejicienda est. Puncto aureo.

— Eschinis. — vel ol. Ros. ℥ij et vitell ov: Noij simul concuss: et ol ttt — Nuck.

2da est ea Enterocele, de qua ut ubi de Sarcocele dixi. Institutionem etiam operationis ulceris Bubonocelæ vel etiam tumorum. De signis hujus et aliarum herniarum vel Chirur. p. 71. ad 76. et p. 80. Lores. Heuing. Nuck etc.

3tia est ea Castrationis quæ fit incisione partis inguinis et scroti longitudinali, separatione tunicæ testiculi vaginalis scroto adhærentis ope digitorum; dein post exemptionem testiculi ex scroto, ejusq; manu sinistra protentione, manu dextra acu filo duplici cerato munitâ armata penetretur vasa inguen tota illud et qd testiculus movendo et ligetur arctissimè subimposito compressa parva ne incidantur vasa eodem modo ut in Staphylomate; dein pollice una sub ligatura amputetur, et vulnus ut simplex tractetur, donec ligatura decidat. De hoc vide etc. Patiens tractando vel S. clysteribus, aliisq; gratis.

4ta est ea Hydrocele, nec qua vide Annot.

— vel Nuck. et Compend. Caus. et Curā tumorum etc. Heister, Lores, Heuing.

Cap: 20mum De Operationibus in matrice usitatis.

1ma est ea Incisionis, [de] orificij obturati ope scalpelli et conductoris, vel membranæ Hymen dicta, vel alterius de nativitate. ung. D. apomph: ex plumaceol. curanda, quod anteponendus et renovanda quoties mingit; vel ope speculi Matricis. — vel Canulâ plumaceolis, ne conjungantur labia distantia.

2da est ea Tuberculorum vel abscessum in vagina, ope speculi Matricis et sine dolore conspiciendorum, vel digitis tangendorum, qui si molles sint, maturati, et sine dolore, aperiantur scalpello curvo supra digitum indicem in vaginam intruso, et tractentur detergentibus et desiccantibus, ut semicupijs ex aq: minor: vel vino albo cum dec: scordij, scabiosæ, etc. quorum vapores in vaginam ope syringæ Matricis rejiciendi sunt; dein in usu sunt pulv. Sulfuris, C.C. usti, alum: etc. vel canalem cavi; videndi sunt: dein in usu sunt pulv. Ipulia, ... Hæc etiam prosunt in Hypersarcosi; deniq; injectiones ex vino albo et melle. Hæc etiam prosunt in Hypersarcosi vaginæ; aliàs incidenda erit vel evellenda instrumento à Fabritio in Polypo descripto, si sit nec cancrosa, nec dura, nec valdè dolorifica sit. — aq: minor: artificiosa, fiunt ex ☉, ☽, ♀, ♃ coctis in aq. com.

3tia

3tia Est in Uteri prolapsu: qui post dictam inflammationem, si ulla sit, ope Cataplasmatis emollientis sedatam, & post discussionem tumoris liquidi, fiat ... discutientibus) Candela cerea justae magnitudinis, cum addito ... & Castorei) sine violentia in situm naturalem reponendus est. Interea patiens sit capite declivi, cum genibus bene separatis, et, si opus sit, fiat evacuatio faecum ope Clysteris, ut major detur locus: deinde patiens sola in lecto tenenda, cum femoribus propinquis, et ventri et tergo applicentur Astring. Pessaria etiam & longa, & rotunda, & ovata, & perforata semper in usu sint, et linteo vino rubro calido expresso; tandem denique aliquantulum Astring: optima demum immissa prius in vaginam Metroncheila. Interea medela in usu sint.

4ta Est Extractio foetus mortui, & ope manus & ope hamuli, qui & ... dilatati & auri simul inflexis non matricem laedat, & 3o postquam ope ... pelli partes fuerint separatae, & denique partes. Postea placenta leniter a Matrice separanda et eximenda. De partu difficili vide p: 62: Praxeos.

Pessaria fiunt ex subere perforata, quae an: ... nectitur filum ad retrahendum; linteo bene tecta, deinde cera ... immersa, vel alia ... et vulvae ad fossam navicularem immissa, ope candelae cereae justae magnitudinis. Astringentia moderata ... tergo, dorso et lumbis.

Vid: Adversaria. Uteri procidentia duplex est, & corona, & uteri fundi. Clementes ... Rubio ... mach. et redibit ...

Cap: 21mum. De Operationibus in Ano utilibus.

1ma Est in Ani obturati, quae & scalpelli incisione cruciali ad angulos rectos, & lacerationem, si sit membrana tenuis, sit ope digitorum instituenda est; deinde canula plumbea & argentea medela cicatrisante obducta frequenter in Anum immittatur.

2da Est in Ani prolapsus, qui & quiete in lecto, & digitis panno lineo munitis, postquam Intestinum et: ros: myrtill: cum pauco pulv: Gallarum inunctum unguento ... sumendis, ... reponitur, & post, si inflammatum fuerit, detur foment: Dec: astring: et discut: reponitur.

In 3tia Est in Excrescentiis carneis, quae & forcipis incisione, & cauterisatione & ligatione ope fili serici et denique medelis causticis, perficiuntur, si non saliva...

4ta Est in Condylomatis, seu tuberculi parvi ex inflammatione provenientis, qui si durus sit et medelis non cedat, & in basi exscindendus erit, & ... gandus ut decidat, & tandem saliva ... curatus.

5ta Est in Fistula Ani, quae si ulceri Intestini Recti succedat, et in ejus cavitatem cum exitu tum flatus tum excrementorum saepe mistorum, tum odoris, cum injectione & in orificio fistulae externo & in anum, sed praecipue ope Explorationis et digitorum in anum immissionis cognoscendam penetret; tum si medelis non cedat, intrusione Exploratorii argentei curvati sive post ... educentis in orificio externo, ut per anum exeat, et ligatione duarum fili extremitatum ope fasciculi ligni, indies arctioris donec tota sinus ejusque intestina ... dantur, ab aliquibus curatur. Sed cum cura haec sit tarda et dolorifica, ideo statim post exemptum Exploratorium, immittatur Syringotomus curvus ... in extremitate munitus, cum quo, manibus duabus ejus extremitatibus prehensis, ictu quasi oculi incidatur tota sinus ejusque interstitium, deinde sang: fluxui ... macedolis siccis, inflammationi, calli consumptioni, carnis et cicatricis generationi, medelis consulendum est. Sed si 2do intestinum non penetret, sed ejus lumen ... ex extima (cujus tubercula aliqua suppurata causa erant) intime adhaeret, et cum medelis magis priori resistat, Exploratorio una extremitate ... dente, et altera fili ducente penetretur Intestinum; deinde per duos & tres dies ope fili duarum extremitatum dilatentur paratum sinus orificium ut facilius Syringotomus ubi prius in usum veniat. Denique si fistula Intestinum non ... tendat, immittatur in ejus fundum usque Conductor, in cujus cronam immittatur Syringotomus, quo tota caro fistulam superincumbens incidatur. Fuit loco Regalis ... curvus jam in usu est. et ... pro ... 6ta ... in usum venit. & Talcharione.

Compressis ... astring. im... ... et fascia pro ... et excipiatur ... fomenta vapor ... terebinth: pinnis ardentibus injecta. Bart. p. 72. Emp. ... Rosi. pini. Rhod.

& De fistulis in genere. Fistula 1 in carne, ... 2 ... mata..., ... nervos afficiat, dolores sentiuntur vivi et pungentes, humore effluens acris est & ... Si ... acrimonia ... comparatur, pus ... sit et colore carnis similes. Si penetret ad os, et cariosum sit, pus erit clarum ... et inflammatio ... dilatans ... Cap: ... ex & de fistulis.

Royal Bistory. ... cashet.

endivogius novũ Lumen Chym. p. 111.

gnis conservat terram ne submergatur aut dissolvatur; aër onservat ignem ne extinguatur; aqua conservat terram ne omburatur. / p. 112. Elementum aquæ sperma ac menstruum nundi est, tum et receptaculum seminis. /

6ta est de Hæmorrhoid., ꝑ 1d. maximè tumentibus, qui post derivationem aperitionem ꝑ sanguisugas, et applicationem astring: in vino austero decoctis ope spongiæ, aliorumque p. 46 Praxeos, cauterisanda sunt ꝑ ferramento largo, ꝑ capite rotundo, ita tamen ut non tangantur, sed solummodò calefiant hæmorrhoides, quod et faciendum erit ope canulæ alb: ov: inunctæ et in anum intrusæ, si sc. Hæmorrhoides sint internæ et rebelles. ꝑ 2d. Ulceratores, qui etiam canulâ in anum intrusâ, sed in latere foraminatâ, ꝑ stylo candente in eamdem immisso, ut desiccentur ulcera, curandi veniunt. Dein dolori Anodynis, eschara emollientibus, et Ulceri Sarcoticis et epuloticis prospiciendum. 3º. si Hæmorrhoides sit tam copioso sang. fluxu comitentur, ut mortem minentur, post V.S. cucurbitulas dorso applicatas, astring: externa et internas ferramentis ovalaribus candentibus (quod et faciendum est in eorum Gangræna) tangendi sunt, incipiendo à superioribus, donec omnes (exceptâ unâ) eschara obducantur; non enim tutum est omnes obturare, bonum enim est hæmorrhoides fluere, cum à pluribus malis nos liberent, ut in: flammatione pulmonum, Ulceribus, furunculis, tuberculis, terminthis, lepra, etc. deinde ergò aperitioni, si omninò fuerint suppressi, sanguisugis ꝑ ani frictione prospiciendum.

Cap: 22. De Operationibus in Extremitatibus

[Premittenda generalia, purg. Clyst. V.S. cardiaca, sedorifica, etc.]

1ma est de Amputatione membri sphacelati, quæ ꝑ in parte mortua pollice una à viva distante, dein cauterisatione partis putridæ ferramentis candentibus usque dum patiens vehementiam ignis sentiat, instituitur; quæ sanè methodo, doloris, sang: effusioni, corruptionis (quæ intra 4 dies à parte viva separabitur) progressui, præveniemus, si sc. à causa externa mortificatio hæc proveniat, et nullâ causâ internâ fomentetur: sed cum plerumque in dispositione aliqua interna sit effectus, ideò amputationem in parte viva ṗleriumque ꝑ semper instituimus, (nisi in casu quo mortificatio summam usque brevis, quatuor, aut pluribus pollicibus (nisi in casu quo mortificatio summam digitorum brachii ꝑ femoris occupans, incisionem in articulo ipso, quod et de digitis observandum est, postulat) ab articulo distantibus, si sc. de extremitatibus loquimur; ex. gr: 3bus supra cubitum, totidem supra carpum, totidem supra genu, sed ò quantum possumus ꝑ quantum articulus et mortificatio permittunt, à corde removendam esse; datur tamen exceptio in Amputatione tibiæ, quæ (in toto pedis sphacelo) supra malleolum institui deberet, quæ Br. hanc regulam (in toto pedis sphacelo) supra malleolum instituitur; videmus tamen ducenda foret, ut in manûs sphacelo supra carpum instituitur; videmus tamen ducenda foret, ut in manûs sphacelo supra carpum instituitur; videmus tamen eam quatuor aut 5. pollicibus infra genu, eo quod calor tibiæ amputationi foret incommodus, sequenti methodo amputari. Patiente ergo supra latus lecti sedente, et ministris circundato, injiciatur una ligatura crassissima et fortis quinque vel sex digitis, et altera spithamâ ad minimum à priore, supra locum incidendum, et altera spithamâ ad minimum supra genu quibus jam subjicienda erit parti posticæ, ut rotunditas communis, compressa media circiter ulnæ longitudinis; dein in circuitu partibus depressis) compressa media circiter ulnæ longitudinis; dein scalpello magno ab una parte ad alteram circa genu et malleolum à fervis firmiter detentis, præponendo, incidantur cutis et caro, duabus manibus a Chirurgo inter patientis tibias collocato, in parte antica, et incisâ circa ad os usque, dein dorsali parte ope scalpelli acutissimi et serrâ supra carne et ligamentis inter duo ossa, ope scalpelli acutissimi et serrâ supra partem ossis, deinde incisâ post applicatam promptissimè auferatur; deinde ossium in ligaturâ internâ solutâ et depressâ cute et carne (quæ antè ligaturam internam solutam servandæ sunt) ministri manibus, sang: effusionem inhibeant aliquantulum, et plumaceolo magno ex magnis effusioni, id. gibriolo cottone involuto.

transjectione acûs et ligaturâ etc., Charr. vaug.

ꝑ Praxim

ꝑ Charr. de sphacelo & gangrenâ, et ope: ra cum hac natura: Willis, Etmull. Sylvio. Boer: de sphacelo Op.

ꝑ the Bandage for amputation Leg.

vpannos in una extremitate fisso retractis cute et carne,

Angli applicant spiritum vini ... ... Boer Proc. 28.

albi ov. et toto, mistis ultima, et dein ... vitriol. usto, crop: ...

ex cottone, pulv: astringentibus ex bolo. thure, mastick: alum: calcinato: colo- ... mia, pilis leporinis, et sim. tectâ. 3º. Compressa parva quadruplicata aut triplicata sup vitriolo. 4º. Vesica bubula oxycrato madefacta in crucem incisa et pulv: praedictis aspersa. 5º. plumaceola altera priore largiori ex linteo confecta, et sim: pulv: tectâ. 6º. Vesica alterâ ut prior tractata. 7º. Empl: Defensivo. ... nimio ... mali ... 8º. Compressis in crucem tectis. 9º. Compressis tribus longitudinalibus et fasciis duabus, prospiciendo. Dein patiente in lecto reposito, ligatura in femore injecta solvatur, et elevato crure, ut sang: facilior detur refluxus, inflammationi jº. inunctione femoris ol: astring: dein Empl: Defensivi et fasciarum oxycrato madefactarum applicatione, praveniendum est. Demum crus hoc mutilata pulvinari imposita, minister manibus per duas aut tres horas firmiter detineatur, ut omnis haemorrhagiae metus aboleatur. Spatio in hunc ... Sed si in Brachio ...

Haec etiam omnia observanda veniunt in amputatione cubiti. Sed si in Brachio, ut in femore et alpote partibus cordi magis propinquis, et idcirco majori arteriis donatis, amputatione in stitutis, ligaturâ solum unâ, circa locum incidendum injectâ, et arteriarum (corpore pinullorum) filo cerato in extremitate ex nodo conveniente circumdatarum cum pauco carnis circumjacentis, ... ligatio, ubi ... prius compressa parva, in usum venit, ut et fascia circa corpus ligando; alii ... etiam compressa parva sextuplicata immediate supra vitriolum ante applicationem plumaceolarum applicata, sicque inter ambo totam differentiam observandam. Apparatus ergo sic institutus, non eximendus erit ad minimum per 48 horas, et saepissime non ante 5, aut 3tium diem; dein ad manus sit vitriolum, ut et plumaceola una pulv: astring: aspersa, ut vel ultimum (vel ambo simul, si ulla adhuc detur haemorrhagia) post cautam et lentam apparatus ablationem in usum veniat. Dein post 24 horas incheotur ... tio ... nimenti ex Terebinth: et vitell: ov: satis liquidi, usque dum escharae decidant, (qui partim detergens, partim incarnans est) ut et epuloticis, et plumaceolis siccis, ... ab... observando interea extremitati ossis semper apponendas esse plumaceolas siccas, usque dum pars ossis aere alterata decidat, et carne obducantur.

2da est de Coharentia digitorum manus aut pedis, vel à nativitate, vel post ustionem neglectam, quae scalpello longo et arcto (notato prius alteramento incisionis loco) incipiendo prius in digitorum medio, et ad eorum extremitatem tendendo; dein in eorum radice, et ad medium illorum perveniendo separanda est; demum plumaceola sicca et Diapalma in usu sunt, vel cerot: vel Diapomph: et fascia Gantelet, vel demi-gantelet.

3tia est de Digitorum ob cicatricem duram et crassam ulceris, succedentem Curvatorum, qui si emollientibus, vel Empl: de mucilag. ... curari nequeant, ad cicatricis ... incisionem, et novae, sed mollis, inductionem, deveniendum est. Sed si nimis recti sunt et inflexibiles, instrumento per vices sine violentia (post emollientia) usque in figuram naturalem seu angularem incurventur, qualia instrumenta in usu sunt in aliarum extremitatum incurvationibus, et rectitudine nimia, similiter vel ob conjunctivarum, vel ossium vitia. Dein dicendum de incurvationibus in Cubitis, Genubus. ...

4ta est de Pedum vel intra vel extra tortorum, qui tam in infantibus ligamentis convenientibus, et in adultis vel statim ut in luxatione, vel per vices ope instrumenti convenientis. ... Si sc. articulus humoribus induratis impleatur, prospiciendum. ...

5ta est de Cauterisatione actuali Articulorum, praecipue tumores, ... sc. ob nimiam ligamentorum laxitatem, praecipue si dolor ... temp:

4 Bol. arm. ʒiij. calc. viv. vitriol. ust. Aloes ust. ãã ʒj. Lap. Haematites Aloes lucid. Sang: Drac. terr. Lemn. Croc. Martis Mumiae ãã ʒiij. Mastic. thur: oliban. ãã ʒij. m. f. pulv. opt. astring: et incrassatis. Nuck.

x Colophonia seu resina sicca et ... Annales ... x pag. ante milit. obs. ... ad Prax.

x Si sit metus ... spirituosis ante ... Ung: ex Apio.

... sicco apponendo ... Sp: vini mastiche ... imbuti. Boer: vel pulv: ... aloes, vel ...

Empl. Oxycroc. cum opio ... post ante Cauterisationem ... tenlatam; ... incipere ...

tempori laborantibus accidens) suam cavitatem facillime deseruit et in eam facile etiam revertit, quo in casu cauterisatio in loco in quem caput femoris, ut ligamentorum inibi discutiatur laxitas, instituenda erit. Sed si e contra humores in cavitate ossis Ischij ita sint indurati, ut repositionem ossis tumoris reculent, tunc cauterisatio instituenda erit in latere ex quo recedit, ut ignis vis in cavitatem Ischij penetret, sicque tumor attenuetur et fluat; sicque in genu cum tumoribus induratis post frustraneum emollientium usum, folium cum succo suo usurpato est spatium ferri candentis quinque vel sex applicationibus in tumoris ambitu; alij etiam caustica potentialia, ut flammulam, et salis preparationem in usum ducunt.

Sta est de Paronychia, seu excrescentia carnis supra partem unguis, inflammationi et suppurationi succedentis, dolore violento, febre, syncope, et totius brachij inflammatione comitata, quae in initio decoctione emollientium vel aqua calida saepe fomentanda est, dein incisione facta secundum digiti longitudinem, inveniri solent duae maculae, una nigra, altera rubra (in quibus humor maligne et acer dolorem efficiens latitare creditur) quibus exemptis, cura spatio duorum dierum ope Theriacae et spiritus vini, et Defensivi supra totam manum peragitur. Si unguis corruptus sit, exscindendus est, et dein tota pars ulcerata (et os ipsum, si sit corruptum) cauterisanda est; denique si Sphacelo corripiatur, amputanda est. Est maculas nobiles non reperiri, ideo Paronych. tractanda ut alia inflam. et ulcera.

Paronychia duorum sunt generum, 1ma occupat carnem, 2da latitat inter periosteum et os. In utrisque incisio faciunda est in digiti latere, ne laedantur tendines. pro symptomatis utriusque vel lachrimis, pro fasciâ vel Pl. Dioc. vid. et Curam ib. Diet. 395. 504. 307.

1ma est de Unguis sede a latere in carnem incurvati, cum dolore acerbo intollerabili qui post eorum à carne separationem, et int. eos plumaceolorum siccorum interpositionem, forcipibus partitim spatio paucorum dierum sine violentia (donec tota pars carni infixa auferatur) exscindendi; et tenaculis partes incisae extrahendae sunt. Sit etiam deosculatio carnis extra et ultra unguem in latere affecto.
ope spongiae [illegible]

Cura sic modo varius unguis cum vitio semel in mense, ope praecemissionis. ib.

2da est de Varice seu venarum dilatatarum et aliquantulum intortarum, quae si modicae, astring. ut succo Hypocist. condensato secundum varicis longitudinem extento, et portione cannae premit suplicato tecto, vel Spongia filo circumtorta et succo Granat. vel Hypocist. imbuta et sim. curari nequeant, ad incisionem cutis et partis venam varicosam supjacentis, dein ad ejus supra et infra varicem post cautam ejus à partibus circumjacentibus separationem, et ope hamulorum incurvi pisae oblatorum elevationem, ligationem, subjectâ prius compressâ curvâ, deveniendum erit; dein vena int. duas ligaturas aperienda est, et vulnus apertum tenendum est donec fila decidant.
adde pecun. [illegible] vel pulver. astring. [illegible], dolore et cicatrix. vel annot.

vel succo acaciae vel vel sambuci ramo filo et excavato.

3a est de Aneurismate seu tumoris à ruptione unius tunicae alicujus arteriae provenientis, qui si parvus sit (pressu digiti disparens, sed facile rediens et pulsans) astringentibus, laminâ plumbeâ, et sim. aliquo curatur, minime tamen neglecta fasciâ convenienti, vel instrumento pro Arteriotomia à Scultet. Tab: 19. descripto. Sed si magnus sit cum murmure, quasi esset aq. bulliens, est incurabilis; nisi cum de amputatione membri vel periculosa ejus operatione, applicato torculari (tourniquet) cui comprestis subjectis, incisionem cutis sin. et duorum partium supra et circumjacentium, instrumento in extremitate oblato. in Bubonocele usurpato, donec ad arteriam deveniatur, dein ejus ligationem in utraque extremitate vel exspiciendo inspiciatur. In aq. ut in [illegible] procedendum. vel orationem in hunc usum.
vel tumores et obloni. in aq. vel annotata.

Ad tumores quos sive oblongos latiores à apprehendere. 21 Bulg. recent. Sapon. 3 pi. Terebin. aa ʒij. [illegible] et coque. imbuatur panno lineo aut linteo compresso et appli. [illegible].

Cap: 23. Operationes in Carne utilitatis vel annotata.

1ma est de Apertione Tumorum vel 10. licet. Cap. quae vel cau. potentiali fit. Sed hoc modo in iis locis timentibus ob metum Gangrenae, cicatricis deformis, et foraminis nimis magni) vel lanceolâ secundum fibrarum longitudinem ductâ instituenda erit, ne earum sectione tantum tali motus partis abolitionem, inflammationem et conv:

convulsionis membr. dolorem magnum, curam tædiosam, cicatricem deformem, [illegible] deniq. valorem [illegible] inducam. Idcirco in temporibus, fronte, naso, collo, sterno, dorso (sic paulo inferius) brachiis, tibiis, articulis omnibus incisio sit longitudinalis; in palpebris verò transversa & semicircularis; in latere thoracis obliqua sicut et in latere abdominis, et dorso paulo superius, secundum fibras musculi scapularis. Sunt tamen qui tumoris apertionem naturæ relinquunt, sed sæpè inconsultè, ne puris mora abscessus dilatetur et cura prolongetur; imò è contra ante suppurationem incidendus erit 1°. in articulorum abscessibus, ne puris præsentia ligamenta corrumpantur. 2°. in ulceribus ani ne intestinum temporis spatio lædatur. 3° in ulceribus partem aliquam considerabilem subjacentibus, ut in iis abdominis (præcipuè sub musculis) ne peritonæum et intestina, ut sæpissimè accidit, [illegible] [illegible]. 4°. in ulceribus criticè evacuatis ut in iis [illegible] [illegible] materia rejecta iterum retrocedat. 5°. in bubonibus venereis [illegible] cavendo interea nostro bubone semper intestinorum [illegible], & vasa ibidem varicosa. Si abscessus folliculo includatur, post incisionem partes incumbentes crucialem, si magnus sit, & longitudinalem si parvus, scalpelli manubrio & digitis separentur, et post incisionem vena ejus [illegible] nutrimentum adferentis, auferatur. ut melicerís, atheroma, steatoma, [illegible] et scrophulæ.

2da est sanationis vulnerum, quæ ratione magnitudinis, & medelæ [illegible] ut tota arandarum, & iis et fasciarum. Si vulnus sit longitudinale, & deniq. sutura, si sit transversale et superficiale particula. Si ita profundum fuerit [illegible] suturâ non possint approximari et sic conservari ejus labia, alia sutura l'Agraffe dicta in usu venit. Sed cum hæ duæ ultimæ [illegible] dolorificæ, et cicatricem deformem inducant, ideò operationes sint dolorificæ, et cicatricem deformem inducant, sutura sicca usurpata tum [illegible] in omnibus vulneribus adjicitur. De cæt: antea in vulnere simplici. Sed si vulnus fuerit inflictum [illegible] instrumentum aliquod venenatum, aut morsu canis rabidi cum dolore magno, inflammatione, fœtore, colore nigro livido, sanie pravâ, et sim. sese manifestantibus ad ejus cauterisationem ferramentis candentibus, saltem ad ejus [illegible] cum vino albo & malo [illegible] et [illegible] imò quævis parva & nulla dolor veneni suspicio [illegible] devenienda erit, ut omni gangrenæ motui prævenietur, et ut caro ante sarcoticorum vivida appareat. Si deniq. globuli plumbei sint in vulnere, et si 1°. parti vulneri oppositæ sint proximiores, et digitorum [illegible] [illegible] incisione ibi facta evellendi sunt. Sed si 2° [illegible] [illegible] instrumenti vulnus dilatatorii in vulneris orificium immissi deleganty. ope instrumenti [illegible] aliorum globulos prehendentis (quod in extremitate & cavum est, & dentatum, & [illegible]) ut globulo intricato [illegible] & [illegible] & [illegible], magnus & parvus [illegible] trahendi sunt. Si 3°. [illegible] exploratorii ob vulneris profunditatem [illegible] deleri nequeat, conciliato patienti situ versa vulnus, quod idcirco apertum tenendum est, & aliquo temporis decursu, ejus orificio tentanda [illegible] succedente, vulnus contra [illegible] et [illegible] intra corpus quod [illegible] [illegible] et Bals. [illegible] hora sit relinquendus.

3tia est sanatio ulcerum magnorum et sordidorum diu [illegible] [illegible] quæ ferramentis candentibus diversis, & tenuibus & crassis, & longis & brevibus & [illegible] parti imponendis, & supra eam [illegible] modo suspensis [illegible] prout ulcus majoris & minoris, magni & parvi & nullius erit [illegible] [illegible].

prius inflam: ante & post apertionem tumoris, imbuatur panno [illegible] & extra [illegible] Galeni, et applicetur.

In scirro nil tale moliendum. & vide ad curam tumorum.

Causam et curam omnium tumorum. ad 5. et vide ad eam.

[illegible] ad finem hujus libri et [illegible] Hydroph. [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] remedia. [illegible] et omnia [illegible] et Bals: [illegible] in hoc [illegible]. & ad finem hujus libri.

pannot.

Bibl: 525.
Si globuli & alia instrumenta [illegible] [illegible] [illegible] & R[illegible] & [illegible] [illegible] in vino albo, & [illegible] in [illegible] Raphano [illegible] [illegible] 11.

& P. 2. c. 2.

agitur futurâ circacirca applicentur lintea vin: rub: au. [illegible], & exquisite madefacta. & lamina ferrea tenuissima. Ulcera etiam fistulosa, si maligna sunt, cauterilanda erunt, introductione styli candentis in canalem fistulæ immissam, ut humiditas et callus auferantur. Hac enim methodo (plus quam ens est à Patiente veritâ) partis corroboratio optime procedit. et è contra Causticis potentialibus seu amentorum loco, à timidis usurpatis, partis putrefactio, et gangrena, et aliquando mors (ut cuidam pro ulcere sordido Arsenico et auripigmento tractato, cum maculis nigris, lumidis, et fætidis, variisque symptomatibus Arsenicum per os assumptum comitantibus, accidit) auferantur. Sondisij. & [illegible], De Claris la Charriere,

De suturas

Appendix

Chirurgia dividitur in Synthesin qua uniunt, Diæresin, qua separant, Exæresin qua extranea eximunt, et Prothesin qua organa deficientia restituunt. Hæresin qua partes reducuntur in situm naturalem, ut in Herniis et luxationibus.

De Suturis.

Omnis sutura est & 1º. Incarnativa, quæ dividitur in Entrecoupée viz. cum punctis separatis, quæ sola modo fere in usu est. 2º. In Emplumée, quæ fit præcipue in vulneribus profundis, ut prior erat ope panni replicati. 3º. In Entortillée quæ fit ladio serpentino. 4º. In ~~la Graffée~~ qua reuniunt ope uncorum, sed non est in usu. 5º. In Suturam siccam, quæ in faciendis fiat, & annot. ad vulnera faciei.

2º. Restrictiva, quæ dividitur 1º. in Pelletier, quæ in usu est pro intestinis et ventre, ex partibus cop tangis, 2º. In Cordonnier, et Couturier, quæ jam non sunt in usu.

3º. Conservativa, quæ fit uniendo labia in deperditione substantiæ, nisi multum deperdatur, quo in casu, sutura nunc non est in usu.

Suturæ 1º. sunt inutiles ~~in vulneribus transversis~~ 2º. In alteratis aere: 3º. In contusionibus cum vulnere. 4º. In deperditione substantiæ. 5º. In vulneribus venenatis. 6º. In vulneribus magnis et inflammatis. 7º. In vulneribus cum hæmorrhagia venæ aut art: comitatis, ut in Musculo temporali. 8º. In vuln: magnâ hæmorrhagiâ ossis detecto. 9º. In vulneribus pectoris, ob continuum ejus motum. Pannot. [illegible] non sanant, ignis sanat; quæ ignis non sanat, [illegible]

[illegible] Treatise concerning the Bandages invented by Hippocrates, and at present used at Paris for the Fractures and Luxations in the Body of Man and several other maladies.

We pretend not here to describe all the Bandages that Hippocrates mentions, but only such as are used in Practice; wherefore we the Parisians we reject the Rhomboid, the Scaffa, the Cancer, the Royal, the Bandages of 4, 6, & 8 heads, the Cap of Diocles, the Boulonnoi: & some others used by Hippocrates for the Head, having other sufficient Bandages for the same. We shall begin with the first of the common Bandages of the Head, call'd the Great Couvre-chef.

Chap: 1. Of the Bandages of the Head

S. 1. Of the great Couvre-chef.

To make this Bandage you are to take a Serviette fold it by the length that the two lower ends may pass two fingers broad beyond the upper part, & afterwards you are to fold the Serviette into 4 equally, that your Figures may be within & your fingers without, & that the right hand may fall

vaut Enchevillée.

^ l'Agraffée.

v Dellic. Sutor, Sarcinator seu Chirothecarius.

Haug.

hold the 4 ends, afterwards wt the left hand you are to take hold of the oyr End of the folds two fingers below it's margin, then wt the nail of the right Thumb you're to make a mark, then wt the same Hand you're to open the Cervice & hold still its fold wt the left Hand untill it be wholly opend; afterwards you're to take hold of it wt your two Hands on each side of the Mark, having your two Thumbs wtout on the largest Margin, & your fingers wtin, then you're to take hold of it & apply it upon the Head so that the Root of the Nose may be in a straight line betwixt your Thumbs; afterwards you're to apply the Palm of your right Hand above the napkin & wt the left to give to any that stands by the superiour Head to hold, then you're to place the left Hand where the right Hand was, & give the oyr superiour Head to hold likewise, both wch Heads you are to tie below the Chin, or to firm them wt a Pin; then the Chirurgeon is to take the two lower Heads by the Ends, & to draw them out equally, then to attach them below the Neck wt a Pin. To make this Bandage the more perfect, he must put his Thumb above the upper part of the Sinuosity, & draw from before to behind, untill all the Links that are to be seen on each side of the Face do disappear. Lastly, if you please, you may lift up all the Sinuosities on each side, & firm about the top of the Head.

§. 2. Of the 2d Couvre-chef.

This is made of a napkin folded cross-wise by the midle, & refolded into 4 folds equally by the midle, then you're to mark on each side of wch you're to place a Hand, having the fingers below & the thumbs above & to apply the napkin upon the Head directly at the extremity of the midle of the Brow, then you're to lead your two Hands backwards, still having your Thumbs above & your fingers below, untill you come to the Neck where you are to arrest them. Thus we have the two common Bandages of the Head wch are made use of in Practice. Now follow such as are proper to it.

§. 3d. Of the Bandages of the Front wt 4 Heads.

This Bandage is made up of a piece of Linnen an ell long & 6 or 8 fingers broad, folded by the midst of its length, & cut so as to leave a little of the midle whole. This Band is to be applyed to the top of the Head, or to the Neck, Brow, or Chin, Nose, or upper lip. Still placing the whole part of the Band upon the place affected, leading the two Heads upwards, the oyr downwards, crossing the first two, variously according to the Diversity of the affected place, so as to firm them. This Band interves likewise in [illegible]ties for all wounds in the Head & Brow, for all Ulcers in the Chin & Neck, & only to vary in it's length & breadth as the place requires.

§. 4th. Of the Uniting Bandage of the Brow.

This Bandage is made of a Band 2 ells long & 2 fingers broad, pierced in the midle, & rolled up wt 2 Heads. It is to be applyed to the Neck, & you are to draw its 2 Ends forwards untill you be near the Brow, then you're to pass one of the Heads thro' the hole of the Band (wch is always to be about the midle of the Wound) & to circulate 2 or 3 times about. This Band interves for all longitudinal wounds of the Brow & many oyr places of the Body.

^ Heads

§. 5.

§. 5th. Of the Discrimen for blooding the Brow.

This Band is sufficient for this purpose, & therefore rejected the Royal Scaffa. It's made of a piece of Linen 3 ells long & two fingers broad, roll'd up wt one Head, wc you are to hold wt the right Hand, and to measure as much of the End as will go from the Brow to the Neck, then you are to hold the measured piece of the Band wt the left Hand next unto the Globe & to apply it above the Compress (suffering the rest of it to hang down the Face) & to firm it wt your Thumb, & wt the right Hand to lead the Globe obliquely above one of the Parietals thence to bring it to the Neck, from that to the oyr Parietal, yn to cover the compress, afterwards you're to lift up the End of the Band wc was hanging over the Face, & to lead it obliquely above the left Parietal, so as to make it correspond wt that part of the Band on the oyr Parietal; lastly wt the right hand you're to circulate the Globe 3 or 4 times about the Brow. This Band serves likewise for blooding of the Temples, when there Veins or Arteries.

§. 6th. of the Bandage for one Eye.

It's to be 3 ells long 2 fingers broad; if the left Eye be affected the Band being rolled up wt one Head is to be held wt the right Hand, & the end to be applyed to the Neck with the left, & to cover the Eye, then to mount obliquely above the Brow to the upper part of the right Parietal, then to descend unto the Neck, then to repass above the first cast of the Band untill you circulate to the Neck, & lastly y're to circulate 2 or 3 times about the Brow, & to arrest it wt a Pin.

Before you apply it, you must cover the Eye with a round Compress of Linnen steeped in an appropriate Liquor.

§. 7th. Of the Bandage for two Eyes.

It is to be 7 ells long & 2 fingers broad, to be rolled up wt one Head, & is to be applyed by its End to the Neck, as the former was, then wt the Globe held wt the right hand, y're to pass above the left Ear as before, & to mount up to the right Parietal to the Neck, yn y're to return forwards & pass above the oyr Parietal, then above the right Eye, then above the Neck, then y're to pass above the first cast of the Band, then to go unto the Neck, lastly to circulate above the Brow.

§. 8th. Of the Common Bandage of the Nose, called Stapponi.

The Sol of Amyntas.

To make this Bandage y're to measure from the top of the Nose to the Neck wt its end, wc portion is to be 2 large thumbs broad, all the rest of the Band is to be divided into two, wc are to hang down over the Breast, then y're to take a small ribban & to ty it above the Bandage exactly below the Nose, by conveying its ends unto the back of the Neck, & then to be firmed, then the two Heads that hang over the Breast are to be lifted up & to cross under the Nose, & to go by each side by the small corner of the Eye, & to be firmed at the Neck, providing the affection of the Nose be but inconsiderable; but if the Nose be fractured, then these 2 heads are to be crossed at the Neck, & to return above the Ear on each Parietal, to cross above the Nose, then to descend by each Cheek & to go backwards under each Ear to the Neck, y're to cross & remount under the Ears to circulate above the Nose, then from thence to go back unto the Neck, then to cross again, & to remount above the Ears & to circulate above the Brow wc if you do the Bandage is call'd the Sol of Amyntas.

§. 9th.

Capeline.
vid. Ch. 4. S. 6.
& Ch. 3. S. 1.

S. 9th. of the Bandage call'd the Capeline.

This is but very rarely us'd in the Head, but always in the Extirpation of the Leg or Arm. It is to be made 6 ells long, 2 inches broad & to be rolled up wt 2 Heads, wc are to be held wt your hand. then you're to place the midle of the Band upon the Brow, & wt each hand to go back above the Ears to the Neck, where each hand is to change ye globes; then your left hand holding the globe wc was in the right must be still at the neck untill the globe in the right hand wc got over the other. Shall advance towards the Temple, where it is to be stilled untill the globe wc was stilled at the Neck be lifted up & pass above the Sagittal suture to the root of the Nose, then it's to stay till the globe wc was stilled at the Temple shall pass over it above the Brow toward the other Temple; then you're to stop untill ye lift up the other globe & pass wt it to the Neck above the first cast of the Band, leaving the 3d part of it uncovered (wc is call'd to form Doloires) & thus you are to continue circulating wt a globe & making Renverses & Doloires wt the other, untill the whole head be cover'd, observing to make all the Renversions on the Brow & Neck. This Band serves for firming of the sutures of the Head wn they are too lax.

Compound
Chevestre.

[illegible] Ch[illegible] [illegible] ac ou[illegible] [illegible] scripta hic infra in marg.

S. 10th. of the Compound Chevestre for the Fracture & Luxation of the Lower Jaw.

This Bandage is so call'd becau. it resembles a Bridle. It is 6 ells long & 2 inches broad & to be rolled up wt 2 heads, then to be applied under the Chin & to mount upon both sides nigh the lesser corners of the Jaw to the crown of the head, then you're to cross & change the globes, then to descend to the Neck, then again you're to change the globes & to cross again & to return about the neck under the Chin, then you're to cross again & to remount as before, & redescend to the Neck to return under the Chin, then again for the 3d time you're to make the same progress, observing to make doloires on every side untill you come to the Chin, above wc the Band is now to pass, & not below, observing in the mean time never to cross above the Chin, but under one of the Ears, so having made the Band smooth above the Chin, you're to go back unto the Neck, then you're to cross, & if there be enough of the Band, return once above the Chin, & so form the Band call'd the Mentoniere, otherwise to circulate above the Brow once or twice, & so to finish it.

Mentoniere.

Simple
Chevestre.

[illegible] al[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tran[illegible] [illegible]

S. 11th. of the Simple Chevestre for the Lower Jaw.

This is to be 3 ells long & 2 inches broad, & to be rolled up wt one head, then if it be the right side that is luxated or fractured, you're to hold the globe wt the right hand, & the end of it wt the left, then you're to place your 2 hands at the neck, & to bring them equally forwards, untill you come under the Chin, then wt the globe you're to pass above the end of the Band, then wt your right hand you're to hold the end of the Band & wt your left to mount up wt the globe about the luxated Condyle to the crown of the head, from thence to descend to the neck by the left side of the occipital, & to remount by the right towards the crown, thence to descend by the left Condyle under the Chin, then you are to remount, & observe the first cast of the Band untill you return

under

under the Chin again, & so y're to do a 3d time, observing to make doloires on the luxated side only, & not on the oyr; lastly y're to pass to the neck & to circulate once or twice about the Brow, & so to firm the Band.

Ch: 2d. Of the Bandages for the upper Extremities of the Body.

§. 1. Of the Spica for the Luxation of the Shoulder.

Simple Spica. *+Ch. 4. §. 1.*

The Spica is eyr simple wt one head or double wt 2. The simple is first apply'd by placing the Head or End of the Band under the whole arm-pitt, thence y're to mount forward by the neck untill you come to the top of the affected shoulder, then y're to pass from behind to before under the arm, & to form a X on the top of the shoulder, firming it wt a Pin, & so y're to pass by the Back under the oyr arm-pitt, then above the first cast of the Band to form anoyr X, always to be firmed wt Pins, & so y're to do a 3d time, observing still to make doloires upon the top of the shoulder; afterwards y're to circulate below the joynt once or twice, then to cover the Interstice betwixt it & the top of the shoulder, by passing from the inner part of the arm towards the back; lastly y're to circulate about the Body (it's to suspend the affected arm wt the Band, by bringing it under its wrist & from thence by mounting up above the affected shoulder nigh the back, & from thence to circulate about the Body once or twice, & once or twice above the part of the arm affected.)

not used but in hot countries.

Double Spica.

[illegible]wards y're to apply the Double Spica, wc is to be 8 ells long & 4 inches broad, it is to be placed under the affected arm-pitt, from thence y're to mount on each side to the top of the shoulder, so to cross; then one globe is to go forwards & the oyr backward untill you come to the whole arm-pitt, then y're to cross again & to return & to cross above the shoulder as before, thence y're to go again under the whole arm-pit, & observe the first cast of the Band 3 or 4 times; afterward wt the globe that goes forward by the breast y're to circulate once or twice about the arm & close the Interstice, as in the simple Spica, & firm it circulating about the Body; lastly wt the globe that comes by the Back y're to suspend the arm, & come above the affected shoulder, to circulate about the Body & so to firm it.

§. 2d. Of the Double Spica for the Luxation of 2 Shoulders.

anoyr Double Spica.

It is to be apply'd under one of the Armpits, & so to cross above the shoulder, thence to pass crossing under the oyr arm-pit, then to pass above the top of the shoulder, then likewise y're to cross, & so y're to continue 3 or 4 times by making doloires on the top of the shoulder, then wt each globe y're to circulate once or twice about the arms, & to close the Interstices as formerly, & lastly to firm the 2 heads by circulating about the Body, then y're to suspend the 2 arms wt Scarfs.

§. 3d. Of the Bandage for a fractured Shoulder.

If it be broken near the Articulation of the Omoplate, then y're to make use of the Spica formerly described; but if it be broken in any oyr part, y're to make application of an Emplaster & Compress, & of 3 or 4 bands according to some; but we think that 2 or 3 may suffice, each of them 3 or 4 ells long; y're to apply the End of the first band to the outside of the Bone, providing the Bone wch is broken appear inwardly, & to circulate 3 times about the fracture, then y're to mount by little doloires untill you come unto the Arm-pit, then y're to descend by the same doloires untill you come above the fracture, then y're to circulate twice, then y're to descend below the Elbow, leaving it uncovered, then y're to apply the

Carlons what?

the longitudinal compresses & scobs above them, & to circulate twice above the fracture, & to ascend & descend as you did wt the former Bandage, afterwards y're to apply two pieces of Past-board, each of them 6 fingers broad, & about the same length wt the subjacent scobs, called Carlons wch are to be firmed wt 3 strings, one in the midle & anoyr at each of the ends to suspend the arm in a towel.

§. 4th. Of the Bandage for a fracture of the Cubitus.

They are ever 4 or 2 in number as in the Arm, the first is to circulate 3 times above the fracture, & to ascend by doloires above the Elbow, wch is to be kept folded, then y're to descend & circulate 3 times above the fracture & go towards the wrist then y're to apply your compress & scobs, & wt the 2d Bandage y're to make the same progress as you did wt the first, afterwards y're to apply your Carlons & firm them in the Arm, & lastly to suspend the arm in a towel.

^ two

Doloire

§. 5th. Of the Bandage called Doloire. for the Luxan of ye Elbow.

It's about 5 ells long & 2 inches broad, & rolled up wt one head; it is to be applied to the inferiour part of the Humerus, yn y're to circulate 3 times & descend by the fold of the Elbow, & to circulate as often on the superiour part of the Cubitus. thus y're to ascend & descend by the fold of the Arm, & to make little Doloires from above to below, & from below to above, untill the Elbow be whole covered, afterwards y're to mount by Doloires to the Arm-pit, & to circulate twice or thrice about the Body.

x §. 6th. Of the Bandage for the Aneurisme.

x. The common Bandage for ye S. is used, either wtout twisting, or by twisting on the wound, after the Scots fashion wch is best, bec: it presses more on the wound & so hinders all Remorse shaggy. Glove.

It's to be 6 ells long & 2 inches broad, & to be rolled up wt one Head; y're to apply the end of it above the Elbow, & to pass about the Compress, then to go from above to below, & from below to above forming little Doloires, yn y're to circulate several times in the fold of the Arm, & mount by Doloires, & circulate about the Body.

§. 7th. Of the Bandage for the Luxan of the wrist.

They are to be 3 in number, each of them 2 ells long & 2 inches broad, with the first y're to circulate twice about the Luxan, & to descend by little Doloires, & to pass betwixt the thumb & first finger, then y're to ascend by Doloires, & to rest above the Elbow; the 2d Band is to make the same progress, & the 3d is to be used above the Carlons, & to end wt the rest, but not to pass betwixt the thumb & first finger.

§. 8th. Of the Bandage for the Luxan or fracture of the thumb or finger.

It's to be 2 ells long, y're to circulate wt it 3 times about the wrist, then to descend towards the thumb or finger, & cover it by little doloires, then to ascend & finish it, circulating about the wrist. If only one of the fingers be fractured, y're to use the same Bandage, observing as you descend wt it, to cover the little Scobs.

^ after applying Scobs or Carlons

§. 9th. Of the Bandage for the Metacarp. & fracture of several fingers.

It's to be 2 or 3 ells long & 2 fingers broad; y're to circulate wt it above the wrist, & to descend by Doloires untill you come to the root of the fingers, then y're to apply a Carlon & a Compress & to ascend wt the Band, & to firm it by circulating about the wrist. This Bandage will serve for the fracture of 3 or 4 fingers at once, providing you advance wt it to the end of the fingers, & in returning subject a compress under its Carlon, observing to keep the Palm of the hand folded.

§. 10th. Of the half-Bandage & intire Gantlet for the Luxan of several fingers.

Intire & half Gantlet.

Y're to begin at the wrist, & to descend by Doloires & cover one of the fingers, then to ascend to the wrist, & descend to anoyr finger, & so do wt as many as are luxated. If you cover the whole fingers, by reason of the Luxan of more joints than one in one finger, then it's call'd the Intire Gantlet; if you cover the root of the fingers only, it's call'd the half Gantlet.

Ch. 3.

Chap: 3d. of the Bandages used in the Trunk of the Body.

§. 1. of the Bandage for the Fracture of the Clavicle.

If it be fractur'd nigh its articulat'n wt the Omoplate then y're to make use of the Spica formerly described; but if in any oyr place then the Band is to be 6 ells long & 4 fingers broad, & to be rolled up wt 2 heads; then holding the 2 globes wt your 2 hands y're to begin under the arm-pit that is nighest the fracture, & to mount unto the top of the shoulder & to cross, then y're to conduct one of the globes forwards, then to rest it untill the oyr globe by circulating under the oyr armpit shall pass above it, then the globe that was rested must be turned upwards or make a Renverse towards the back, then its again to stop untill the oyr globe shall pass above it, & thus y're to continue to circulate about the Body wt one globe & to make Renverses wt the oyr; wherefor 2 persons must be employ'd untill a good part of the Clavicle be covered, then y're to finish the 2 globes by circulating about the Body, or if you please, wt the globe that made the Renverses to suspend the arm.

[illegible] Clavicula prope articulati: onem cum scapula. [illegible] etiam instruments ferrea ad omoplatas anteriores promendas [illegible] similes [illegible] delicatulas ac fili: arias [illegible] magis [illegible].

§. 2d. of the Bandage for the Fracture of the Omoplate, called Etoile.

Its to be roll'd up wt one head. y're to apply its end, if the right Omoplat be fractur'd under the left arm-pit, y're to mount obliquely above the fracture to yt upon the right shoulder, then y're to go under the arm, & by making a X above the fracture, to return to the top of the oyr shoulder, & from thence y're to pass under the arm-pit to make anoyr cross on the Omoplate. thus y're to continue untill the whole afected place or Omoplat be covered, & lastly to circulate about ye Body.

Etoile & Etole.

§. 3d. Of the Quadriga for the Fracture of the Sternum & [illegible]

Its to be 5 ells long & 4 fingers broad, & to be rolled up wt 2 heads, & to be apply'd under the arm-pit to cross upon the top of the shoulder, then y're to conduct one of the globes forwards by the Breast, & the oyr backward by the Back to the oyr Arm-pit, wn y're to cross, then to return by circulating as often as you please. This Bandage serves likewise for the [illegible] of the Ribs, if there be more than one fractur'd.

Quadriga & Bin: 474.

§. 4th. [illegible] Serviet wt the Scapulary for one Rib.

Its to be made of a Serviet at 4 [illegible] & to be roll'd up wt 2 heads, wc y're to hold wt your 2 hands, then y're to place the midle, having first apply'd your [illegible] & Compresses upon the fracture, then to circulate wt the 2 hands about the Breast, having first apply'd the Scapulary both before & behind, wc serves to suspend the Serviet. the Scapulary is a band of six inch broad with a [illegible] in the midle for letting the head thro', and the 2 ends pass under the Serviet, & to be mounted to be pinned to it.

Serviet & Scapulary.

§. 5th. Of the Bandage for the Fracture of the Coccyx & several oyr Maladies of the Fundament.

Its to be made of a piece of Linen 10 fingers long, to wc y're to sew a [illegible] piece of the same length. [illegible] its to be apply'd, & firm'd above by a Band wc circulates about the Body, & below to each of its corners y're to attach 2 little Bands wc are to be brought up by the [illegible], & to be firm'd to the circular Band, observing to make an incision betwixt the 2 lower corners of the Band, for freedom of the Fundament; afterwards y're to apply anoyr [illegible] sewed to the [illegible] wc is to attack'd as the first was; & lastly the Patient during the Cure is to sit in a hollow seat.

§. 6th. Of the Bandage for the Yard.

Its to be an ell long & an inch broad; its to have a hole in one of its Extremities, & the oyr to be divided, then having apply'd your Compresses [illegible] cut

cut in the figure of a X of Malta wt a hole in its middle, y're to apply the Band about the Extremity of the Yard, by passing the divided thro' the hole of the oyr head, as it were to make a ring about the head of the Yard, yn y're to ascend by Doloires to the root of it, then y're to firm the Band by tying the divided heads together.

§. 7th. Of the Suspensory for the Scroty.

Having formed the Band according to art, y're to fix to it 4 little Bands 2 above & 2 below, the uppermost are to be attach'd to a circular Band, & the oyr are to pass backward, & to be firmed to the same Band.

§. 8th. Of the Bandage for the Lithotomy.

This Band is nothing but a Sprond wt 4 heads & a Scapulary firming one anoyr. The Scapulary being apply'd, y're to place the whole part of the Sprond above the wound of the Poiande, then y're to take the 2 uppermost heads, & to mount them on each side of the Yard, then y're to put them thro' the point of the Scapulary that hangs over the Breast from wch to wtout, & then to conduct them to the back, & there to be tyed; then y're to take the 2 lowest heads of the Sprond, & to put them betwixt the thighs towards the Hips, then y're to conduct them to be firm'd above the knots wc the 2 uppermost heads of the Sprond did make upon the Scapulary.

Apparatus for the Lithotomy.

Chap: 4th. Of the Bandages us'd in the Lower Extremities.

§. 1. Of the Bandage call'd Spica for the Luxat'n of the Thigh.

Spica 4 Ch. 2. § 1, 2.

It's to be 6 ells long & 5 fingers broad, & is to be rolled up wt 2 heads; y're to begin on the List or circle of the Thigh, & to cross wtout upon the top of the joynt, then y're to conduct the 2 gloves, one before & ye oyr behind, & to cross above the oyr, hence y're to return & cross above the top of the first joynt as before, & to pass to the circle of the Thigh, then y're to cross again once or twice more to make the same progress, otherwise to make Doloires as on the top of the Joynt; afterwards y're to circulate once or twice about the head of the Bone, & about 2 inches below the joynt, & then to conclude on the Intestines, & lastly to end the Band by circulating about the Body. This Band serves likewise for the Fracture of the thigh bone near the joynt. If you please, before you apply this Band, you may use the simple Spica wt one head, wc may sufficiently be understood by its description in the Luxat'n of the Shoulder.

§. 2d. Of the Bandage for the Fracture of the Thigh in any part except nigh its Head.

They are to be 3 in number, the first, after applicat'n of an Empl. & compress, is to circulate about the Fracture, & then to ascend by Doloires, & to end by circulating about the Body, therefor it must be 5 or 6 ells long & 5 inches broad. The 2d is to circulate about the Fracture, then to descend by Doloires under the Knee, then to return & end wt the first, circulating about the Body; afterwards y're to apply your Scobs as you did in the Arm, having fill'd the inequalities of the thigh wt transversal & longitudinal Compresses, & to firm wt the 3d Band, then apply your Cartons wc are to be firmed wt 3 Strings as in the Arm, & lastly y're to apply the Jannons, as in the following section.

§. 3d.

§. 3d. Of the Spannons us'd in the Fracture of the Thigh, Leg, or Rotula.

Spannons.

To make the Spannons, y're to provide 2 long round Sticks of the bigness
of your finger, & to surround them wt Straw, then to firm the Straw about ym
bye a String about them, then y're to provide a pair of Sheets, & fold them by
the length, so as they may be of a right deepness wt the length of the Sticks,
wc for the Thigh must be 3 quarters or an ell of length, & for the Leg half
an ell, then y're to put in the Sticks in each end of the Sheets, & to sow ym
in for the greater firmness, yn y're to roll in the Sheets in each end, untill
each roll be as thick as the half of the Leg, then y're to put under them
the Leg, & under them 6 Strings, & w'in them a Compress to fill up the in=
equalities of the Leg above the Ancle & under the Knee, then y're to roll
up the Spanons to press the Leg & Thigh on every side, having first plac'd
a longitudinal Compress in the anterior part of the Thigh & Leg, observing
to make the inward Spanon shortest, then y're to firm wt ye Strings, be=
ginning first wt the midle, & lastly y're to apply as a sole of a shoe to the
sole of the foot, & to firm it wt a String on each side, wc are to be tyed to
one of the Strings of the Spanons. Two pieces of the form of a broad which
crossed & fastened together in the midle sustains the Bed-cloaths.

a piece of board lin'd on inside wt a compress,

vide §. 7.

§. 4th. Of the Bandage for the Fracture of the Rotula.

The first is to be rolled up wt 2 heads, & to be 6 ells long & 2 inches broad,
providing you make use of one only, wc may very well suffice for the 3
describ'd by some: y're to apply its about the Rotula, to cross under the
Hough, then to pass & circulate below the Rotula, & so y're to continue to
conduct the 2 heads above & below the Rotula crossing still, sometimes
on the oyr side of the Hough under the Knee leaving the Rotula unco=
vered untill the Band be finished. For as we said before some employ
3 Bands, each 2 ells long, each of wc make one & the same progress: after=
wards y're to take up a Band 5 ells long & 4 fingers broad, rolled up with
one head, wc is to begin under the plant of the Foot, to mount up by Do=
loires & Renverses to circulate above & below the Rotula wt the oyr Band,
or rayr to go above a carton covered wt its Compress, about 12 fingers long
& 8 broad, wc is to be plac'd in the Hough, able wt difficulty to keep the
fracture either firm or loose at your pleasure to panse the Patient wt=
out conciliating any trouble to the part make use of the reuniting Ban=
dage if the Fracture be accompanied wt any wound, you may easily or=
der your affairs so that having your plaister & Compress perforated towards
the wound, you may panse it wtout removing the Scots, observing in this
case, as in the former, to make use of the Spanons. If the fracture of the
Rotula be longitudinal, then y're to make use of the following Bandage.

§. 5th. Of the Bandage for the Luxa'n of the Astragalus.

It is to be 3 ells long & 2 inches broad; y're to circulate once or twice about
the Ancle (applying the end of the Band outwards if the Luxa'n was inward)
then the end is to pass by the forepart of the Foot under the sole of it, then
y're to return & cross above the Foot, & to circulate above the Heel, so
continue by passing by the forepart of the foot & under the sole of it & above
the Heel, untill the Band be finished. This Band serves likewise for
the Luxa'n of the Foot occasion'd by the Heel-Bone. If the Bone of the

Parts or Metatarsi be luxated, y're to make use of this same Band, only that y're to descend obliquely above the foot, & to ascend obliquely so as to form Interstices like unto Lozens, untill at length you finish your Band about the Ancles.

§. 6th. Of the Bandage for the Amputation of the Leg.

vid. Ch. 1. B. 9.

Before we describe the Bandage, we must first give an account of the Invenon used in regulating the flux of blood immediately wt the Amputation, called the Tourniquet, wc is nothing but a piece of Ribband tied closely above the Knee above a thick Compress, below wc they place a piece of wood about half a foot long, by twisting of wc you may more or less stanch the part at your pleasure. Thus we have describ'd it sec its much used in our practice. Suppose then all the Medicaments were apply'd to the amputated member, y're 1. to apply the end of a Band 5 ells long & 4 fingers broad above the Knee to circulate twice about, then to pass above the midle of the stump towards the midle of the Hough, there y're to make a Renverse & to return above the stump, about the Rotula, again y're to make anoyr Renverse, & to repass by the stump of the Hough, & to circulate untill the stump be covered; then if you please, you may mount it by Doloires to the Risk, & lastly to end the Operan wt Spanors. Some wt the Band make no Renverses, but cover the stump wt Doloires, as well as they can. Afterwards y're to make use of the Capeline rolled up wt 2 heads, wc y're to apply to the back part of the stump & to circulate wt its, then wt one of the Globes y're to make Renverses above the stump, & wt the oyr y're to circulate above the globe wt the Renverses, & to continue till all the stump be covered. If the Fracture of the Rotula be longitudinal, yn y're to make use of the uniting Bandage.

Capeline.

§. 7th. Of the Bandage for the Luxaon of the Rotula, called Tortue.

Testud. vide §. 4.

It's to be 2 ells long & 2 finger broad, & to be rolled up wt 2 heads, wt wc y're to circulate twice above & twice below the Fracture, then y're to circulate above the Rotula it self; afterwards y're to continue circulating above & below it, to make Doloires from above to below, & from below to above untill the Rotula be wholly covered, then y're to firm wt a Carton & wt a Compress in the Hough, & then finish the Operan wt Spanors.

§. 8th. Of the Bandage for the Luxaon of the Knee.

This differs little or nothing from that wc is used in the Fracture & Luxaon of the Rotula, therefor we refer you to its Description. §. 4. & 7th.

§. 9th. Of the Bandage for the simple Fracture of the Leg.

They are 3 in number, the first is to circulate thrice about the fracture & to ascend by Doloires, & to end above the Knee; the 2d is to circulate thrice about the fracture, & to descend by Doloires under the foot, & to ascend by the same unto the Knee & to end wt the first; then y're to apply your Cartonage, & firm wt strings your Spanors.

afterward a circular compress, for making all the leg equally gross; & then the 3d Bandage wc is to make the same course wt the second.

§. 10th. Of the Bandage for the Complicated Fracture of the Leg.

This Bandage consists of 18 heads, & is to be apply'd so, that the patient's leg need not be moved in the time of Dressing. We shall omit the Description of its applicaon, because the seeing of the Band doth sufficiently teach us.

§. 11th.

S. 11th. Of the Bandage used in Scotland for all fractures, whether compleat or incompleat, simple or compound.

Having apply'd an Emplaster, & above it a thick transversal compress of 5 or 6 plies at the back, & a longitudinal one to fill up all inequalities of the fractured place (if there be any) y're to apply your Scots wt compresses under them, then y're to firm your Scots wt 3 strings, one in the midst, & one at every end of the Extremities loosely tied, that below each of them you may introduce a piece of perforated timber like a tobacco stople of about 2 inches long, each of them y're to turn about, untill the 3 strings press the Scots sufficiently, then y're to firm all by thrusting thro' a piece of wire or a long piece of timber like to a spindle, by this y're able to firm all by circulating above the knot.

The [illegible] are used above this.

Hæmorrhag: varorum sistens opt. Le Clerc. p. 184.

℞ aceti ℥ij colcoth: ℥j Croc. Mart. astring. ℥iv ℥ß [illegible], et eo imbue Moschus quercei aut lini seu stuppam, cui demum inspergatur pulv: fungi seu crepitus lupi, et applicetur vulneri, vulnus bene ligetur fasciis.

Ad Hæmorrhag: varorum sistendas Cauterium potentiale præstantissimum. Clerc. 185.

℞ vitriol: pulv: fungi seu crepitus lupi āā p. æ. applicentur loco unde fluit sang. sup. lin. cavendum a nervo & tendine, vitriolum enim convulsiones excitandi capax est.

Instrumenta Chirurgica. Le Clerc.

Portatifs. Bonne paire de ciseaux, un rasoir, un bistori droit et un courbe, une spatule, une grande lancette pour les abcès, et de plus petites pour les saignées; une sonde creuse d'argent ou de fin acier, plusieurs autres sondes droites, courbes, brisées, et de different grosseur, une canule d'argent ou de fin acier pour porter le bouton de feu sur une partie eloignée sans se mettre en danger de brûler les voisines, une autre canule servant d'étui à aiguilles, faite en siflet par l'un de ses bouts pour faire des coutures, un carlet, c'est une grosse aiguille triangulaire, une feuille de myrthe, une petite lime, une rugine, un dechaussoir, un davier, un pelican, un bec de corbin, un lenticulaire, un crochet fait en hameçon pour soutenir pendant qu'on coupe, on l'appelle Erigne, un porte-pierre avec onguens, baumes, &c. d'aiguilles courbes pour les sutures,
Catheter flexibilis et stylo pro eo immittendo.

Non Portatifs. Trépan pour ouvrir les os de la tête ou d'ailleurs; les algalies ou sondes pour les hommes et pour les femmes dans la pierre, et pour les difficultez d'uriner, les ailérons, les crochets ou les cueillerettes pour tirer la pierre dans la lithotomie, et ramasser les sables; de grands couteaux tranchans courbes, et une scie pour faire les amputations des bras ou des jambes; de grandes aiguilles à trois tranchans pour passer des setons; des petites aiguilles pour abattre la cataracte; d'autres aiguilles droites, des platines, et des boucles pour faire la reunion de bec de lievre; des aiguilles plates et deliées pour la suture de tendon; une elevatoire, un bistouri royal; [illegible]; speculum oculi; speculum oris; speculum matricis; syringa matricalis; volsella variorum generum; hamuli et alia instrumenta; syringa matricalis; volsellæ variorum generum; hamuli et alia instrumenta ad extrahendum fœtum mortuum; terebra varia forma; speculum auris; modiolus major et minor. trepans perforativus et raspatorium; lenticulare; meningophylax; cochlear ad trepannum; [illegible] dictum;

Remedia interna pro hæmorrag. opt. sunt quæ sunt adstringentia [illegible] et ea in quibus nitrum paratum et Anim. [illegible] et [illegible] Mart. astring. [illegible] 14 [illegible]

[illegible] ℥ij [illegible] 14.

Gum crepitus lupi, caput mort. [illegible] Moschus quercei ℥ij, medulla sambuci ℥ij, Mosch. cran: hum. [illegible] Lap. [illegible] supra [illegible] coctæ in aceto fortiss. [illegible] aspersis, ut in medio [illegible]

[illegible] et Alauda nephriticorum solamen. — Cinca Arquati magnus.
[illegible] montis habet & noli comedere Cancer. — Frigidis [illegible] remedio est.
[illegible] [illegible] potissima [illegible] indicatio. — Dulcia gravidis amica.
[illegible] et [illegible] [illegible] et gravidarum refectiva. — Venae sectio moderata gravidis non nocet.
Antimonica vomitoria in [illegible] non exhibenda. — [illegible] intemperies indicata [illegible].
[illegible] non patitur spama, [illegible], [illegible]. — [illegible] fracturis maxime conveniunt.
[illegible] sola [illegible] natura liberantur. — Vulnera et ulcera ab aere defendenda.
[illegible] urgentia calida. — [illegible] in feminis locum non habent, nisi [illegible].
[illegible] [illegible] à Lypothymiâ liberat. — [illegible] [illegible], [illegible] [illegible].
[illegible] ad ulcera attendere. — [illegible] in suturis non adhibendum.
[illegible] curari potest reductione prominentis periculum occasio [illegible].
[illegible] quâ talia calida sunt. Balsamica, Resinosa, [illegible], Aromatica calida.
[illegible], Salia, Amara calida.
Quae emolliunt mala disponendo suppurationem etiam promovent.
Suppurantia ante apertionem, Digestiva post apertionem. [Hypop: et [illegible] mol]
[illegible] cuncta Arthritica. — Antimonialia [illegible] est. — [illegible] vermis mors.
[illegible] sine opio sudorem non movet. — Cathartica cuncta Anthelmintica.
Oleosa et Amara quaevis Lumbricis inimica. — Diuretica [illegible] emmenagoga.
[illegible] fallunt quae necant vermes. — [illegible] [illegible] differunt.
[illegible] et Cathartica, sic sudorifera et Diuretica [illegible].
[illegible] exhibenda sunt tempore [illegible] motui convenienti.
[illegible] extinguentia eadem. — Intra summam [illegible] semper consiste.
Resinosa addito oleoso facilius pulverisantur. — [illegible] alcalinae naturae.
[illegible] pro [illegible] [illegible] conveniunt. — Acida dentibus inimica.
[illegible] corrosiva ab aere defendenda. — Rad. Gentian. [illegible] dilatatoris.
[illegible] [illegible] praecipitant. Praeparata magisteriis saepe meliora.
[illegible] Sapida, et Amara plus salis fundunt.

Boerhaave Oratio. Anno 1708.

Hippocrates et Sydenhamus acutos morbos curaturi, impetum moderantur, excitant torporem, aut vires victu sustinent. Quibus instrumentis? Iis, quae copiam minuunt, acria molliunt, diluunt spissa, tenuata cogunt, stringunt laxa, laxant adstricta, impetum in innoxia derivant loca, vel sopiunt, quoties sedandum; sed his, quae tenuando stimulant fibras, si languentis stimulandam naturae erit. Aqua, Acetum, Vinum, Hordeum, Nitrum, Mel, Rheum, Opium, Ignis, et Cultor sphlebotomus, scopo huic sufficiunt. — p. 16.

Contra Chronica, quae usus artis comprobat, sunt, Medicati fontes, salium potestas, artificiosa sudoris expulsio, saponis, Argenti vivi, Chalybis, virtus, et paucorum vegetantium, bonaque cum his exercitatio corporis omne punctum ferunt. — p. 17.

Hydrargyrium, opium, Cortex Peruvianus, Ignis, et aqua, sunt, ut norunt Optimi, in ipso opere certissima auxilia. Quae tamen, ut cruda ab almâ naturâ porriguntur, plus boni efficiunt, quam si negotiosâ in illis arte permutata fuerint. — p. 19.

℣ cat. ad initium libelli MSS. ubi Doses, etc.

nott.

nott.

Theoremata prognost. p. 4 ... 46

Bona agro. mala astantibus narra. — Intermittens morbo non intermittente lethale.
Bona prompte mala quasi invite, praecata tamen similate enunciabis.
Fervor in corpore sine est paravusos prodromo, in paralytico sanitatis.
Pollutionem nocturnam Gonorrhoeae sub ... bonum, hanc illi malum.
Pulsus undosus in vermicularem evadens prave. — Purg. tantius convulsiones praec.
Pulsus intercurrens terret medicum, et tantum visi ordinate ... in pleuritide, febr.
malignis, ... palpit. cordis, ... frequente occurrit citra omne periculum.
Urina bona cum ... agro morit. — Pulsus deficiens excedente peior.
Spontanea lassitudo morbi prodromus. — Omnis Recidiva deterior sua radice.
Hallucinationes ... bona. — ... oculos habere torvos & feroces mali.
... in ... continuis bona — Convulsiones in feminis leviores.
Rhon. hi in ... Hydropicis, & pleuriticis, lethiferi. — Expiratio frigida lethalis.
Si post curatos morbos inappetentia remaneat, Recidivam praedicato.
... in nationibus et pleuriticis bonus denotat.
... in infantibus bona, praelongum in Chronicis.
Dies quartus est septimi index, undecimus decimiquarti.
Post ... diem ... ad Crisim attendito.
Crises simultaneae symbolicae bonae, inaequales malae. & plura.

Therapeia.

A. m. g. 46.	... contra abortus opt.
Araucarias 48.	... inter Cathartica locatus, ast tostus astringens evadit.
Therica. 10.	Therica laudatus ad affectus soporosos, est intelligentia vulgi, non ... monet.
... 50.	Fluxus alvi non ... aut Emet. efflagitat, dein Catharsin, denique astringentia.
Narcotica 5.	Narcoticorum minuenda est Dosis quo diuturniores sunt vigiliae, aliis quae ... ad somnum ex defatigatione a vigiliis, et somni a somnifero viribus jungentibus mortem induunt.

Mixta diversa in ... in Chronicis paranda.
Haemorrhagia narium in Cephalalgia; Diuretica in ... Saculares

Haemorrhagia narium & Diarrhoea. 59.	Ex ... a ... supervenient sanguinis fluxus, Apoplexia, ...
... ib.	diuturna, Hypocondriaci, ...
Sudor. 60.	... Cathart. et Emetica praemittenda ubi amor requirunt. ... 84-15
... ib.	Post ... in ... Mania, Hypocondriaci, ... 34
Purgantia 62.	Purgantia dantur specifica p. 61, 62. ... ex intestinis ... perturbant ... et alia purg. potentiora plus praestant licet parva dosi assumpta, et ... evacuent.
Lumbrici.	Lumbrici per specifica sive enecandi, ... ubi ... allicientes, ex lactariis dulcis ad infera inescandi, et inescati per torrentem a Cathartico tandem exterminandi sunt.

& ad Arthritidem. & in Country Physician.

Diuretica.	Triplicia existunt Diuretica, quorum alia vasa urinalia ... poros aperiunt, alia ... a sang. praecipitant, alia ... serum aquosum suppeditant, quae promiscue usurpata citius quam morbi ...
Hydrops.	... Diuretica; haud vero postremi generis praegrossiorem molem actutum accersura; crescit indulgens sibi dirus Hydrops; ... hoc enim est acrius ... primi, illa vero collaturi sudore errans in viam reducit.
Cathartica & Diaphoretica.	Pari etiam ratione dividenda sunt Cathartica et Diaphoretica in alia quae ... praecipitant, et alia quae ... vasa ... suos aperiendo exitus praebent, quam meditationem ... vero difficiliorem, ut ad umbilicum deducant eruditiores observo.

Theoremata Therapeutica. p. 79, &c.

Dulcia, vinum, acida, infantibus nociva. — Loca paludosa scorbutum gignunt.
Refrigerare et ... a motu vehementiore nocent.
Leguminosa, praesertim non excorticata, flatulenta sunt.
... omnia laxant. — Lupulus continet sulphur amicum ... et ...
Acini astringunt cuncti. — ... — ...
... facile, et ... ventre et ...
... — ... alimenta Gelatina.

Ardo ...

Specimen medicy de medicastrorum audacitate. Dimb. 12°. 708.
Autore A. Russel M. D. Elgini.

Emplastrum stomachicum, dorso, non abdomini, applicanda. — p. 5.
In Bronchotomia sedulo vitentur nervi recurrentes.
... valvula iliaca valvula inversa, nulla autem convolutio auteadg. — ib. passio iliaca.
Clysmata nutrientia exhibenda in angina, ubi obturatur œsophagus. — 11. & 24. Angina.
A partu puerpera concipere potest absque menstruis prævijs. — 13. Conceptio.
Hippocrates dolente latere, febre &c. præmittendo morbus explorabat; solu... — 16. Pleuritis.
... exacerbatur pleuritis, quo tamen mitigatur simplex caloris dolor, unde ...
... quantitas sang: detrahendi, parcior in casu hoc, largior in illo.
Spelida et ingrata in Hysteria opt; Dulcia è contra. — 23. Hysterica.
Ad Anginæ medelam suadetur incisio ab Autoribus, suadetur et clysma nutriens — 24. Angina.
... vero in eodem casu; datur enim Angina Cynanche, i.e. inflamma...
... datur et Angina Synanche, i.e. inflammatio Œsophagi, cui pri...
... debetur incisio, posteriori autem clysma nutriens &c.
Bagl. l. 2. c. 8. §. 2. Coagulationi et dissolutioni fluidorum, tensioni et laxa... — 40. morborum causa.
... solidorum morborum omnium origo attribuitur.
... ad ulcera Pulmonum, Balsamica postulat; à vasorum lacte... — 28. Tabes.
... obstructione, compressione, aut occlusione, aperientia et catarthica ...
requirit; non è contra.
In febr: ab ebrietate, vino in ventriculo adhuc haerente, conducit emetic... — 29. Febris.
... autem ex vino ad sang: pervenerit est.
Fluor albus à nimia sang: incrassatione, Aperientibus; à tubulis glan... — ib. albus ad stricta.
... adstricta à nimia sang: incrassatione curanda est.
... intestinalibus obstructis, ... curanda est.
Diarrhœa à nimia sang: tenuitate; incrassantibus; à glandularum intestina... — 30. Diarrhœa &c.
... excretorijs in intestinorum cavitatem plus justo hiantibus, astrin...
... curatur. Idem dicendum de fluxu quovis.
Vomitus ab ingestis proveniens Emeticum postulat, quod exhibitum à ventric... — ib. Vomitus.
... procedit, mortem accersit, ubi vero ventric: corroborantia
conveniunt.
In Asthmate humido convenit Emeticum, in sicco perniciosum evadit p... — 31. Asthma.
In mensium defectu à sang: inopia, medicamenta incrassans quæ sang: augeat — 34. Menses.
requiritur; at in eorundem defectu à sang: crasso nec parciori, medic. at...
... nequaquam exigitur, incrassans omnino respuendum.
Ad tussim humidam pectoralia interna rite præscribantur, verum ad sic... — 33. Tussis.
... inani nisu; ubi enim remedia mutualis convulsis sive corrugatis aut
... applicanda; ut vult Baglivi.

Observata Pathologica. p. 34. et seq.

Morbi à colluvie serosa oriundi, et cum dolore conjuncti, ut plurimum noctu
exacerbantur.
Quando à cibo vehementior chylus in vasa præcipitat.
Qui ante annos pubertatis Eunuchi facti sunt, imberbes manent; qui post,
barbam retinent.
... menses in Gravidis profluentia fætus debilem notant.
Sedimentum in sanis nullum, morbus imminere, in morbis cruditatem notat.
Melancholici sunt speculatores, et flatulenti.
Spasmi vagi transitorij leniori sunt, humores fixi constantes pungitivi.
... à medico potiora sunt 1. quid patiatur? 2. Ex qua Causa? 3. Quod
... 4. An alius succedat? 5. Quali victu utatur?
Dolor generalius parenchyma, acutus membranas, profundus et acutissi...
... afficiorum significat.
Dolor manu premente ingravescens externam, alias internam affici par...
... significat.
... ex Art: aspera, Vomitu ex ventriculo.
... mater.
... tenuitate ...

Observ:

A[...] prohibentia. Huc veniunt 1. medta omnia crassa utriusq generis (ex sang: nimia acredo. impetuositas, & volatilitas; & fibrarum laxitas; imparanda veniunt) qualia sunt Dec: aqu: Infusa, et ex plantag: rosis: et consolida [...]; omnia ex ros: torment: bistort: [...] Amyli: granis [...] rosar: rub: sem: plantag: portul: santal: rub: sive sint pulv: sive conserva. sive electt: sive tabella. sive [...] ut in [...] Batt: praeterea quorum [...] alia non [...] experta, tamen novi vulgo Bursa pas[toris]: Centinod: fol: Rubi, ulmi, Quercus, [...] roboris, pilosella, Vinca pervinca, et sim: ex [...] uti.

2°. Omnia acida moderate astringentia, quatenus sang: volatilitatem, motus et fluxus refraenant: qualia sunt Alumen, sal [...]: Sach: Satur: acet: rosac: quae non parvo ex [...] praedictis misceri possunt in parva quantitate. Hinc fiunt compositiones ex aqu[...]: rosae: acet: rosac: Sang: drac: Sach: Sat: Syr: Myrtil: et laudanum.

3°. Omnia ob: crassa et viscositate [...] [...] v ex praedictis, qual: acredinem involvunt et sang: motum diminuunt et Balsamica reddunt; qualia sunt omnia ex amyl: [...]: [...]: Oryza, [...], Mastiche. &c.

4°. Omnia [...] subtilibus et firmis [...] qual: in tonsillis et languidis [...] nec a[...] nec volatil: [...] humores [...] à sang: non bene [...] difficulter, [...] sang: [...] et [...], fibras firmant, & qual: [...] sang. [...] qualia sunt [...] praecipitata nos [...] non accidant. Qualia sunt [...] santal: alb: cinam: sem: coriand: [...] [...] ex sale. [...] Zedoaria, tam succino. [...] Lamij, ut et etiam ex caryoph: mace. [...] et externe quam interne. Hic vinum Malvatic: [...] optime in [...]

In omnibus [...] ultimo, [...] motus minuens optime admitti [...] et omnia ex [...] [...] roborantia, mon [...] Hemorrag: sistentia, et sim.

Catapl: consolida, ex [...].

Dec: cort. quercus ut et Ung. & [...]: gallar, [...] polo aq: ex farina [...] et pauco alum: & etiam Aq: Myrtill: [...] astring: & Catapl: ex albo ov: bolo et: ros: et sang: [...] aceti.

Troch: de Carabe [...] fluvial. vivi [...] siccati et in alcohol [...] in cibis [...].

[...] ros: rub: Diac: boli. Sang: Drac. Al: Granati. Syr: rosi: sicc. [...] bol: [...].

[...] pentas, [...] pulv: [...] Edinb. D. [...]

A chordis (& [...]) curantia.

Astringentia. Huc veniunt 1. omnia crassa et torrefact: qual: non [...] humores, tenues et fluxus coagulant. [...] et etiam fibras ad tremulum accedere [...] & tellem [...] rigidas et immobiles reddunt.

2°. Omnia austera, [...] mag: & [...] qual: [...] effectu [...] [...] crassa producunt: [...] hic termino sit generalis, [...] medta adhibenda partes, ut evidentes repetimus (ut in omnibus casibus generalibus faciemus) [...].

Alexiteria. Alexipharmaca. Antipestilent: Huc veniunt 1. medta omnia subtilia et salina, ac etiam tenuissima, specialiter stomachica, cardiaca, et sudorif: qual: sang: à contagione coagula[tum] motus et fluxum recuperant ut [...] contagium inducit, extollatur, quam etiam ob causam produnt.

2°. Omnia amara salem fix[um] [...]

3°.

3º. Omnia cardiaca et aperientia salia corrosiva in sang: infringentia, et ro... et attenuantia non solum restaurantia, uti faciunt omnia alcalica et lap: prolosti
4º. Acida non corrosiva, qual: acrimoniam infringunt et crassa attenuant. Vide Morsus canis rabidi medentia.

Alopeciam & Defluvium Capillorum curantia, ut et Calvitiem. Huc veniunt 1. omnia mollia ramosa et flexibilia, macam acrem, capillorum radices erodentem (uti in Lue Venerea et Scorbuto) involventia, et Nutrimentum in ... les promoventia, ut sang: caneri, Dec: malv: axung: ursi, medulla Cervi, qui ... Dec: ex lignis interne non parum auxiliantur.
2º. Omnia poros et glandes nimis laxos firmantia, uti faciunt crassa et terrea, ut Dec: cort: interior: ulmi, Quercus, ribes nimis & subtilia firmis intricata, ut rad: cyperi, galang: irid: aromat: rosal: cal: arom: ligni aloes, rosa, et ultim pulv. crinali Battei.
3º. Omnia poros nimis strictos et obturatos in calvitie reserantia, & nutrimenti vias patulas in extima concedentia, uti faciunt urina canis, succ: caparum, Ung: nervinum, ol: abrotoni, ol: chartae, mel coct, ol: N. M. Bals: peruv: et prae hac cineres excrementorum vaccae, cineres ranarum, cineres excrement: caprae & ... oleo.

Alvum adstrictam curantia sunt 1. mollia et flexib: faeces et fibras emollientia, ut ol: olivarum, amygd: butyr: ova sorbilia, jusc: pinguia, omnia ex Alth: malv: Beta, violis, mercuriali, et excrementis vaccae externe.
2º. Acida non corrosiva partibus flexibilibus combinata, quae non solum emolliunt, sed et etiam moderate irritant, ut pastul: Tamarind: cerasa, pruna, Uvae Corinth: Carica, cassia, & & ... moderate; fortia enim ob irritationem ... non approbanda. Interea non negligatur ... ex oleo et purgantibus.
3º. Fibrarum et nervorum tonum solventia, ut ambulatio in pavimento marmoreo aqua frigida consperso, motus, flagellatio, et sim.
4º. Humorum austeritatem in Hypochondriacis, Hystericis et Scorbuticis removentia. Sic praedictis non proficientibus pulv: chalybis saepe prodest, et Infusio ...

Ambustis medentia. Huc veniunt 1. omnia crassa, frigida dicta, ut ol: ros: Sempervivum, Ung: album, camphor: Nutritum, popul: ol: Solani, quae non solum humorum fluxum copiosum sistendo operantur, sed etiam partes igneas involvendo uti etiam faciunt.
2º. Ramosa et mollia, ut Ung: Dialth: ol: amygd: Lil: alb: olivarum, lini, Adeps porcina, Butyrum, vitell: ovi, etc. Sed plerumque haec praedictis commiscentur, ut in Ung: anis... et: Battei.
3º. Media subtilia, ut sol: caparum, Ari, porri, & & ... saponis Venet: sp: ... Camph: aq: calcis, quae initio non solum poros externos reserando, ut partes igneas introductis exitum concedant, et pustularum eruptionem impediant, sed et in ... circulatione in parte affecta absolvant, operari credo; non enim concipere queo attractionem ob similitudinem attrahentis et attracti: Sed haec praedictis saepe admiscentur, ut videre est in Bals: magistrali Battei et Ung: ... ex capite ... vendt: Sal: ... aa ʒj cum ol: ros: et amygd: et Ungto ex Chenocopro, et ... ros: Ung: Dialth: Camph: et Aq: nivis composito.

Aneurismatis remedia sunt non solum crassa et astringentia fortiter ... ut Hypocistis, acacia, Gum: Arab: Tragacanth: Galla, Nux Cupressi: etc. ex quibus fiant Empl: sed et etiam Ligaturae, quae hic plus faciunt quam Media.

Anch

Anchylops, vide fistula Lachrymalis.

Angina, Oris, Amygdalarum, Faucium, inflammationes et tumores curantia [...] 1. Modice crassa utriusque generis, specialim astringentia, quaia sunt Corall. Dissen: [...] Uno. plant. pol. gon: (cum Lap: rubrica. et pauco alum: et acoti rosac:) fol: semper vivi contus: et sim.

2o. [...]a mollia et ramosa, ut Cataspl: ex ung: Dialth: malv: chamom: sem: Lini, [...] ugr: amygd: Lil: alb: sambuc: farin: hord: fabarum. Lacte et sim. quaiterg [...] laxant, dolores sedant, acria involvunt, poros aperiunt, et humoribus [...] circulationem conciliant. Sed hae mollis succedunt

3o. Per subtilia emollientibus combinata, ut pp Dec: fl: sambuci, Ebuli, Cham: om: auric: Judae. Sed subtilis omnibus praferuntur

4o. Omnia ex albo canis, Nidis, Sterac: [...] et cinere Hirundinum, ut videre est in [...] Baldi quod partim suis [...] obstr: roborantibus, partim partis suis alcalicis humores absorbentibus, o[...]perari credo.

Ani Condylomata, Ficus, Mariscas, [...], &c curantia sunt 1o. Omnia excrescentias carnosas in aliis corp: partibus dolentia, nihil enim aliud [...] Sarcomata varia forma et consistentia: Qualia sunt 1. astringentia omni[a] [...] et corrosiva quae: humores coagulando et fibras constringendo cir[culationem] et nutrimentum in parte impediunt, ut pulv: et Dec. ex cort: quercus, Granat: fol: [...]: nuc. Cupress: Gallis, Alum: Vitriol: &c.

2o. Exsiccantia fortissima, ut calx viva, cineres [...] muris. Croco metall[...] &c. quae partibus suis admodum subtilibus [...] fibras corrugant et indurant, ubi [...] [tu]tissime facit Cauterium actuale. praecipue [...] ad salivationem.

Ani [...] [re]media, sunt 1. Omnia astring: et corroborantia, quae: fibras [...] a nimia humiditate laxatas, [...] a nimia refrigeratione [...] debilitate tono destitu[tas] [...] firmant et corrugant qualia sunt omnia ex Gallis, cort: granat: sem: Sumach. [...] rosis cort: querc. et balaust. nuc. Cupress. Vino rub. [...] Emollientia omni[a] [...] ex Alth: Malv: et sim. huc non pertinent, nisi aliud intestinum [...] reducendum [...]de Ulcer Lacti.

Aphthas, inflammationes, Ulcera Oris et gingivarum et Palati sanantia, [...] 1. omnia detergentia moderata et tenia, ex Melle, Aruginis aceto, alum: vitri[ol] [...] quia non solum ulcera rumpendo mali oxieus prabent, sed etiam ejusdem acri[monia] [...] humores obtinent, et coquela in parias defluxus impediunt: hic ex his mistis fi[...] [...] Gargaris: ubi etiam ex cort: querc: fol: ulmi, rosis, [...] &c ex melle [...] rosi: alum: [...] pruni Syr: fragrar: Diamor: Rubi Idaei, ung: Egypt: &c. Sed mel [...] rosac: sol. cum pauco alum. et Sp. vitri: [...] hoc in casu salis officiunt. Hac [...] Aq: alum: Dec: Ulmi, Linim: alum: Balsi, aliaque in Angina. Sed si mo[...] hic sit Scorbuti Symptoma, ad gargar: ex Lig: Guai: Rorismar: majoran: ros: [...] ad Linim: ex melle rosac: cum pulv: Myrrh: et Ung: confugiendum. Si de [...] sui Ven: symptoma, ut postea tractabitur. In omnibus Ulceratis [...] non sunt negligenda.

Apoplexia remedia sunt 1. omnia nob. in sang: humoribus et Nervis acu[...] [...] omnia [...] ut [...] omnia acrias [...] ex [...] Colocynth: Vino Emet: &c.

[...] Suppos: ex [...] Alkerm: [...] et [...]

3o.

mucilago sem: Psyll. Cydon. cum Syr: Rub. Idaei Ham.

3° purgantia ejusdem.
4° sternutatoria et errhina ex pipere, pyreth: elleb: euphorb: castoreo, flor: conval: anthos, et sim.
5° apophlegmatisantia, gargarisantia, et aq: fl: lavend: ... in dies
6° mixturae ex aq: cephalic: cum sale succ: C.C. aq: linam: ceras: nigr: &c.
7° Rx ex Bals: apopl: Balsam, ol: succ: Roris m: cum Aq: nervina.
8. catapl: pro capite raso, ex cariopsh: pipere, sinapi, R.M. cantharid: &c.
Huc etiam veniunt cucurbitulae, cauter: actualia, vesicatoria, vincula dolorifica, et sim. vide Epilepsia: Vera cephal: &c.

Ips: in hoc morbo V. S. non indicatur nisi sit affectus per lapsum, per ebrietatem, per alicujus venae ...

Apum Ictus satis bene curantur melle, per ullo alio empl: per catapl: poros apertos servante.

Arsenici, per alterius veneni corrosivi remedia, 1. Vomitus excitentur (ne venenum nimia copia sanguinem attingat) per ol: rancidum cum aq: calida in magna quantitate; quoris enim vomitorium proprie non sit, si modo effectum producit, vomitoriis vulgaribus nocuam jam acrem accedentibus multo est salubrius; deinde ad involventia et laxantia procedendum, ut ad Butyrum, Lac, Butyracea, pulte: pinguia. vide Venena. Mithrid: Ther: venet:

Arthritica: Huc veniunt 1. in tumoribus, praecipue in initio, repellentia, poros et fibras constringentia et materiam in partes influxum inhibentia, ut faciunt ... ex aq: flor: acelo, nive, sperm: ranarum, rom: ... succ: ex aq: solani, lumbricorum ex aq: ... decoct: gallarum, et sim. cum alumine; sed cavendum materiam repulsio efficiatur, ne in ... poros ... excitet, ut facile fit, si arthritis sit vaga, per magna mora, a sang: in temporibus et ... non a partis debilitate dependens; sed hinc dubio praedicta omni ordine ... modo, qua infantis debilitates calidis ... frigidis nobis praeveniuntur. — 2°. Omnia poros potentissime aperientia et motum materiae in poris articulorum constantibus resolutioni conciliantia, uti faciunt omnia ex aromaticis et cephalicis, ut ol: Spicae, Juniperi: aq: Reg: Hung: sp: ✱ci, C.C. Una: nerv: ol: succ: Rosmar: Chamaedr: Chamaepit: &c: ut et omnia acria, ex pipere, pyreth: sem: sinap: sapone, pice graec: ... allia, &c. quae tamen plerumque praedictis per sequentibus miscentur — 3°. Omnia ... na emollientia. quae: fibrarum tensionem et pororum constantiam diminuunt, et materiae acrimoniam involvunt per obtundunt, uti faciunt catuli et vulpes calide applicati. liquor per caro limacum, per lumbricorum, per ranarum, per earundem olea, aut pinguedines, medulla panis cum farina seminum lini, et lacte. Lac muliebre, per caprae in partem emulctum, Ung: Dialth: vitell: ovorum, stercus vaccinum, fol: verbasci, malv: &c. Huc pertinent omnia ex opio externe per interne, ut pil: Mathaei, Laud: Opiata, opia narcotica, &c. Ex quibus et aliis mista habentur in B. 1. Bals: anodyn: 2. Catapl: podag: ex sapone, vitell: ovorum, ol: spicae. 3. Empl: podag: ex opio, Diachil, & sapone. In omnibus hisce casibus non negligenda sunt urtica, uti s. in robustis V. S. per superna per inferna. 2. purg: per ex Cariocost: per ex pulv: arthrit: B: 3. sanguinis acrimoniam et similatem nimiam gradatim tollentia, uti faciunt decoct: infus: vina medic: elect: &c. ex lig: sudorif: herb: cephal: ut Chamaedr: ... salv: Chamaep: fl: anth: prim: veris, ut et scorbut: ut rad: Lapath: ... ebuli; &c. cum per sine purg: vide Bal: — 4°. Omnia acrimoniam involventia et fibras laxantia, uti faciunt aq: omnium florum B: Lactes amygd: &c.

Asthmatis, Dyspnoeae, &c. remedia sunt 1°. Omnia materiam viscidam in-

in stomacho et pulmonibus incidentia, ut faciunt 1. omnia subtilia, partim mag.: minus mollibus et glutinantibus [illegible] i.e. in quibus nunc mollities subtilitatem, nunc subtilitas mollitiem superat, invicem [illegible] combinata, ut sunt omnia ex glyc. cyr.: [illegible] [illegible]: Scabios: tussilag: hyssop: cap: vener: Marrub: rad: helen: irid: caricis, et uvis passul: et Corinth: dactylis, sem: anisi, fenic: etc. sive sint ptisanae, sive vina medic: sive juscula, sive aq: destill: sive syrupi, sive lambit: sive [illegible] electuar: etc. eaque [illegible] sine [illegible] purgantibus. Huc pertinent omnia ex Ammoniaco Benz: Styrace, bals: Tolutan: et Myrrha, quamvis ob subtilitatem mollitiem in illis superantem, plerumque mollibus commiscentur, ut in syr: Tolut: Styrac: Benzoinat, [illegible] lacte ammoniaco, Benzoino, [illegible]: etc. Bal: Huc etiam pertinent omnia ex [illegible] lipide: limacibus, et pulmon: vulp: etc. quamvis ob mollitiem nimiam subtilia in compositione admittant. vide Julap. asthmat: et Sp: Millep: B: ut et Looch sanum etc.

— 2°. Omnia aliquantulum acria, uti sunt omnia ex allio, aro, rad: porri, cepar, sem: nasturt: sinap: sapone venet: melle etc. sed haec maxima ex parte [illegible] aliis miscentur, eo quod non solum in humores sed etiam in partes solidas agant, ut videre est in aq: pector: [illegible] saponaceis, allio condito, una: [illegible], cap: [illegible] ex butyro et melle coctis, aliisque Bal: [illegible] vitiis in stomacho principali [illegible] potiore [illegible] omnium illis non solum uti [illegible], sed et etiam fortioribus, ut ex Nicotiana, et [illegible], ut videre est in syr: de [illegible], Apoz: potent expecto: rante, pil: sinap: [illegible] sinap: Julap: ex oxymel: Scillit: et aq: cinam: cum [illegible] ol: anisi, et sim. Bal: qua non solum [illegible], sed mat. tenacitate [illegible] motus conciliando, operantur. — 3°. Omnia [illegible], ut ol: oliv: amygd: [illegible] [illegible]: sed eo quod minoris sunt mol, [illegible] plerumque miscentur: sic [illegible] — 4°. Omnia mixturam liquefacientia commiscentur aq: vitae, mol, vinum [illegible]: — [illegible] partis laxitates sano: conservantia, et ejusdem secretiones inhibentia, et partis laxitates curantia, uti sunt omnia ex sassafr: calce, et sim. Huc continuo aq: Benedict: B: [illegible] sunt [illegible] a morbo [illegible] conservantia, [illegible] eundem curantia [illegible] aliquibus [illegible] mista, sic Sp: Nitri

— 5°. Omnia acria non corrosiva in aliquibus [illegible]. In omnibus his [illegible] omnia ex sulph: [illegible] flor: et bals: commendantur. [illegible] laxantibus [illegible] si vis purg: sint ex Manna, Cassia, Elix: salut: et sim.

Atrophiae remedia vide Restaurantia.

Audit: Surditatem, Tinnitus auris, etc. juvantia. Huc veniunt omnia a [illegible]: nervorum et tympani ut in aliis partibus solventia. uti faciunt omnia ex Cephal: stomach: et uterinis sive sint aq: stillat: sive Dec: in aures infusa, et infundibulo fumigata, sive Sp: sive [illegible], sive ol: still: moderantibus combi= nata. sic [illegible] Croci, Castor: ol: Gariophi: Anisi, Cymini, Junip: [illegible], Sp: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et sim. mistentur; Huc veniunt [illegible] Millep: aq: Reg: Hung: cum ol: amygd: Laurini, et sim. mistentur; Huc veniunt [illegible]: urina [illegible] cum Sp: vini, li= cha cotone [illegible], [illegible] ex Galb: pice Grac: urina [illegible] [illegible] ex anguilla [illegible] emanans [illegible] Sp: Anisi; Injectio auricul: B: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: et melle. — 2do. acria [illegible] si moderata sunt, [illegible] mi= [illegible] [illegible], sic succ. [illegible] [illegible] [illegible]: porri et cepae cum ol: mistentur, [illegible] [illegible] [illegible] in ol. coquuntur. [illegible] ex [illegible] [illegible] cephalicis fiunt aq: still: Huc veniunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] etc. et [illegible] [illegible] B: ex Galb: [illegible], [illegible] albo, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. In [illegible] non negligenda sunt urtica.

auris

[illegible] frigida [illegible] et atte= nuantia, ut acidum, acetum scyll. oxym. scyll. Nitrum, [illegible], etc. vitanda om= nia pectoralia calida. amara cum aceto, ut et acria cum aceto prosunt. Floyer.

2.

3.

4.

5.

Auris Dolores, Inflammationes, et Ulcera sanantia. Huc ven: omnia in
Alth: alijs partibus anodyna ex Alth: Malv: Chamom: Sem: Lini Faenugr: medulla panis
lacteq, ol: omoll: ut amygd: Lil: alb: Nymph: Solani, ros: ex quibus cepe sub ci-
neribus coctas croceq, et Laud: misceri possunt, ut Inflammationis tentetur resolu-
tio: Sed ea non succedente, ad ulceris deter sionem moderatam uti in alijs parti-
bus, mell: ros: Ung: Aegypt: Dec: Agrim: devenienda. Interea ni mirum non
negligantur puro: Cucurbit: Pyrotica post aures. &c.

B.

Bubones sive pestilentiales, sive venereos aliorumque criticorum remedia.
Huc ven: omnia suppurantia (repellentia enim non adhibenda) ex Alth: malv:
Far: Lini, Faenugr: Fl: melil: Chamom: Lil: alb: caricis, cepis coctis, pingued:
porci, Galb: empl: Diach: Diasulph: donec ulcus rumpatur; dein ad detergentia
et Sarcotica procedendum, et interea promoveatur suppuratio.

C.

Cachectica, cum Cachexia sit aliorum morborum symptoma, uti Inanitionis
℥ et chalybis Tartar. | ℥ nimiarum ℥ suppressarum, ℥ obstr: idcirco vide alios morbos.

Calculum frangentia Diuretica. Huc veniunt 1°. omnia salibus minus tenuiz
oleaginosa etiam, vel ol: Amygd: &c. | bus praedita, quae non solum humores attenuant, sed et etiam poros renum et vesi-
cae aperiunt, uti faciunt omnia ex Apio, Petros: Fenic: Raf: Dauc: Sylv. rad:
Rusci, Aspar: silicis, Rub: tinct: Sem: Anisi, Foenicul: Bacc: Junip: Alkek: rad:
onon: virg. aur: &c. Sed oleorum emollientibus misceantur. Huc pertinent Alkek:
confect. Aq: Cynosbati B: et sim. — 2°. Omnia salina salis acria et paululum
corrosiva, uti faciunt omnia ex Allio, Nasturt: Raph: Erysim: Portulac: Canthar:
&c. | in parva quantitate, quae semper cum praedictis ℥ emoll: misceantur. Huc veniunt
omnia salina fixa quae acredinem calcinatione induunt, uti sunt praecipue
Sal Genist: ononid: Fabar: Aq: Portulac: Bals: tart: ol: Ludi et sim. B. — 3°. Omn:
emollient: non quae: urinam cient, sed quae: fibras et poros laxant, uti faciunt
omnia ex Amygd: malv: Alth: &c. Sed quia haec per se sunt potius dolores sedan-
tia quam diuretica, idcirco semper fortius pellentibus misceantur. Huc pertinent Aqua
lact: emulsio, ptisana, mixtura Dialth: B. — 4°. Omnia et volatilia et salina emollientibus mix-
acidula etiam, vel ol: amygd: d. ol: oliv: &c. | tis magis ℥ minus intricata combinata, qualia sunt omnia ex Spir: Lumbric: mil-
lep: Bals: Gilead: peruv. Urina, Sterc: vacc: tinct: ol: et Sp: Junip: quae utrique scopo
et pellendi et laxandi inserviunt. Huc pertinent Aq: omnia flor: Bals: Lu-
cat: Enema colicum, oleosum, terebinthinatum, Bals: Sacc: Sp: millep: Syr: Lumbr. B. Sal
vol: cum alijs temperatis et sim. — 5°. Omnia acida non corrosiva quae: non solum
aperiunt et attenuant, sed et etiam Urinam magis suppeditant, uti sunt omnia
ex citro, Aq: Sperm: Ran: Rhen: Limon: ex quibus etiam laxantia misceri de-
bent. Huc pertinent Sp: Sal: et Nitri dulc: B — 6°. Omnia igni acta et lacta et
dura, quae in motum per sanguinem excitata (omnis mutationem per se ei communicant particulis
suis solidioribus et politis) non solum in humores crassos et viscidos, sed etiam
in partes arenosas et friabiles impetum majorem faciunt quam ulla praedictorum,
qualia sunt Lap: Dactyl: Lyncis, Judaicus, crust: ℞: &c: 69. Chol: 69: pulv:
mina ovorum calcin: Nacti porcell: corall: silices ppt. B: rad: saxifrag:
Sem: Milij Solis, &c. eo quod nihilo minus si non magis participant, ut quam la-
pides ceteri. Sed haec forme sine omoll: nunquam sunt administranda, ne
cal:

calculos et arenularum motum per ureteres et urethram sine inde venientes iisdem mollitis, dolores intollerabiles pariant, idemus ex lenib: et sem: mit.

Ex dictis videmus multos generis varias hac confusas quarum maxima pars, si non omnes saepissime unam eandemque compositionem ingrediuntur, vel saltem ingredi possunt, sic ex lenib: vitell: ovi, sem: bard: apij, milij solis, millip: saxifragiae: ononid. nitro et tartaro Lap: Judaic: Syr: Dialth: et de 5 radic: et limon: et sem. fiunt Elect: pilul: Vina medic: vide Elect: Lithontriplicum ... Lithontript: Vin: Nephriticum B. Ex illis etiam fiunt juscula, mixturae, Dec: Infus: Ptisanae (cum et sine et ex Purg: praecipue ex Cassia) Ung: Catapl: Enem: Syrupi, et alia formae. Hic non omittendi, cathol: ut diuretica recentiore sem: Cucum: Cucurbit: papaver, aliaque crassa et frigida sola experientia cognita, quae nos (si modo proficua sunt) per praecipitationem operari credimus. 2. Quia ut vult Matthei, laude dig: ex quo viri à dolore et spasmis inhibendo, et ureteres (et alios) lenes laxando operantur.

Cancri Remedia. Hac veniunt omnia acrimoniam humoris et laevitatem solida corporis depascentem, refraenantia, uti sunt: 1°. Omnia crassa mini generis ex solanis plant: semperv: papav: Ros: Sper: Ranarum, &c sive sint succi, aq: ol: et Ung: quae tamen tenera et viscosa et camploralis (alibi explicandis) fere semper miscentur. 2dò. Specifica humorem istum infringentia et inhibentia, ex Sulph: Lap: Calam: trach: alb: Rhab: et sim. 3ò. Viscosa et mollia, eandem involventia, ex Lil: alb: Lacte, Cancro fluviatili, stercore bubuli, Ranis viridibus, pullis Gallinaceis, columb: Bufonibus; sed haec ob partes subtiles quibus gaudent, minoris sunt usus, quod humoris acrimoniam communicando, Cancri exulcerationem promovent. praestat ergo uti viscosis, quae solummodo involvendo, et mali in parte motum impediendo, operantur; uti sunt: omnia ex plumbo, Sumac: ... Ung: Diapampholg: Balsam: ... Elect: Saturn: magist: Salur: Croci Jovis, et linim simplex, B: ut et ol: Bufonum et Ranarum B: 4°. Acida non corrosiva, mala acrimoniam infringentia uti sunt acetum Ros: vitrioli bene dilutum, et non corrosivum evadens, quae etiam praedictis uniuntur. Sed cum praedicta cura palliativa sit solummodo expectanda, eo quod generis humorem arceant, tamen in substantia depravata ... remanenea, parum aut nihil (ut de omnibus aliis medijs dici posset) efficiunt; ... pro cura integra in Cancris ulceratis à quibusdam tentantur 5tò. ... corrosivas sed cum maxima cautela, et in parva quantitate, ne deteriora supervenient symptomata. Sic pulv: ex parte una Arsen: partibus qualuor rad: Ari, et ... fuliginis, inspergunt in medio ulceris, ut Cancer ... Eschara decidat. Eodem modo et Sublim: et praecipit: rub. et flavo, Stercore Coralm: B: utuntur, dummodo interea partibus circa Defensiva applicentur. Sed horum hic omnibus est praeferendum. In his etiam non negligenda sunt ... uti Solaria, Purg: melanagoga melancholiam prevari: ... Purg: Hirudines ... Balnea, &c.

Canis rabidi Morsus remedia. Hac veniunt mixturam et morsum ... bilis sane ... et malam ... ex eodem expellentia, uti sunt: interne omnia Alexipharmaca, Cardiaca praecipue Salia vol: ... ad morsum canis rabiei B: Externe veniunt eadem modo qual: mund:

Salivatio. Polv.

mundificant, et poros potentissime aperiunt: sic ex ol: Sapon: a [illegible] ni, Ruta, Scorb: Sem: Sinapi: Capsic. et sim. extrahentibus facta sunt [illegible] lutiones, [illegible] Catapl: Empl: pulv: Bals: &c. Hic non negligenda aliquo Cauteria actualia. et immersiones in aquam, [illegible] eandem [illegible] marinam.

Cantharidum effectum veneno assumpto similium, remedia. Huc veniunt omnia salem eorum corrosivum involventia, et ejusdem in solida corporis actionem praecaventia, qualia sunt ol: amygd: Emuls: ex iisdem, et Sem: 4. frigid: Dec: et juscula ex Sem: Lini, [illegible]: malv: Alth: Lactuc: Cassia, et sim. conjungitur Camphora [illegible].

Capitis Doloris, sive Cephalalg: sive Cephalaeae, sive Hemicraniae, sive Unguis, sive Clavi, remedia. Huc ven: 1°. Omnia obstructiones in cerebri tubulis, à materia pituitosa et acri, paralys: Apoplex: Epileps: Catarrh: et sim. minantes, removentia, uti faciunt omnia ex Cephalicis et aromaticis, sive fomenta, sive suffimigia, sive sacculi, sive Catapl: sive Errhin: sive Aq: stillatit: vide Aq. Cephal: pulv: Cucuphal: Bals: apoplect: Saccharum Ambrati, Caryophyllati, Tabul: Diambrae, Rosam Solis, Sp: [illegible]: [illegible] et sim. B: [illegible] etiam [illegible], Urinae, et sim. ex supra [illegible] [illegible], Sal [illegible]: Verbena contusa, et sim. — 2°. Omnia acria, quae humores crassos potenter fundunt, et fibris motum communicant, ut fac: omnia ex pepere, Sinapi, Sapone, Ruta, et sim. quae plerumque praedictis miscentur. vide Catapl: Cephal: Apopl: ol: Sapon: B: — 3°. Omnia mollia, praecipue non unctuosa, quae non solum materiam pungentem involvendo, fibras et poros laxando, sed etiam obstructiones lente ob volatilia mista, removendo operantur, in omnibus fere casibus sunt proficua; qualia sunt omnia ex Sem: Lini, Malv: alth: Lactuc: pullis columbinis, omentis, pellibus, et sim. Et 4°. omnia crassa et frigida, quae in doloribus à nimio sang: motu, [illegible] acrimonia, [illegible] subtilitate dependentibus, sanguinis, fibrarum, et nervorum motum imminuunt, uti fac: omnia ex Nymph: papaver: ros: Semperviv: plant: Lact: Solano, et sim. vide Ung: refrig: Gal: populeum et Alabastrinum maxime commendatur, eodem ferme modo operantur. — 5°. [illegible] acida non corrosiva et paululum astringentia, ut Acetosa, Acetum, &c et ideo [illegible] crassis fere semper uniuntur. In omnibus hisce casibus non negligenda sunt Cucurbit: vesicat: Sclar: Caut: actualia, V. S. [illegible] superne [illegible] inferne, Empl: Burgund: B: Sudorif: Vomitor: Purg: Crass: [illegible] laxantia in casu calido, [illegible] acria in causa frig:) vide pil: Vatican: et [illegible] Butleri, B: memor etiam sis Opiatorum.

Cardialgiae remedia. Huc ven: omnia partes ventric: orificii laniantes infringentia, imbibentia, involventia, diluentia, discutientia, et evacuantia. Sic 1° eas infringunt omnia [illegible] non corrosiva in casu salino et [illegible]. 2do imbibunt [illegible], ex Ribesiis, Berber: Limon: Tamarind: Cydoniis, et sim. [illegible] ex: Coral: Bolo, et omnia Alcalia terrea, ex Creta, Margarit: [illegible]: et oc: 69. [illegible] 3°. involvunt omnia mucilaginosa ex Sem: Cydon: Amygd: Sem: 4. frig: [illegible] quae tamen Alcalicis [illegible] miscentur, ut videre est in Diacreta, Emuls: [illegible], [illegible]: pulv: Anticardiaco: Pulv: [illegible], Pulv: cardiaco, [illegible] Anticardiacis: B: 4°. Diluunt omnia aquosa, ut [illegible] aq: [illegible] [illegible]

v. [illegible] cali; quæ frequenti experientia reperiuntur proficua. 5º. Tribuuntur omnia stomachica et sudorifera, quæ etiam in casu salino elastico conveniunt, uti fac: pulv: pectoric, omnia ex [illegible] flor: macis, N: M: Ciram: et sim. Huc etiam pertinent pulv: millep: etc. 6º. Evacuant vomit: et purgantes ex prædictis omnibus non neglectis opiatorum usu.

Cariei ossium remedia. Huc ven: omnia communicationem inter partem ossis corruptam et sanam tollentia, ut sic nec humores, lacteng depravati inde fodicent, nec qui adhuc sani sunt, ab extus, ut depravantur, ampliùs inde vergant, uti fac: 1º. omnia exsiccantia. ex Aloe, myrrh: [illegible] Aristoloch: sp: Vini, etc. [illegible] 2º. Ex cauterisantibus acribus, ut Euphorbio, etc.

Lapsus et contusionis remedia. Huc ven: plerumque in initio 1º. Omnia adstringentia, fibras firmantia, et depositionem sang: et humorum copiosam in partem affectam intercipientia, uti faciunt [illegible] Empl: Defens: ol: ros: etc. externe; interne verò Dec: ex pilo sella, burs: past: Bals: Lucat: aliaque in Hæmorrhagijs internis. 2º. Post aliquot dies veniunt Mollia, fibras à contusione distortas, in pristinam statum circulationem humoribus in ijsdem stagnantibus liberam conciliando reducentia, uti fac: externe pellis agnina, vitulina, ovina, omenta ferè omnium, olea, Ungta, solg, et Empl: emollientia externa; Butyrum limacibus, Mollii: Alth: malv: sem: Lini; interne Dec: ex ijsdem, Butyrum recens [illegible] [illegible], [illegible]: Prussiana, Spir: Cali, ol: Lini, amygd: et sim. Huc etiam commendantur 3º. Media sanguinem coagulatum et extravasatum resolventia, uti fac: pulv: [illegible], [illegible], rad: Cariophyllata, Rub: tinct: pulv: Bombardicus, [illegible] Cali, B: ex terra sigil: sang: Drac: lap: Hybernico, Mummia, Spir: Cali, et Rhab: Sed hic pulvis est magis adstringens quam resolvens, et idcircò vix usus immediatè post lapsum ad [illegible] pro vice includi. Interea si alvus sit adstricta laxetur Elect: Lenitiv: vel Dec: pastul: cum Senna.

Catalepsis remedia. Huc ven: omnia motum in sang: humoribus et nervis augentia. ut in Apopl: et reliquis morbis soporosis.

Cataracta remedia. Huc ven: omnia [illegible] videlicet in internâ pupillæ superficie in pelliculam [illegible] (Cataracta enim confirmata solo acu chirurgico est curanda) divellentia, et tam minutim discerpentia, ut circulationem iterum agnoscat. uti fac: omnia tam subtilia, et tamen minimè acria, ut vires strictissimas tunicæ corneæ sine læsione permeare queant. Uti fac: Dec: [illegible], succi, Infus: etc ex [illegible]: [illegible]: [illegible]: Euphr: Sem: [illegible]: Millep: Huc etiam maximè commendatur aq: Chelid: maj: cum vino Emet: et Croco Metall: sed cum pleraque acria sunt, quam subtilia, et idcircò inepta ad Corneam transeundum, multò magis in oculi maculâ externâ quam internâ abradendâ prosunt. Interna media omnia veniunt, quæ fluiditatem sanguini et humoribus conciliant, uti fac: non solum externa recensita (ut videre est in Elect: Sudorifico, Ceruss: Sudorifica, pulv: cibario, pulv: ophthalm: sp: Millep: B:) sed et etiam om=

omnia Cephalica et acria et oleosa in Capitis dolore recensita. In ægrotis non proficientibus ad Sal. vol. p. Galia. Fluiditatem maximam humoribus conciliantia, procedunt. pro cat: vide Media Catarrhi; Cataracta omnis est catarrhus partis.

Catarrhi calidi remedia. Huc ven: omnia in Ser. in gland: circa caput et fauces. Ubi sic enim partibus et pulmonibus, nomen Catarrhi restringitis influxus copiosi inhibentia, ejusque acrimoniam temperantia, et incrassantia, uti faciunt (post V. S. purg: laxantes, Vesicantia, et sim.) 1°. omnia crassa utriusque generis, et externè et internè, uti in Angina, Hæmoptoe, tussi sicca, et incipiente Phthisi; Qualia sunt Amygdalata coct. Bals: Lucat: ung: plant: ex sem: Hyosc: Looch; ... ex Syr: papav: Diacod: Spec: Diatrag: frig: Gum Arab: sem: psyll: papav: amyl: cons: fl: Nymph: Ros: Spec: ... in lacte malubri soluto, &c. —2°. Omnia opiata, ut pil: math: pacific: de Cynoglosso, &c. vide Phthisin &c pro aliis Medicorum formis.

Catarrhi frigidi remedia. Huc ven: omnia tempta p. seri mitis et insipidi, in prædictis partibus depositionem inhibentia, fibras in iisdem p. circumcirca firmantia, et stillationem removentia. uti fac: (post Vomit: Emmenaga. purg: fortias et sim.) 1°. omnia discutientia partibus firmis combinata, ubi sem et: pro sut: coronarii; Cucupha, Suffitus, Odoramenta, Errhina, &c ex Lavend: Olibano, Succ: Ajacum: Caranna, resina, Mastich: pice Græc: gum Junip: ... Caryoph: aliisque aromatis, et Bolonica aliisque cephalicis vide pulv: Cucuphal: pil: Styracin: Castor, et sim. B: 2°. In depositione seri hujus in pulmones, veniant omnia in asthmate et tussi humida recensita.

Cephalalgia, Cephalæa, vide Capitis dolores.

Cerebri commotionis remedia, vide Capitis doloris, et Casus et Contusionis remedia.

Chlorosis remedia eadem sunt ex iis Menses moventibus. ☿, chalybs, &c.

Choleræ remedia. Huc ven: omnia acrimoniam nimiam, ventris et intestinorum fibras, immoto convulsivos excitantem sive abingestis, sive ab hepatis depositionibus p. 1°. Evacuantia, uti fac. Vomit: et purg: ut sublata causa tollatur effectus. p. 2°. Diluentia uti faciunt Ser. lactis. aq: tepida, in hac iuscula cerev: tenuissima, possola, &c. 3° Infringentia, uti fac: omnia acida non corrosiva, ex aceto: Ribes: Citro, Limoni Cydon: aceto, quibus plerisque diluentibus miscentur. p 4°. Involventia, uti fac: omnia mollia, ut Dec: malv. Alth: ol: coct. &c. p 5°. Stomachi fibras firmantia, ut Ther: ol: macis, menth. externè et internè; imò in principio in maxima debilitate; quibus omnibus opitulantur Opiata.

Colicæ remedia. Huc ven: 1°. Omnia mollia, et flexibilia et laxantia fibras et saccos emollientia, uti in alvo ad strictâ, quæ non solum proficua reperiuntur ex excrementa indurata morbus efficiunt, sed et etiam sæpissimè cum acrimoniam sine ulla faecum induratione prava suspicione, pro causa agnoscunt: sic ol: Amygd: ex vino Hisp: et Mixt: Anticol: B: ex Manna ℥j

Cat: opiata ex purg: mitis. Polor

oril: card: spir: c. āā ʒij. et elect: lenit: ex sero lactis. et sim. : spa=
lantes probatissima. quia non soli partes aereas involvunt et educunt, sed
et etiam fibras prius tensas, et partas: istas firmiter retinente; à ter tione
liberant. 2o. Omnia diluentia, ut haustus aq: frig: Aq: endiv: cichor: papav:
et sim. quæ in colica à causa acri, calida dictas sæpissime prosunt, cum
se: acredo staltissima solummodo lambit. 3o. Omnia acida non corrosiva,
ut sp: nitri dulc: quæ: salem infringunt. 4o. Omnia terrea testacea, quæ:
aciditatem, juvenibus ob concoctionem debilem nimis familiarem, obtun=
dant, et ut loquuntur recentiores, dulcificant sic ex ocul: &c: 6o. hic fiunt
pulv: anticol: vide B: sed in his omnibus 5o. (nisi in casu primo)
præterea soleo omnia stomachica potentiora in viris, et hysterica in
fœminis. h. e. sive dolor sit distensivus (ob pituitam intestina distenden-
tem, et disproportionem vaporum ex eorum poris) sive lacerans ab acido, sive
pungens à sale, sive vagus, sive fixus, i.e. sive à causa calida, sive fri=
gida, à me, sine ulla distinctione, pro mat. peccantis consideratione, poros
potentissime aperientibus, et obstructionem (sine qua raro fit dolor) rese=
cantibus tractatus (minus enim potentes aliquid augent, eo quod humores in suis car-
ceribus habitantes, non dissipant, sed solummodo commovent) illi inter non
mixturis, aliisque formis ex Ol. Chamom: menth: meliss: cinam: [illegible] castor: [illegible]
nip: Galang. ol: menth: macis, Gariophi: Succin: Junip: et sim. ex æther: sale vol:
oleoso, sp: salino aromatico, et sim. ex laud: vide emplast discutientia. In omni-
bus his casibus, non negligantur Enemata, nunc oleosa, nunc carminativa,
nunc suppositoria, epoti, catapl: purg: &c.

Convulsionis sive Epilepsiæ remedia. Huc ven: 1o. Omnia cepha=
lica, quæ ex subtilitatem et proportionem quam habent ad nervorum [illegible] obri-
lica, quæ ex subtilitatem et propositionem quam habent ad nervorum et [illegible]
poros strictissimos, materiam omnem in iisdem habitantem, sive pituitosam, sive
acrem, dissolvunt. 2o. Omnia stomachica, præcipue aromata; quorum enim ol-
majorem partem subtilem nitricationem pro fixitatem, non tantum habeant ad
nervorum poros propor[tio]nem, tamen ob molem quam sanguini et humoribus, et fi-
bris nervorum communicant, destruentes, edunt effectus, quæ ob causam 3o. Acri-
a ipsa, ex prædictis formulas ingredientes. 4o. Huc ven: omnia alcalica, ut lap:
[illegible] &c. 6o. corallia et sim. quæ: aciditatem, sanguinem tigentem et
habitantes inducentem infringunt. Sic ex prædictis plurima fiunt formata,
ut sp: et aq: ex simplices, et composita, externe, interne, pro libitu formanda, ut sp: et aq: ex
hirundinum, [illegible], picis, corvis, milvis, vulpibus, limacibus, sang: humano, sterc: pavo=
n: [illegible] castor: rad: pæon: et sim. ex vino destillanda. Fiunt etiam
pulv: ex corvo Galang. et sim. in clibano siccatis; pro ex rad: dictam: visco
querc. serpentar: vira: pæon: sem: ejusdem, ung: alcis, āā ʒij. rad: valer:
solv: ʒj. corall: rub. cranij hum: āā ʒiij. lap: [illegible] smarag: āā ʒj. Bezoar:
orient: ʒiß moschi gr: v. fol: auri N° XXX. vide pulv: de Guttetâ et comitissæ.
Elect: ex iisdem ex cons: fl: Anthos, ung: et olea, ex ung: nerv: ex ol: succ:
major: castor: sp. C. C. ol: spica, pingued: humana et sim. Empl: pro salue
coron: de gummi ex ol: succ: castor: &c. mixturas ex iisdem ex sale vol: et [illegible]
riac: ac syr: eodem. sicque procedendum in omnibus aliis formis. 5o. Non negligenda
(sunt

sunt, in Convulsione à Repletione &c. vermis: ex Dec: Diorial. Syr: de Ptho. &c. simpurgantia ex cephalicis, Cucurbitulae, Vesicatoria, Cauteria, Fricationes, &c. Enemata, Ligaturae et punctiones dolorificae: Et è contra, in Convulsione ab Inanitione, ob siccitatem, Emollientia plus alijs prosunt.

Cordis palpitationis et tremoris remedia. Huc ven: 1º Omnia Alcalica, ut in Cardialgia, qual: acrimoniam, arteriarum & cordis fibras convellentem, infringunt, & polypos cordis diluunt. 2º Omnia Stomachica, Cardiaca, et Cephalica spirituosa, et externe et interne.

D.

Dentes candidos reddunt. 1º Omnia extersiva impuritates &c. particulis rigidis abradentia, ut pulv: Laterum, ossis Sepiae, Pumicis, Corall: utriusque, ossium et testarum combustarum. 2º Omnia acida corrosiva in parva quantitate, quales asperitates in dentibus superficie abradunt, uti fac: ol. vitriol: tart. vitriolat:, Sp: Sulph: &c. & in aq: dilutas & praedictis mista. Qua de causa huc etiam ven: omnis fere vegetabilis cineres, praecipue qui tam salinis quam terreis gaudent, ut cineres Nicotianae &c. & Burnetti Chirurg: Praxin: Engl. Mss. 206. annot: Chirurg. p. 5.

Dentes mobiles et vacillantes firmant, quaevis formulae ex Vitriolo, Gum: Lacc. Mastich: Gum: Elemi, Ichthyocolla, Alum: et Astringentibus. Si scorbuti sit symptoma, consule Aphthas et Oris ulcera sanantia. & citat. supra.

Dentitionem facilitant omnia gingivas nimis solidas et duras emollientia, et nutrimentum ad et circa dentium radices promoventia, uti fac: Butyrum, cerebrum Cuniculi et Leporis, Sang: è cristâ Galli, et sim. ex mollibus in consistentiam aliqualiter crassam, ut gingivis adhaereant, reducta. x Torques ex rad: Paeon: mar: et Hyoscyami. recent. B.

Dentium dolores sedant. 1º Omnia acida, qual: humores tenues et acres sistunt, coagulant, infringunt, et nervos stupefaciunt, ut alum: nitrum, vitriolum, eorumque ol: & Sp: dentium foramini imposita. 2º Omnia valde sublimia, imo et acria, quia maxam acrem circa dentium radices habitantem dissolvunt, uti fac: ol: Heraclini, Buxi, Chartae, Caryoph: Tabacci, aliaque formulae ut globuli & pil: &c. ex Pyreth: Staphidis agriae, Caryoph: piperis, sem: Sinapi &c. Quibus opitulantur externe Ischuriaca ex mica panis albi et lacte, et sim. 3º Ne non omittantur Opiata interne et externe, ut et Camphorata. x

Diabetis remedia. Huc ven: 1º Omnia crassa, qual: humores nimis tenues et mobiles incrassant, ex Lactucâ, Intybo, Portulaca, Nymph: papav: plantag: Amylo, Gum Tragac. Arab: Ut Dec: Syr: olera &c. 2º Astringentia, qual: non solum humores immobiles reddunt, sed et etiam poros renum nimis apertos constringunt, et fibras nimis laxatas (ut in intestinis fit in Lienteria) firmant, uti fac: omnia ex Bolo, ter: sigil: rosis, Myrtillis, sem: Cydon: Santal: rub. C. C. u. st: rad: Bistort: Torment: Corallijs et praecipue Consolida, trochisc: de Spodio. Tra Smaragdi. Tra martis. Huc etiam ven: externe pro Lumbis omnia ex Rubrico, Ung: Comitiss: popul: rosarum, ol. ros: Myrtill: Mastichino &c. 3º Austera, praecipue Syr: prunel: et Cydon: quae ut astringentia operantur. 4º Viscosa nutritiva, ut Gelatina &c. ex pedibus vitulinis, bubuli: cervorum: ovis

---

Crusta panis tosta, ex aq. pane. Poterp. 70.

x gtt 1 & 2 ex aq:

x Frictio gingivarum sang: Leporis, Vocat rad: Scorzon: Bibl: 204. Harv. Anat: Engl. Mss. p. 90. 94

Engl. Mss. 206, &c.

x Opium denti impositum, & externe temporali per modum emplastri: Opiaty. Bibl: 204.

ons sorbeat bo: Lactes chalybeati, et amygdalati. 5º Exsiccantia, humiditatem et laxitatem dissipantia, ut Aq: Bened: B: pro potu, et carnes perdicum, turdorum, alaudarum, pro cibo. Interea non negligentur Opiata.

16 Blank Leaves Not Scanned

Ad Sect: de Compendii Causarum et Cura omnis tumoris.

Gangraena ventralis ψ posses.

Prolapsus Ani ex longo est. fit ab extrahendo telam: bombycini Recti, ψ alia interna ipsius tunica. Ordinario fit a replicatione tunicarum internarum, ut etiam fit in prolapsu Uteri, pro quo ψ praxin Chirurgiam Mauricean, &c. — 4.

Tendinis ruptura est tanto ruptura tunicae tendinis exterioris. Quo ia etiam sunt Tendinis tumores ac tumoribus extra[illegible] inter vesicas, quae Ganglia, qui curantur frictione quotidiana partis per 3 ψ 4 septimanas. Fall. 215.

Aneurismata tris sunt generis. 1. punctio tunicae externae seu Membraneae Arteriae unde tunica musculosa et nervosa ob puncturam prominent aliquando in magnitudinem pomi. Cura fit methodo Pyramidali, in qua primo obolus superponatur, deinde Emplastrum deinde Denarius, tunc Empl: deinde dimidia corona argentea, tunc Empl: super quae omnia fit ligamentum conveniens. 2. Corrosio tunicae externae intrinsecae del: [illegible] fortem in Angulis quibusvis, ut sub axillis. 3. punctura et perforatio tunicarum omnis Arter: in qua Sanguis tumefacit subjacentes musculos et cutem, hoc Aneurisma falsum. Cura hujus fit ligatione arteriae supra Aneurisma, et scarificatione tumoris, et sanatione ut vulnus com. — 2.5. — ×ut sit quasi pyramis.

Varices etiam curari possunt ligatione venae infra varicem, et scarificatione varicis et extrahendo sang: torpidum, deinde sanatione ut vulnus com. ψ curantur hoc modo, ℞ ramus Sambuci, findatur, purgetur a medulla, impleatur cavitas acacia, hypocistide, &c et applicetur venae. ψ Chirurg. Sunt distentiones venarum in tota ipsarum substantia seu corpore. — Varices. — ψ Bibl: 368, 509. ×Sp. vin: pag: [illegible] ψ Bibl. [illegible] ψ Bibl. 504.

In Sugillatione, & e. ex motibus Emphysematis, ut et Contusionibus lividis et nigris, optimum remedium est Cataplasma ex radice Consolidae, ψ Empl: Minij ex Sapone, ψ Cataplasma ex Alt[illegible] Sp. vini Camph. [illegible] [illegible] adsit vulnus, suppurantia in ulcere et [illegible], Empl. de Lumine, et philos. Empl. de Baccis Lauri, &c Fall. 12. — 2. — ψ Brac[illegible]

Tumores sunt in partibus glandulosis, ut inguine, axillis, et plerumque sunt eruptiones criticae, et morbum praecedentem solvunt, et Deo modis commodis maturanda sunt, ut ad suppuratione non perveniant, ne retrocedentes relapsum causent. Item inflammationes venereae exuberibilis et emollientibus maturanda, non repellenda.

De maa profunda sita est; Post febres et alios morbos patientes aliquando queruntur de dolore in femore ψ alibi; quod signum est materiam febris ibi depositam, quamvis Cutis non omnino decolorata sit, nec ullus tumor appareat, ob materiae profunditatem; ad suppurationem tamen deducenda est, haec materia non repellenda, ne redeat febris. — [illegible] ψ modum ex 72. 73 Compend: [illegible]

[illegible] Tumor signum est Hydr: abdominis, qui curanda est in Compendio ψ vide postea hydrocephalo, et in seq: pag: ψ Annot. Chirurg. — 4.

Hydrocephalus intra cranium incurabilis; extra cranium curabilis; idque ψ alem Compend: ψ deinde cutis scarificatione, ex hac cautela, quod fomentandus est calide, ut Spongia plena Sp: vini, et Sim. ne partes corrodantur et corrumpantur à Rigore Lymphae ita educta. Idem etiam aliquando fit in Hydrocele [illegible] et [illegible] ex praedicta cautela. ψ Curatur Aromaticis vino albo coctis et capiti applicatis. Intra cranium, volat. sudorif. ex [illegible] opt. ψ ℞ Rad. [illegible] [illegible] Ʒj. Sem. Cumini ℥j. tartari fal: ℥ij. H. melis anthos q. [illegible] — be gangraenated.

[illegible], Atheromata et Steatomata optime curantur hoc modo. Fiat scarificatio caute donec perveniatur ad tunicam seu bursam ipsorum propriam, quae demittatur integram ex materia contenta (ut educitur vitellum ovi ex albumine) et deinde sanetur vulnus ut alius generis com. Eadem methodo sanantur Scrophulae cum rarum cura fit antequam ad suppurationem perveniant. — Si autem [illegible] pus excernunt, & ipsi et salivatione non cedunt, tractari tamen possunt [illegible] [illegible] Bronchocele, ψ Chirurg. de Scrofulis ψ Mayern [illegible] [illegible] scrofulis [illegible] et mox braminis indatur gr. j. merc. dulcis. [illegible] dolorosis. ψ praeparentur placentae seu pastae [illegible] amygdalatae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ψ Herb. [illegible] Meij coq. in [illegible] [illegible] [illegible] bis in [illegible] — 5. — [illegible] ψ Apol. Artemis. major: Rorism: absint. [illegible] Croc. q. [illegible] vini alb. [illegible] eodem modo [illegible]

[Left margin, vertical:] [illegible] ulcerales apertas, et scrofulas, ulcerales, glandulas, majores [illegible]

+ Annotata ad Schyrrus Hepatis et Lienis in Praxi [illegible]:

Schirri plerumque fiunt in hepate et liene: aliquando etiam in tegumentis [illegible] mim; [illegible]. Schyrrus est vel verus vel spurius. Verus est omnino indolens; spurius plus vel minus dolens ob activitatem quandam mali, unde ad suppurationem promovendi sunt, et non aperiendi [illegible] suppurantis [illegible] [illegible] est [illegible] suppurat[illegible], sedem [illegible] [illegible] bono [illegible] et [illegible] [illegible] ulceris [illegible]: [illegible] aperienda.

7. Aphthae rubrae, bonae; lividae vel nigrae, malae. Curantur collutione oris melle vel melle rosae: cum pauco alum: et purgatione leni in infantibus. — [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], curantur Ungu: mercuriali et ol: [illegible] [illegible] deliquio, vel Ung: [illegible] [illegible]. — Lentigines curantur lotione [illegible] sp: vini, [illegible] [illegible]. — Sudamina, [illegible]; [illegible], et [illegible], curantur longo [illegible] purgatione, sed frequenter [illegible]. — Erysipelas curatur [illegible] tantummodo partem affectam sp: vitrioli vel sp: nitri; vel solutione Alum: [illegible], vel atramento. Herpes Miliaris, [illegible], eodem modo. — Scabies [illegible] [illegible] vel cum Butyro recenti.

+ et [illegible] interne ad salivationem vel tantum ad purgationem.

8. Cognoscitur Tympanitis a hydrope sic. In hydrope sunt fluctuationes [illegible]: [illegible] [illegible] secundum positionem corporis; in Tymp: non idem. 2. Tymp: subito venit, Hydrops non idem.

Curatur Carminativis, et Clyst: ex fumo Nicotianae.

Tumores flatulenti cognoscuntur ab ulceribus, [illegible] [illegible] pressioni manus non resistunt, sed subito collabuntur, et remota manu subito resurgunt. Empl. Carminativis.

Tumores flatulenti curantur Empl: carminativo in officinis usitato. [illegible] cognoscuntur ab Enteromph. Enterocele, Epiplomph. [illegible], Hydrocele, [illegible] posteriores omnes [illegible] [illegible] [illegible] in abdomen, priores non. 2°. [illegible] priores, pressioni manus non resistunt, sed subito collabuntur, et amota manu subito resurgunt. Curantur [illegible] [illegible] Carm. vel [illegible] [illegible] interne, et Empl. Carminat. [illegible].

9. 10. vide Chirurgiam et Praxin. vel Marginem.

11. Gangraena curatur scarificatione partis affectae, et [illegible] sp: vini; [illegible] eodem modo. Gangraena incipiens in carne tantum [illegible], et [illegible] adest dolor; Perfecta seu Sphacelus est mortificatio non tantum carnis, sed et nervi, unde indolens est, et negatur sp: influxus. Ung: Egypt. cum sp: vini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] partem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] actuale.

12. vide Praxin.

Herniae ventralis cura. [illegible] [illegible] [illegible] cum lino, cotone [illegible] [illegible] [illegible] corporis [illegible] [illegible] [illegible], foraminatae: supra quam continuatur fascia et ligatur circa corpus [illegible] [illegible] [illegible] mulierum pectorale etiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], quae supra indusium mulieres [illegible] (Stays) [illegible]: hic enim morbus mulieribus post partum familiaris [illegible] accidit. [illegible] Hernia umbilicali [illegible]. Exomphalos [illegible] [illegible] accidit.

Hydrocele cognoscitur a Cirsocele sic, quod in hydrocele cum [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] Aq: in ventrem, in Cirsocele non ita. In hydrocele etiam [illegible] magis fulgens, quam in Cirsocele.

Cirsocele differt ab Enterocele quod prior minor fit eo quod accidit fiat, posterior major [illegible] quod ab intestinis fiat. Cirsocele etiam adnascitur extremitati testiculi. Enterocele fit inter [illegible] seu tegumenta communia, et tegumenta propria testiculorum.

Epiplocele dignosc: ab Enterocele hoc modo. Epiplocele cum contrectatur [illegible] manus ut corpus unum indivisum; Enterocele vero [illegible] manus ut corpora rotunda diversa, seu ut vermes.

Pneumatocele dignosc. vide antea.

Bubo in inguine dignoscitur a descensu intestinorum et vasis ibidem varicosis ex eo quod hi subito fiant, ille vero temporis spatio colligitur.

on voit paroitre plusieurs petites flammes de même couleur
que celles du soufre vif quand il brûle, ou du sel commun
qui est en fonte: les sels ensuite prennent une couleur fer:
rugineuse, et demeurent fixes, ils se dissoudent pourtant dans
l'eau commune, qui etant filtrée et evaporée rend les sels
tres blancs, lesquels réexposez de nouveau au feu de fonte,
n'ont plus de fixité, et se dissipent entierement. Les petites
flammes &c declarent que les sels mineraux sont melez de quel:
ques petites portions de souphre, et de sel, qui se sont fixez
dans l'evaporation: la couleur ferrugineuse des sels et leur fixi:
té dans la premiere fonte, decouvrent quelques parties fixes
et metalliques, peût-être même de fer, lesquelles etant separées
par la filtration, laissent ces sels faciles à être volatilisez.

p. 26. Je soutiens que la fermentation centrale est la seule cause efficiente de
la chaleur actuelle dans les Eaux, les particules heterogenes de la terre
et les ferments acides et alcalis continuent cette action. — et p.
30. Je conclus donc que les fontaines minerales actuelment chaudes
se font par l'action des fermens opposez: et les minerales actuelle:
ment froides, par l'inaction qui s'opere par l'union, ou par la su:
periorité de l'un ou de l'autre de ces fermens, ou par des autres
particules terrêtres, qui les lient et empechent leur action. vid. hic
hist. et explicat. mirabilis fontis Louzand in regno Galliciæ.

p. 42. voyez les qualitez des 4. complexions ou temperamens du corps.

p. 47. De la juste harmonie des fermens volatils, acides, et alcalis, depend la
santé. — Nos Eaux thermales sont efficace sur tout à rectifier l'a:
cide vitié, à raison qu'elles tiennent beaucoup davantage de la
nature des alcalis; — car elles sont composées de l'acide universel,
sans acreté doux et agreable, comme on le decouvre quand on
boit les Eaux, dans les fleurs de souphre, dans les sels separez
de l'eau, et dans l'alcali volatil huileux et salin. Elles sont
alcali salino-volatiles. — p. 51. Nos Eaux par la boisson guerissent
le <u>Bulimos</u> ou faim canine, les flux de ventre, des tranchées, des
opilations de la rate, du mesentere, du pancreas, et des autres viscé:
res, d'où dependent ensuite les fievres intermittentes, les suppressi:
ons d'urines, la jaunisse, &c (N. B. c'est seulement la jaunisse causée
par la viscosité de la bile, et par les obstructions de ses canaux
qui empechent sa decharge dans le premier intestin, qu'elles gueris:
sent; car la bile dans sa grande volatilité est aussi portée du centre

centre à la circonference, ou elle teint la peau; pour lors nos
Eaux seroient contraires, etant naturel aux alcalis volatiles de
faire la dissolution des corps coagulez, et de volatiliser de plus
en plus les humeurs déja exaltées, &c) Elles guerissent aussi les
affections de la matrice, hypochondriaques scorbutique, &c; aussi
les maladies chroniques, comme les cachexies, les leucophlegmaties,
les pâles couleurs, &c. Elles font couler les mois: Elles chassent
la gravelle, et dissoudent même les pierres, parce qu'elles detru:
isent l'acide petrifiant et les viscositez d'où elles tirent leur
matiere. voyez ici l'Experience que rapporte Blondel touchant le
Bourgomaitre de Riga. — p. 59. Les Bains de nos Eaux thermales
guerissent, ou au moins adoucissent, les schirres, les chancres, les
ulceres, les dartes, la galle, les goutes noüées, flatueuses chaudes
et froides; les rheumatismes; les paralysies, doubles et simples;
la froideur, le gonflement ou l'œdeme, et l'atrophie des mem:
bres. — Les Cantharides appliquées aux deux mains causent des
urines sanguinolentes — Les Bains guerissent aussi les asthmes,
les catarrhes, les coliques, &c. vid. Blondel p. 131, et seqq. — Les Bains
guerissent aussi la <u>sterilité</u>, et plus promptement si on en fait
des injections dans la matrice avec une seringue appropriée
à cette operation. voyez ici la figure. vid. tot. caput à p. 44.
ad p. 68.

p. 69. Les Eaux thermales (comme nous avons vu dans le chapitre precedent)
guerissent les maladies de l'interieur et de l'exterieur causées par
l'acide peccant en qualité ou en quantité, et du defaut de fluidité
dans les humeurs. — p. 70. Il se rencontre souvent des cas où il
faut user de la boisson et des bains en un même jour; par exemple
lorsqu'un sujet cacochime est disposé à la leucophlegmatie, boit
les Eaux thermales, toute l'habitude du corps ne manque presque
jamais de se gonfler, comme s'il etoit souflé, &c alors il faut
baigner le même jour. — p. 71. La coutume a mis de la mode de
purger les corps avant et apres la boisson des Eaux minerales. Je
ne veux pas l'improuver, principalement dans les corps caco:
chimes. — J'approuve les plus doux purgatifs, comme les potions
composées de senné, de rhubarbe, de manne, de siropes, de fleurs
de peckers, de roses, de violets, &c. Il y a des personnes à qui 2.
ou 3. onces de ces siropes delaiez dans le premier verre d'eau
suffisent pour commencer et finir; et même, s'il leur survenoit
de temps en temps des constipations en beuvant les Eaux; —

p. 72. la saignée est quelquefois necessaire pour preparer les corps à l'usage des Eaux minerales; elle donne plus de liberté au sang de circuler, et elle rafraichit beaucoup les corps, si elle est faite du bras gauche. Lisez sur ce sujet la dissert. de Mr l'Hage dans le journal des sçavans, &c. — p. 73. La quantité qu'on doit boire ne se peut fixer. Quisquis ergo cum ventriculo rati=onem ineat, quantum aquæ ferre possit, et quà citò illam egerere, hanc semper regulam in ore habeat. ab Heers spadacrene p. 115. — Quantò quis plus biberit, eò melius habebit, dummodo aquas be=nè egerit. Idem, ibid. — p. 78. On trouve à Aix six maisons differentes pour se baigner et pour suer. La plus magnifique est celle de l'Empereur, qui contient cinq bains. C'etoit l'endroit où Charle-le-grand se baignoit avec ses Enfans. Les Petits Bains ne sont pas moins commodes: ils ont leurs sources communes avec ceux de l'Empereur. Ceux de St Quirin ont leur puits parti=culier. Les bains de ces trois maisons sont egaux dans leur puis=sance medicale. Les Bains de St Corneille, de la Rose, et des Pauvres sont beaucoup plus chauds. Dans ceux de St Corneille il y en a de trois differents degrés de chaleur, on les nomme Pa=radis, qui est un bain de delice pour ceux qui veulent se delasser; le Purgatoire fait souffrir par sa chaleur ceux qui se baignent; l'Enfer est fort difficile à supporter. La Rose a 4. bains fort propres et fort commodes. Le Bain des Pauvres est bien le meil=leur pour la force medicale. — p. 81. Le temps le plus propre pour se baigner est le soir et le matin, quand l'estomac a fait la digestion, &c. — La regle generale pour en sortir est quand les arteres font sentir leur pulsation, et que la sueur commence à decouler du front. — Le Bain tiede est celui d'où on tire le plus d'avantage; jamais il n'en arrive d'infortune, mais des deux extremitez, sçavoir chaud et froid, on doit s'attendre bien des maux. &c. — p. 85. Il est convenable qu'on prenne tous les jours les bains à un même degré de chaleur; Fallop. de aq. therm. l. 7. — A Aix d'ordinaire on commence par les bains de l'Empereur, par les petits Bains, ou par ceux de St Quirin, qui sont doux, et egaux dans leurs sources, et où il est de necessité de souffrir les bains chauds, l'on poursuit par les bains de St Corneille, ou de la Rose, qui sont beaucoup plus forts. — p. 91. Il est bon qu'on sçache qu'avant de sortir du bain, il faut qu'on fasse monter la chaleur d'un demi de=gré de plus qu'il n'etoit quand on est entré dans les bains, et même davan=

J. F. Bresmal Hidro-analyse des Eaux d'Aix la Chape.. A Liege 1703. 8vo.

p. 11. L'Evaporation est le seul chemin qu'on doit suivre pour l'Ana=lyse des Eaux: la Distillation, le poid, la putrefaction, et la precipitation (par les esprits acides et alcali) ne donnent point de connoissance certaine de leurs qualitez: &c.

p. 14. 15. La projection de la poudres des noix de galles sur les eaux minerales chaudes d'Aix les blanchit en laict, ce qui prouve qu'elles sont sulphureuses. La noix de galle tient de la nature des alcalis, et les alcalis solides ou liquides font toujours cet effet sur les Eaux minerales sulphureuses, soient-elles actuellement chaudes ou froides. Le sel nitre, et le sel marin, concentrez par l'acide sulphureux du vitriol, projettés sur nos eaux mi=nerales chaudes, ne prouvent pas moins qu'elles en contiennent; elles se teignent d'abord d'une couleur pourprée, ce qui ne se fait que par l'union des deux soufres. — nos sens sont en=core des preuves plus convaincantes. nôtre Odorat ne nous laisse pas douter que les Eaux thermales d'Aix, aussi bien que celles de Bade, ne contiennent la substance de souphre dissoud; et nôtre veüe nous decouvre des marques qu'on ne peut rebuter dans la grande abondance du souphre et de ses fleurs, qu'on voit fixées avec les sels thermaux dans les puits des bains, principalement dans celui qu'on nomme de l'Empereur. Les parties sulphureuses aqueuses et les esprits acides étant separez par l'evaporation, il reste sur chaque tonne environ une livre de sel thermal, i.e. un sel alcali de la nature des sels lixivi=eux, et non pas sel ~~ac~~ acido-salsum, ut sal gemmeæ, nitri, &c.

p. 22. Le defaut d'acide dans les sels de nos Eaux thermales leur est tres avantageux. Ces sels sont penetrans et alcalins, et les parties grasses, bitumineuses, et subtiles, jointes à l'Esprit acide universel, achevent d'en composer un remede pour les hommes dont on ne sçauroit assez remercier le Toutpuissant: ce sont ces parties grasses et bitumineuses qui jointes avec l'esprit acide se fixent en souf. dans les puits des bains. L'Experience de Vicaire prouve la veri=té de ce que j'avance. Accipe aliquod inflammabile, v. g. oleum terebinthinæ, juniperi, aut succini, &c. distilla per Retortam, et acquires sulphur vivum perfectum. Vicar. Hidro-phil. nov. §. 1.

p. 47. Il reste à remarquer que les sels thermaux, qui restent apres l'evaporation, etant mis dans un creuset au feu de fonte, se mettent d'abord en fusion. Dans le tems qu'ils restent au feu

d'avantage pour ceux qui seront d'envie de se faire suer en etant sortis. — p. 92 et seqq. Le mouvement du corps fait passer les Eaux, augmente la chaleur naturelle, eveille les esprits, avance la distribution des humeurs alimenteuses, et la decharge des excrementeuses, mais il doit être lent et moderé, principalement pour ceux qui prennent les bains, soit qu'il soit à pied, à cheval, en carosse, ou soit qu'ils dansent, &c. Le sommeil doit être moderé. Il faut eviter tout exces des passions de l'ame. Que le ventre soit toujours libre, soit en beuvant les Eaux, ou en se baignant. Ceux qui sont sujets aux constipations peuvent s'en servir des remedes suivants, ou aucune d'eux. Julapii laxativi Dicarij. ℞ fenn. mund. ℈iiij. Cinam. ℈ij. Glycyrr. ʒj. contund. et affund. aq. bullient. ℔j. stent in infus. hor. $\frac{1}{2}$. colet. per setacea cum levi expressione, et colat. add. Unc. j. vel ij. syr. viol. Dos. Unc. iij. vel IV. in prandio vel cœnâ. Conserva laxativa Uv. Corinth. ℞ Uv. Corinth. mundat. et ablut. ℔j. Cort. aurant. minutim incis. ʒj. coq. in aq. mineral. ℔IV. ad consumptionem $\frac{2}{3}$. partis. colet. et separatim serventur Uv. Corinth. Tum ℞ fenn. ʒij. Cinam. ʒß. his affund. colat. bullient. et stent in infus. tepida per noctem, mane coletur per setacea, et colat. add. Uv. Corinth. tum add. sacch. opt. ʒIV. et coq. ad consistent. Conservæ. Dos. cochl. j. hora una ante prand. vel cœnam. N.B. si corpus sit cacochymicæ et pituitosæ add. his remedijs salia quædam deterfiva, ut sal tart. absinth. aut Centaur. &c. Clyster simplex qui opt. purgat. ℞ fenn. et sem. aneth. ā ʒj. coq. in aq. ℥XVI. ad ℥Xij. colet. et colat. add. mell. ʒiß. sal. gem. ʒj. aut sal. comm. ʒß. M. et injice. Clyster magis compositus. ℞ fl. camomel. fol. malv. ā Mj. Anisi contus. ʒß. coq. in aq. ℥XVI. ad ℥X. coletur, et colat. add. Elect. Diacathol. vel Diaphœnic. ʒj. mel. mercur. ʒij. M. S'il s'agit seulement de rafraichir les intestins, le lavement composé de deux parties d'eau et d'une partie de vinaigre reüssit tres-bien, principalement lorsqu'il arrive qu'on s'est echauffé à prendre le bain trop chaud. — La diète doit être reguliere, &c; il ne faut pas remplir l'estomac le soir. &c. Les alimens solides doivent être de facile digestion, bœuf jeune, veau, mouton, poulets, pigeonneaux, perdrix et autre volailles champêtres et domestiques roties. — Il est de necessité d'eviter les cruditez, comme sont la salade et les legumes grossieres; les ragouts sont defendus et les patisseries, à cause de leur pesanteur, &c. — Il est bon de boire quelques verres de vin sans verdure et bien meur; il faut boire le moins de bierre qu'il est possible; il est contraire de boire entre les repas, — si ce n'est pas de Thé, ou de la Veronique tirée comme de Thé, en cas de besoin. Si quelqu'un a besoin de bien suer, il ne feroit pas mal

boire une tasse ou deux bien chaudement de l'un ou de l'autre en sortant du bain, ou une verre ou deux d'eau thermale, comme le conseille Mr Blondel. — Etant retourné chez soi il faut pendant 15. jours ou 3. semaines garder à peu pres le même regime qu'on observoit quand on faisoit remede des Eaux. — Ceux qui se trouve seulement soulagez, doivent se preparer à un prompt retour dez que la saison le permettra; car les maux qui ont jetté de profondes racines ne se guerissent pas tout d'un coup.

p. 104. On estime l'automne et le printemps les saisons les plus convenables à boire les eaux minerales chaudes, à cause qu'elles sont temperées. L'été est moins propre, principalement quand il fait fort chaud, parceque la boisson chaude pour lors echauffe d'avantage les corps et les altere. L'Hiver est entierement contraire à cause du froid, pluie, &c. On peut pourtant boire les Eaux d'Aix en Eté et en Hyver, quand les maladies ne donnent point de treve; mais en hyver il faut se contre-garder du froid dans une etuve, et en Eté, il faut boire ou se baigner avant le lever du soleil, et apres se promener dans une grande chambre renduë fraiche à force de laver, et avec des branches d'arbres nouvellement coupées.

Fin de la 1.re partie.

℞ Vini albi ℔ß.
Ficus, N°. 6.
fol. sabinæ dr. iij vel IV.
pug.

Coq. simul spatio $\frac{1}{4}$ vel $\frac{1}{2}$
horæ. filtretur pauculum
liquoris per linteum, assu-
matur quant. calidè fieri
possit, & applicetur denti;
refrigeratus, exspuatur,
& denuò assumatur liquor
calidus & filtratus, repe-
tendo sexies, septies vel
ultra.

probat. mr Greven kop.

[16]

The Countess of Abayns receipt
for the Epileptick fits.

Take the string that is betwixt the new born babe & the afterbirth, steep it in claret wine, wringing it betwixt your hands the space of an hour, in which time it must have ten times fresh wine; it will have a red scum upon it in the preparation, then take ye string & roll it on a board made of oak-wood, take care you roll not one ply upon another; you must have a care of it in drying of it, in ye pocket keep it in grey paper for use. Then take ye scull of a hang'd man's head (the longer he hangs ye better) & beat it to powder, take likewise some of ye string, make ym in powder, wn you have occasion the quantity is 5 grains, 3 of the string & 2 of the scull to men or women, to weaker children children 2 of the string & one of the scull, to weaker children let it be given three times in 5 or 7 days, let all ye drink given [illegible]al of the scull a grain given twice a week mixed wt 2 grains of the powder of a jay. Take this bird alive, cut of her head, her left foot from the knee, the point of her left wing, & put her feathers gutts & all in an earthen pot in an oven stopped close, so that none of the fume may evaporat.

Other powders must be given in black cherrywater in ye time wn it is green.

Arabicos judicat gravissimos authores in reducenda arte medicâ ad perfectiorem methodum credit superasse Galenum. Bagl. 41.

Ad hypotheses morborum construendas, observationibus de morbis & de remediis primò utendum. Principium generale hypothesis est figura et motus. Hypothesi autem in caeteris, quousque [illegible] vestigiis amussim respondet, a quibus si vel minimum recesserit, derelinquenda est, &c Bagl. 100.

Baglivius Hippocratis assecla, non verò Galeni.

Paracelsus et Helmontius phlebot. purgant. vesicant. et sim. ex medicina eliminarunt. Bagl. 90.

Helmontii similitudo de ebullitione ignis quâ missionem sang: apud vulgus dissuadeat, et alia, v. Bagl. p. 29, 30, 31.

Hippocrates [illegible] et methodicam experimentalem; Galenus Arabicam et rationalem medicinam excoluit. In quo differant eorum systemata? Missio sang: purg. vesicantia &c remedia Galenica.

[illegible] aristo [illegible] per [illegible] sonitus [illegible]
[illegible] sonitus reddantur; [illegible] quae opposita; magis in medio [illegible] Chymicus [illegible]

Si quis in loco domus lato [illegible] pariete cincto loquatur ad parietem converso [illegible] submissa voce, eam vocem audiri in opposita loci parte at ab eo qui aurem parieti admovet, in medio parte ejus loci non audiatur. Cujus rei haec est ratio, quod motus aeris per cavitatem parietis et fornicis [illegible] labatur, et ad oppositam usque partem continuetur, in medio spatio [illegible] tenuis, ut animadverti nequeat. Add. ad Instit. de Auditu.

[illegible] austero affinis est [illegible], qualis est [illegible] immaturorum, et est eorum corporum quorum partes hamulatae sunt, [illegible] hamuli [illegible] et magis obtusi sunt, quam in austero. Deoque [illegible] obtundunt, atque poros obstruunt: et quia hamulatae illae partes organi poris semel infixae difficulter dimoveantur, inde oritur dentium stupor. Physica [illegible]. Add. ad [illegible] gustus in Instit. + Biblioth. Anatom. [illegible] p. 203

Mali [illegible] a molu limae, aut serrae, ob ingratam illam aeris undulationem in stuporem dentium, aut molestam sensationem incurrunt, eo quia cum improportionatae sint molis aeris particulae; [illegible] nervorum radicibus dentium insertorum, easdem detorquent dimovent, atque adeo vel stupefaciunt, vel dolore afficiunt. Bagl. de [illegible]. cap. ult. pag. operum 639.

Odontalgia

℞ [illegible] acutissimi saporis, incide minutissime. ℞ pip: vulg: q.s. contundantur simul, et fiat expressio fortis per linteum forte et tenue, expressum liquorem per nares [illegible] lateri affecto opposito, [illegible] (snuff up) donec ad os pervenerit sapor, et stimulato [illegible] fluxu per os et nares excitaverit, caput bene tegitur.

Nota: Latus affectum cum optime calefactum ante usum liquoris praestat, et in latus idem decumbito, sic commodius horâ somni utatur, quo tempore magis praestat. [illegible] Magister Joan: Craig: [illegible] Mart. 8. 1711.

Pro eadem.

℞ [illegible] mundum, [illegible], et ei imponatur [illegible] gallinacea [illegible] sparsim [illegible], [illegible] tubus, [illegible] Tabaco, et fumetur, dein sumatur gossipium illud jam [illegible] Tabaci [illegible], et imponatur denti dolenti [illegible] sex vel decem horas, et decumbat aeger in latus affectum, et curabitur. [illegible] Medicina practica.

pro Eadem

℞ opii gr. j. involvatur Gossipio, & intrudatur denti.
℞ assae fœtidae gr. ij. involv. gossipio & intrud. denti.
℞ ol. Origani gutt. j. recipiatur in Gossip. & intrud. denti.
℞ Rad. Staph. agriae particulam, & intrud. denti.
℞ Cariophyllum, intrud. denti.

℞ Aq. Card. Bened.
—— Menth:
—— Meliss.
—— Theriacal. ā ℥iij
—— Cinam: Hord. ℥ij
Conf. Alkerm. —— gr. XV.
Pulv. Comitiss. —— gr. X.
Syr. papav. Errat. ℥iß.
Laud. Liq. —— gtt. VIj.

post 4. S.

℞ Aq. card. Bened.
— menth.
— meliss. āā ℥iij.
Theriac. ——— ℥iij.

Portal. chap. 1.

1. Pour reconnoitre si le travail est veritable, l'orifice interne de la matrice se trouve fort affaissé, et approchant de l'orifice externe, en sorte qu'au bout du doit (trempé dans beurre frais, l'huile d'amandes, ce qui n'ait rien d'odoriferant) on sent facilement qu'il se dilate et s'entrouvre; mais ça n'est pas assez pour indiquer une veritable travail, car il faut aussi que la femme ait des douleurs dans le bas ventre vers la region de la vessie et la partie superieure des pubis, et vers les vertebres des lombes et la region des reins, et que ces douleurs se portent vers le bas ventre, sur la nature, et sur le fondement. L'orifice interne qui se dilate, est aussi un peu mollet. L'orifice interne s'ouvre quelquefois dans la partie anterieure vers la vessie, et alors l'accouchement se fait avec plus de facilité et plus promptement, parceque la dilatation de l'orifice interne repond en droitte ligne à l'orifice externe; et quelquefois il s'ouvre à la partie posterieure ~~et~~ vers le Rectum, et alors l'accouchement est plus long et plus laborieux, pour la raison contraire, r[illegible]

2. Quand la teste est sortie il faut tirer l'enfant (avec les deux mains mises sur les parties laterales de la teste; ou avec une main appliquée sur la nuque du col) sans perdre de temps ni donner de relasche jusqu'à ce qu'il soit dehors, de peur que la matrice ne se resserre sur le col. ve p. 8.

3. apres qu'on a tiré l'enfant et l'arriere-faix, s'il arrive que la femme vuide peu ou point de sang, l'on doit craindre qu[e] ne se soit coagulé et figé dans la matrice et dans son col d'où bien souvent il s'eleve des fumées si malignes que elles font tomber la malade en syncope; qui cesse apres qu'on a tiré ~~les~~ les grumeaux et caillaux avec la main, ve p[illegible]

4. si la femme vuide et perd trop de sang, il faut la boucher avec une linge trempée dans l'oxicrat, lui en appliquer une autre sur la region des reins, et même un emplastre fait avec glaire d'oeufs, bol d'armenie, et oxicrat bien bat-

delayez ensemble que l'on appliquera sur la region des reins, ou un emplâtre de plastre dissous dans du vinaigre, comme j'ay pratiqué avec heureux succez. p. 13.

Il faut situer la femme la teste mediocrement basse, lui donner de la nourriture en petite quantité, du bouillon à boire par cuillerées seulement pendant ce temps-la, &c p. 14.

La perte de sang arrêtée, et la malade revenuë de sa foiblesse, 24 heures aprés on lui donnera un lavement fait de la decoction des feuilles malv. bismalv. viol. pariet: sem. lin: deux fois le jour, le matin et le soir, mais en petite quantité à la fois. Dans celui du matin on dissoudra 3 onces du miel de nenuphar, et dans celui de soir on bouillera une poignée de son de froment, mais point de miel. ib.

S'il y a grandes douleurs dans le ventre, ajoutez au lavement de soir une once d'huile d'amandes douces ou d'huile d'olive. Le petit lait peut être employé au lieu de decoction, et il profite ordinairement d'avantage. ib.

Si le ventre est tendu, et que cela cause de grandes douleurs, il faut faire des fomentations emollientes et carminatives avec tol. malv. bismalv. viol. pariet. sem: lin: absinth: matric: am: om: mercurial. et melil. cuites dans l'eau, et appliquez les chaudement sur le bas ventre, en les changeant de moment en moment, de crainte qu'elles ne se refroidissent. p. 15.

Si les vuidanges s'arrêtent aprés l'accouchement, et que les vapeurs qui s'en elevent causent des douleurs de teste, il faut faire des injections de la decoction d'une poignée d'orge, armoisse, matricaire, absinthe, et melilot, plusieurs fois le jour, ou [illegible] guer la malade &c ib. on peut y ajouter aristol. rot: ʒij sauh: ʒij p. 17. S'il y a crainte de quelque pourriture.

Si le travail a esté difficile, ou si la femme a esté écorchée par la sortie de l'Enfant, on peut se servir de la decoction ~~de~~ d'orge et de cerfeuil; et quand elle ne vuidera plus de sang, on y ajoutera une ou deux racines consol. maj: pour eluver les [illegible] en y coulant mel. ros: ʒij ad lib. j. decocti. p. 16. Chap. 2.

Portal: à Paris 1685.

Avant que d'introduire la main dans la matrice pour accoucher une femme, il faut toujours graisser les doits et la main de beurre frais, de l'huile d'amandes ou d'olive, ou quelque semblab[le] ~~[illegible]~~ qui n'ait rien d'odoriferant. p. 3, 40.

Dans les grandes pertes de sang par la matrice il faut toujours accoucher les femmes. p. 38 &c. et dans ce cas-la, il faut romper les membranes avec les doits. ib.

Les femmes grosses qui n'ont pas eu la petite verole, doivent l'eviter comme la peste. p. 42.

Dans tous les accouchemens difficiles c'est une bonne methode de passer sous les fesses de la femme une nappe en quatre doubles, afin de la tenir suspenduë dans l'air par deux assistans, une à chaque costé pour tenir les bouts de la nappe, et dans ce moment il faut tirer l'enfant &c p. 50, 51.

Chap. 2.

1. S'il arrive que les ordinaires retardent à une femme deux mois et demi ou environ, et qu'il survienne perte de sang avec des douleurs, il faut avoir patience, et en bien esperer, d'autant que ce pourra être un faux germe qui vient ordinairement dans ce temps-là; et quand le sang s'arrête, c'est un signe que le germe est separé. Le germe sort souvent en rendant un lavement, sans beaucoup incommoder la femme. Mais si la perte de sang etoit considerable, il faudroit saigner la malade au bras. p. 16 v. chap. 1. §§. 6, 7. et chap. 2. §§.

2. Si le germe se corrompe et donne une grande puanteur, v. l'Injection ch. 1. §§. 9. p. 17.

3. Si dans le 3, 4, ou 5me mois il arrive une perte de sang, et l'Enfant sort, si l'arriere-faix ne vient pas en même temps, il ne faut pas s'en mettre en peine, quoy qu'il soit plus gros que l'enfant, car il ne s'y corrompe pas si facilement que s'il etoit dehors; et il arrive quelquefois qu'il ne sort que le 2, 3, ou 4me jour, et même le 6me et bien plus tard. Il se vuide souvent en rendant un lavement. p. 18.

4. Si la perte de sang ~~dans ces mois-là~~ est si grande, que la vie soit en danger, en cas que la grossesse soit avancée, et qu'il y ait de la disposition au travail (v. les signes chap. 5. §§. 5.) il faut s'appliquer à l'accouchement, qui est l'unique remede pour sauver la mere et l'Enfant. p. 19. pour cela il faut graisser les mains (chap. 1. §§. 1.) et les introduire jusqu'à l'orifice interne, qui s'il se trouve mollet et delié, on peut travailler; mais s'il est epais et dure, il ne faut pas faire l'operation, etc. — Il faut dechirer les membranes avec les ongles, et s'il l'enfant est en vie, il faut le tirer par les pieds, et s'il est mort, par les pieds aussi ou bien par le crochet fixé dans la tête, et si la tête est trop grosse il faut faire une ouverture dans la suture coronale et la tirer par morceaux sans blesser la vessie, le col, la matrice ou la vagine, etc. p. 19, et seq.

s'il l'Enfant etant mort il survenoit pourriture, et que la mortification fut considerable, comme elle est d'ordinaire, il faut frotter bien les parties mortifiées de l'eau marine, ou l'eau de sel; si cela ne suffit prenez une pinte de bon vin blanc dans laquelle on fera bouillir aristol. rot: in lamellas concisæ ℥ij ad consumptionem tertiæ, et après ajoutez de sucre. De cette decoction on seringuera la femme 4 ou 5 fois le jour, et autant la nuit. p. 25. bath, foment.

Il arrive souvent que ces femmes ont un flux de ventre accompagné de douleurs et de fievre, par les violences qu'elles ont souffertes. Dans ce cas on donne des lavemens d'une decoction absinth: chamæm: matric: coriand: melil: āā mj. ou d'une decoction emolliente et rafraichissante malv. bismalv: viol. senec: capil; papav: alb: absq. melle, ou serum lact. solo absq. melle. vel Dec. furfur: cum vitell. ov. vel Dec. seu jus capitis ovilli cocti avec plantag: verbasci, et capitibus papav. albi.

chapitre 3.

Il faut toujours tirer l'arriere-faix avec douceur, de crainte que le fond de la matrice ne sort pas avec le placenta auquel elle est adherent. p. 28.
s'il reste quelque portion de memorant dans la matrice il ne faut point s'en etonner, pourvû que la femme vuide, et que cette portion ne bouche point le passage des vuidanges; mais si elle le bouche il faut tacher dans le fond de la matrice et la tirer: si on ne veut pas la mener ou tirer, il faut donner des lavemens reiterés de decoction malv. bismalv. sem: lin. pariet. lacum: sylv. est fuet, āā mj bulliant in s.q. aq. Decoct: ℔j add. mel. mercur: ℥iij. ol. oliv: ℥ij. catholici duplicis ℥j. Rhab: f. clysma. Et in jusculis succum aurantij, vc p. 30.

chap. 4.
Quand le cul de l'Enfant se presente l'accouchement est long, et neanmoins il est presque aussi facile que le naturel. l'Enfant vient alors tout plié en double, les cuisses couchées sur le ventre, et par les efforts de la femme il se fait une ouverture considerable, par laquelle la tête n'a pas de peine à passer. L'on tire l'enfant par les pieds lorsqu'ils sont separez, et ensuite on tire les epaules et la tête. p. 31.

chap. 5. il faut la repousser. si le bras est descendu hors de l'orifice la main se presente il faut l'envelopper d'un linge t[...] dans du vin chaud, et ap[...] ensuite tirer les pieds et tirer l'enfant par eux. p. 32. cordon sortant mettez [...] linge dans vin chaud. 34

pour [...] accouchées [...]. Por[...]

℞ ol. amygd. d. ℥j. syr: capil. ℥ij. succ. trium aurantiorum [...] cibo per 2 horas post ejus assumptionem.

℞ Dec. Lactuc: malv. bismalv. pariet. furfuris, viol: viol: portul: āā [...] mollis pennerh: ℥iij. ol. nuc. [...] absq. igne ℥j. [...] vandus seminibus vel bis de die ut vitis [...] ib. add: [...]

est Empl. ad expellenda Lochia per Mons[...] oblatu Reginæ nostræ ab eadem Domina.

℞ Cerus. ℥viij. Minij ℔j. sapon. Genoue. ℥x. ol. oliv. ℔ij M f. [...]
convenit Gravidis 8 dies ante et totidem post partum. Imponatur [...] Latitudo sit palmaris. puerpera continuet se cubitus. Renovetur [...] opus. Portal p. 360, 361.

In fluxu sanguinis ante partum secetur vena. ib. 362. Etiam Pourpier est d'une grande vertu pour les pertes du sang, pris par la bouche et en lavemens. par la bouche il en faut prendre le suc; c'est à dire, du pourpier [...] les piler, partiés [...], et passer à travers un linge un peu [...] etant epuré, on donner à la malade une verre avec un [...] et en boire 3 fois le jour, six onces à chaque fois, et même la nuit. Etiam a regione renum, et pudendis ægrotæ exterius, convenit applicari [...] lapido madefacta, seu [...] facto ex aceto [...] Modus componendi ψ ib. 363.

Après l'Enfantement il faut mettre la tête de l'Accouchée basse, et une [...] roulée entre et dessous les deux genoux. ib. p. 75. Et quelquefois des bandages circulaires à l'entour du Corps et du ventre de l'Accouchée, avec des compresses sur la region de la matrice [...] pour contenir et rechauffer les parties, et aider à [...] des vuidanges. ib.

ad Expellenda Lochia,

Est etiam aliquando vapor Dec. hord. et cherophyllij p. post Lochia, ad partes roborandas

Item succ. quadr. aurant: acid: in [...] p.

est vapor aq. [...] Myrt.

in exitu qui ~~[illegible]~~ debendi urgendi, faltem membrana rumpenda, si
eximenda placenta, et demum infans per pedes comprimendus.
Si Lochia rubra (Flooding) instante debito partus tempore acciderint
et sint copiosa, ruptis membranis, eximendus est infans; si mo-
derata sint, debitum parturitionis tempus expectandum. Si Convulsio
acciderit, statim obstetricanda mulier, uterusque modice valde dila-
tandus, si non facile aperitur, vim. Vide s. in brachio vel pede et si
a repletione oriatur stimulat. Clysmata. emoll: et: et aquen-
gia, fomentationes, etc. et rumpendas membranis, foetus per pedes
extrahendus, nisi Caput iamiam se obtulerit.
Si foetus sit mortuus extrahendus est per pedes si possibile, vel hamulis
capiti infixis, vel contorsione brachii aut pedis si praesentaverint
se. Nota. abstinendum ab instrumentis quantum possibile, ob
calumnias adstantium et obstetricum.
Mola ab utero separanda manu (ut dictum de secundina) abutero,
et extrahenda vel integra, vel partitim cum prius dissecta fuerit.
ad conceptum: talia vid B. 208.
Colica uterina aliquando partum, ad eminentem simulans, et dissipatur pannis calidis
post partum, calefacientibus, et clysteres, quae partes vero promptius, et dolores
Ov. recens: alb: et vitell. no ij. conquassantur et agitantur super prunas
aut cineres calidos ad consistentiam debitam, et applicantur calide per
spatium 3 aut 4 horarum, et renovetur si opus sit. Deinde fiat Dec. ex
herbis, sem: lini, chamom: alth: et fol: viol. ad partes fomen-
tandas, et purificandas, [illegible] ... pro spatio 5 vel 6 dierum. Abdomen
non fasciandum ante 15 diem. [illegible] ... Si lac nimis copiosum in mammis
sit, imbricentur ol. ros: cum aceto, comprimantur eodem imbutis ij ap-
plicentur vid cal. 210. post purificationes finitas uterus corroboran-
dus Dec: ros: provinc: et rad: et fol: plant. in aq. chalyb: deinde
potio astring: sequens utenda, Rx Cort. granat. Nuc. cupress: aa ʒiß
ter: sigill: ʒß ros: provinc. ℥j. Balaust. ʒij. infunde per noctem
in claretti et aq: chalyb: aa ℔j et ℥iv. coq: ad medias et ultra,
Cola.
In infantibus prae et obstetr: prospiciendum ne pars aliqua luxetur, et
ut ora exitus perforentur ad excrementorum evacuationem, quae si non
proveniant exhibendum syr: ros: vel viol. vel cichor:

Effluxus intra 8 dies, expulsio intra finem 2i mensis, Abortus ante
7 mensem, partus post hoc tempus dicitur. — Menses adstant aliquando ante menstr:
tionem, aliquando a conceptione et ab aliquo non per 3 aut 7 [illegible]

Regimen praegnantium. 4° aug.

si pica laborent, aut quae non conveniunt vehementius appetant, in-
dulgenda sunt, si saltem moderate id fiat. Nimium vigiliae et aborti
praegnantis ad sang: purificandum. Oia salsa, condita cum pip: Z Z et
vitanda. Oia salina, acria, amara, aperitiva et Zimbella fugienda,
menses enim movent et abortum faciliter. Si ventris constitutio ad-
da laborent, alvus servetur laxa. Mariti amplexus fugienda per
4 aut 5 dies post conceptionem. Caveant cursus, onera, elevatio
brachiorum in altum. Exactus quibus evitatio quae motus. Caveat
a mariti amplexibus per duos menses ante partum. Si alvus adstri-
cta sit: poma cocta, pruna cocta, ficus recentes, mora, mel cum pa-
ne, panis secalinus, ius vitulinum, etc. ut et Clysma aq. calidae, Dec
quantitas vel aliud lenitiva. Cass: ʒß aut ius vitul: cum herbis emoll. et
emoll: opt. ℥j. aut clyster ex Dec: Malv: Alth: impreg. et som.
Anis: cum sacch: rubr: ℥ij, et ol. pauca. Pationes absint. Ca-
veant ligaturas aut vestes arctas; item Balnea ad uterus apte-
riatur. Vide s. Si requiratur, in stilum potest quovis fere tempore;
sed parcatur evacuatio. [Vomitus si durat ultra 4 mensem, co-
hibendus est, et in hunc finem edat parce et saepius, edat sibi gra-
ta et paulatim acida (astringentia enim sunt et corrobor:) et stoma-
chica et fermentia, ut cinnam. aq. vit, vinum hisp: et nutrientia
ut ova recent: carnes tenerae etc; saccharata fugienda. In hoc
etiam casu purg: mitis (vide s. praemissa) instituatur ex Rx ros.
℥j Rhab: ʒß syr: cich: ℥j. vel ex Man: cass: tamar: et sim.
lenitivis cum Rhab: et syr: cich: composito. Si haec omnia frustra
fiant, non relinquatur. Ab frigidis cum vomentibus, sit minimus [illegible]
bene vestiant, et agni pellem pectori et stomacho imponant.]
(p. 216.) Caveat ab aq: calidis vulgo nuncupatis. [illegible] sit cere-
vis. luculenta defaecata.

Si pulmones infantis aq: [illegible] natant, signum est eum vitam prædit[um] fuisse. methodo [illegible] infanticida[rum]. —— Obstetrices hanc Regulam experientiâ comprobatam tanquam certam ponunt, viz. Infantem in utero vitam habuisse, si fontanellæ membrana, quæ a vitali cerebri motu et spiritu extenta, flaccida et corrugata reperiatur. Bibl. 275.

N.B. Si natus infans debilis fuerit, percutiantur nates et plantæ pedum. Ori autem indatur [illegible] [illegible], quod est præsens remedium excitans. Mayern. 419.

Operatio Cæsarea instituitur in puerperis vivis et ob magnitudinem infantis, et ob fœtum jacentem extra uterum in cavo abdominis, et ob [illegible] uteri [illegible] musc. abdominis, et ob angustiam ossis pelvis ubi infans egredi nequeat. Vaug: | Mauriceau [illegible] hanc operationem non [illegible] [illegible] [illegible] morte matris. et ad [illegible].

[illegible] Clysma et [illegible] ad evacuandum [illegible], et [illegible]: [illegible]
[illegible] oleorum, [illegible]: [illegible], Butyri recentis
[illegible] [illegible] [illegible] et axungiis, [illegible] et [illegible] ut
et fomentationibus emollientibus [illegible].
Sufflet in manus, halitu [illegible], nares occludat, vomitus quasi excitandi digitum in guttur mittat, conata edat quasi [illegible] [illegible] [illegible] facienda ut exeat [illegible] secundina. et similiter premendo [illegible] ventre [illegible] dorsum. attendendum [illegible] [illegible] [illegible] matricis. Si ambi[illegible] [illegible] introducenda manus ad separationem secundinæ ab utero. Si ita [illegible], fiant injectiones ex Dec. Malv. Alth. [illegible] [illegible] [illegible], et add: ol. amygd. d. Lil. aut butyr: recent. ad suppurandum et auferendum. Clysmata etiam [illegible]. — V.S. in brachio et pede, si requiratur, ad [illegible]: præveniendam. Si adsit [illegible]: Restaurantia vel jus[cu]la ex carne vitul. et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad caput separatum educendum aptatur hamo, aut panno, [illegible] [illegible] et tres digitos lato, per longitudinem duplicato capiteque sinu seu plicâ prehendatur et educatur, et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] evacuandum, deinde facile eximatur.

Si infantis venter sit hydropicus, vel [illegible] ita [illegible], perforandus est in latere dextro [illegible]. Si caput perforantur in fontanella. Si infans aut aliqua ejus partes in utero [illegible] [illegible], ob [illegible] [illegible], [illegible] puerpera elevetur, capiteque declive sit. Si infantis nates ita [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] nequeat, eximendus est eo modo quo se offert.
Antequam secundina extrahatur, nisi sponte veniat, explorandum an sit alter infans in utero, qui si sit educendus est antequam auferatur secundina. Membranæ [illegible] infantis si non franguntur, frangendæ sunt digitis vel [illegible] [illegible] [illegible] statim a partu [illegible].
Vasa umbil: si [illegible] [illegible], [illegible] ponenda caput infantis; si hoc fieri non potest, extrahendus infans per pedes, nisi caput [illegible] [illegible] in exitu se præsentarit.
Si placenta prius præsentarit (quod mollitie, [illegible] [illegible], [illegible], syncope [illegible] cognoscitur) puerpera quam primum obstetricanda (delivered) placenta [illegible], membranæ [illegible] rumpendæ, [illegible] per pedes statim eximendus. Si placenta [illegible] sit

Mauriceau p. 146. et seq. Colica Uterina aliquando simulat parturientis dolores, et dissipatur pannis calidis ventri applicatis, et clyst. 1, vel 2. quibus veri labores promoventur. Alij dolores oriuntur dum anni ab emotione quadam cauta alvi fluxu, qui facillime dignoscuntur per sedes sequentes, se-quentes. Signa Laboris naturalis praecedentia sunt ventris hactenus alte jacentis subsidentia ita ut ambulationem liberam impediat, humoresque viscosi ab utero fluunt. — Signa Laborem aut parturitionem praesentem comitantia sunt dolores magni circa regionem lumborum et venae per intervalla venientes; fauces rubicunda et inflammata; pudenda tumefiunt; saepe vomitus supervenit, et ordinario signum est parturitionis statim futurae; tremor universalis praesertim in femoribus et cruribus, ex calore nimio; humores ab utero fluentes sanguine miscentur, quod infallibile est signum appropinquari parturitionem, praesertim si adsint praecedentia; orificium interi-us dilatatur, et membranae se praesentant, quibus ruptis per naturam vel operatorem, effunditur Lochia alba, infantisque caput se tactui offert. Quorum omnia vel pars major, concurrentia

A natis distinguenda sunt ruptio.

quocunque in praegnationis tempore, partus subito futurus confirmant certumque reddunt. St.
iv. p. 205. Ut puerperae accedit operator explorandus an ea ferre valeat operationem, sed opi=
nari licet pulsu, an fortis aut debilis, inaequalis & intermittens; facie, et praecipue oculis, an
dejecti sunt; loquela submissa (faint), an sit; extrema an frigida; an frequenter syncopen
patiatur ex sudoribus frigidis; an convulsiones ex sensus abolitione, haec enim saltem est ab opera=
tione desistendum, ne calumniis chirurgus; sed si aliqua sit spes, tentanda est, praemonitis
tamen marito, propinquis, et adstantibus, de operationis difficultate. — puerpera in ~~lecto~~
lecto decumbat, femoribus quam longe separatis, et calcaneis versus nates versis,
capite et thorace paululum elevatis ad respirationem facilitandam. Sed si aliquid
extrudendum sit, nates elevari debent, caputque et thorax sint declives.
78. Ut dolores veri appareant exhibeantur clysma forte &c. in [illegible] si sit plethorica, vestes sint laxae, [illegible] —
torsia, ova recent: vinum vetus ex pane tosto exhibeantur. et abstineatur a nutrimento solido.

Rabarbarum primò laxat, deinde astringit; ... pro vermibus ... pro Infantibus.

... Sycomoli ... durant. — ... vi ... lavent cavitates Sp. vini, Aq: vitae, aceto, & sim. ... loculo siue ex ligno, picetur optime interius; si ex plumbo, ferruminetur. Contineatur corporis cutis et caro filis sericis & vittis tenuibus, et inungatur corpus Bals: parav:

pulvis ad implendas cavitates Cadaveris.

℞ Acori, Ireos, Aristol: Saracenicae, Rhodij, Xylobalsami, Gentianae, Zedoariae, Bacc: Lauri ZZ, Cardam: āā ℔iij. Myrrhae, aloes, āā ℔ XV. fol: absynth: Centaur: Imperat: Rorism: piperis, Cinam: Cariophyll: N:M: Labdani, āā ℔v. redigantur omnia in Xem, et humectato Sp: vini et incorporetur.

Aliter pulvis ad eundem usum

℞ Myrrhae, aloes āā ℔ XV. Benzoini, Tacamahacae, gr Guaj: Labdani āā ℔v. Rad: Ireos, Gentian: ZZ: Zedoar: Aristol: rotundae, Bacc: Lauri, Acori, Asphalti, Cariophi: Cinam: āā ℔iij. M. f. pulvis.

Aliud Balthas: Timaei.

℞ aloes ℔v. Myrr: opt: ℔iv. Hermodact: Styracis calamitae, Cariophi: Rorism: siccati, āā ℔ij. Cinam: opt: Thuris āā ℔j. Bacc: Lauri siccat: Ros: rubrar: āā ℔ß fiat Xis crassa.

Aliud ad eundem.

℞ absynth: abrot: maris, Lavend: Rorism: Laurifolia, āā M vj. Salviae, Majoran: Ocymi, Origani, Thymi, Saturejae, Hyssopi, Ch: Chamaedr: āā Miij. rad: Ireos pulveris: Sal: āā ℔IV. lig: Rhodij, ℔iij. ros: rub: aloes, Myrr thur: Styrac: Benzoini āā ℔j. lig: Junip: Sassafr: āā ℔ß. Cal: cal: arom: Angelicae, Cort: Aurant: et Citron: Cypri, Cinam: Cariophi: āā ℔j. Santalli flavi, Lig: aloes, āā ℔ß. M. f. Xis. humectetur ol: Spicae ℔ß.

plura de Pollinctura in Chirurgia Gul: Salmon: et Guybertus medicin charitable.

Gluten Paracelsi fit ex Ranis sub Luna radijs in: tentissimo frigore resolutis. Barneri phil: chym: p. 5. Helmontius.

Burgans

℞ Tamarind: ℥j. coq. in aq. ℥ ix ad ℥ vi. Infund. decoct. ... crem. tart. ʒß. stent in digestione per noctem. colat. adde syr: ... e Rheo vel syr. ros. pallid. ʒß vel syr: de Rhamno ℥j. vel in colat. calente dissolvi potest mannae ʒß. et tum add. syrup.

Pin & Web in the Eye. or Piece red flesh with white speck in the midle.

℞ Hemlock leaves, 2. handfulls, & 1 handfull salt, beat them well in a mortar, & apply it as a Cataplasm to both Wrists for 3, 4, 5, or 6. Days & nights, renewing the application.

Mr Geekie to Mrs Hinde.

Periodical Pain of the Forehead over the Eyebrows, as Matthew's was.

℞ an Onion, scoop out the Heart of it, & fill the Hole full of Pepper, then put it into brown Paper wetted, & roast it under the Embers. Then pound all together in a mortar, & apply part of it warm to the place affected a little before the time of the Return of the Pain. Renew the application till the Returns of the Pain quite cease. Mr Geekie to a servant. Mrs Hinde.

Secretum [illegible]issimum ad semen multiplicandum ac virilitatem resuscitandam atque confortandam Henrici IV. Regis Galliarum Potentissimi.

℞ Nuc. pinear.
 pistaciar. ā ℥ij
Cerebr. duor. passer.
 vel
Schinci marin. ℥ß.
Rad. satyrion. recent. ʒIX.
Sacch. cand. alb. ℥ij
Testicul. Capr. prius assator. N.º ij.

Omnia invicem contusa coque cum lacte vaccino, et per setaceum transmitte: quod primâ vice non transmissum erit, iterum coque, atque hinc instar cassiæ exprime, idque repete donec omnia sint transmissa, tum adde

Sem. Eruc.
 Napi
 Capar.
Rad. Galang.
 Zinzib.
Cinam. elect.
Cardamom: āā ℈ij.
Ambr. gris. sacharo terend. ℈ß.
Sacch. albiss. ℔ß.

Cum aq. meliss. formentur morselli, quorum dosis erit ʒij vel ʒiij duabus tribusve ante coitum horis fœminis atque viris utile.

Accepi Bruxellis septembris 9no. 1717. a D. D.
Ac[illegible]

> ℞ Ol. junip. sal. ✱ci injice Bocell.i super latere cocto tepido, recipiatur calor ejus in corpus Rheumaticum ut eliciatur sudor. opt.

Pars 2a. 2) Annotata ad Chirurgiam ex Dictatis D. de Lonca(?)

Incisiones: In Authores libri dicent de duobus librariis(?) sed D. Glenc. contra consol. et suam sententiam experientia confirmavit, in Musc. Mastoideo, ... tibiae posteriore ... ...

Pulv: exfolianti sunt pulv. Myrr. Aloë, Ireos, ... Euphorbij. Hic agit de Exfolia(tione) ossis quousque à dicenda ponderat et indecit ... poro oculusis circulatio sang. ibi ... Hic olim agit de opera(tio)ne ... dictorum pulv: qui cum calidi sint poros restrant, circumcis(io)nem ... et sic exfolia(tio)nem destinant, et eam tenuem reddunt. — ... tendinibus et ligamentis inimica, sive enim poros nimis sua crassitie occludendo, circulat(ionem) impediunt. — Instrumentis raspatoris dictis ... venit ad incarna(tio)nem super os facilitandam ex ... periosteum ... os enim non ... carnis ... Bello ...

P. 2. c. 1. 3. ... Bod: (217)

In omni facie, vulnerum suturae in usu sunt et etiam suturae sicca ut vitet cicatricem. Sed Nott. relinquendas esse orificiis in intima vulneris parte ad evacua(tio)nem — Empl. vero sutura sicca fit ex Empl. stiptico et pauco ... gradu aut polius ... P. 2. c. 1. ... fit ex ... et Resina. ... fit ex glutine ... et cum fimbriis ... pluviaculis super nodos. ... postea de suturis ...

P. 2. c. 2. ... Tumores et Ulcera quo majore inflamma(tio)ne comitantur eo molliq(uius), et e contra, ut experientia docet in variolis. Quo prominentiora eo molliq(uius), et e contra, ... enim est ulcera non esse adeo profunda, ut et etiam ... magnas esse, quod valeant ... à ... molis ad corporis habitum et superficiem pellere.

P. 3. c. 22. ... Incurvatio cubiti, genu, etc. accidit à duplici causa; 1°. à musculorum retractione et molli dissolutione, ut accidit in Ulceribus et fracturis ut et Fistulae ... femoris, tibiae, cubiti, humeri, etc. et hae facile auferuntur emollientibus, et flexionis, etc. — 2°. ab Ankylosi et raro, in quibus etiam ... flexio et extensio in usu veniunt.

ib: operatio ... ad tibiam incurvatam (vulgò Bow-leg) restituendam ... da sunt ea quae in Praxi de Rachitide traduntur, ut et instrumentis ... una extremitas inter calces ... altera vero extendit usque ad genu, et in longitudine ligaturis ... et quatuor ex corio bovino annectitur tibiae; interim interna ... non vero externa, pars tibiae Ung. ... Martiato, et ... etc in Praxi traditis, ... anni ...

ib. c. 23. ... Causticum potentiale optimum est ad aperiendum Tumores et Abscessus, exceptis ijs in facie, ob cicatricem deformem ... ... quo tumoris fundus molliq(uius) perspici potest, et modò facilius applicari; nec ... usu metuenda est Gangraena. — Incisiones et tumores apertiones, ... Authores ... dicunt ... duobus libris; sed D. Glenc. incisionem transversalem in casu necessitatis admittit, ... neque hinc ... neque inflam. et convulsionis molis ... partis abolitio (si Nervi trunco non ...) ... major quam in longitudinali; neque dolor major, ut suam sententiam Experientia confirmavit, sectione transvers. musc. externorum tibiae, cujusdam ... tibiae carie laborantis, et musc. Sterno-mastoidei fere integra. Immò sectione transvers. molis conspicitur ulceris fundus, quam longitudinali. Agnoscit vero curam tardiorem et cicatricem deformem, ob magnam incarnatiomem, ideò hanc dissuadet in facie; agnoscit etiam ... sectionis periculum, sed non in prima ... ... Nott. ... esse ... sectionis in partibus corporis externis, ut in parte externa brachij, cubiti, femoris, tibiae, etc in interna enim pariter ... vasa. ... Musc. transvers. ... sectio ... ante sectionem, ejus enim ... cicatrix est instar nodi in ... membri ...

... in omnibus Incisionibus et ... ut amputa(tio)ne membri, ... semper manus tenenda super pluviaculas loco amputato impositas ... spatio duarum, trium, etc horarum, ... si ... fabricet ... abdomen et thoracem, ... pluviacolarum ... in expira(tio)ne.

Ergo causa ... valore ... nata, ...

Vulnera capitis.

... partes sang. ... Balsa(mi) ... et ... methodus ... est os ... exponere ... Manus)

... polis ... ex ... ut ... Ulcera ... Tumor.

2da.

... à ... Ung: ...

... potentiale ex Lixivio saponis in Rever. 126, 27.

Vulnera sagittar.

P. 3. c. 23. 2ª opera. In vulneribus à sagittis, remedium opt. est oleum hyperici cum terebint. ven: et sp. vini mistis, quibus addi possunt pulv. Myrr. aloes. et in genere omnibus vulneribus à ferro aeruginoso prodest. Si sagitta sit alata non extrahenda per idem foramen per quod ingressa est, sed convenientissimo loco, et ubi cum minore noxâ fieri potest, perbrudenda et eximenda.

Trepanum.

P. 1. l. 1. c. 1. §. 1, 2, 3, 4, 5. Quatuor sunt causæ trepanationis. 1. evacuatio sub cranio collecta. 2. Reductio seu planatio fragmins cranij. 3. Depressio cranij. 4. Evacuatio sang. extravasati ex contusionem, per concussionem cerebri, absque fracturâ. Hæc enim omnia D. matrem inflammant, delirium, soporem, etc. causant. — Depressio sine fissura à simplici cranij in pueris accidere potest absque fractura, curaque sic ratione capitis et a solita ad calidâ pollici agmine, modò deglubili et excoriati, per Empl. de Bolon. per casu quandoque aut gurgites molares in partem derectam, semel et plures in d. Non autem ita accidere potest in Adultis. — Aliquando etiam à casu per ictu, etc. fieri potest per tumefactio per depressio capitis tegumentorum absque ullâ fracturâ, etiam in Adultis; quo in casu si non manifeste detegatur aut inveniatur depressio per fissura ipsius cranij, tegumenta incidenda non sunt aut trepanatio instituenda, antequam in parte affectâ mollities appareat. (Ex enim incisio facienda ut puri detur exitus, et operatio perficienda, si opus sit) imò quamvis symptomata (p. 1. Chirurg. tradita) valde urgeant; sed patiens interim tractandus V.S. clysteribus, potu, epithemâ, Empl. de Bolon. etc. — Effluxus sang. per nares per aures in istâ depressione cranij, et ejusdem tegumentorum, aut in concussione tantum cerebri, opt. signum probabile enim est sang. in cerebro extravasatus ita effundi. — Trepanatio semper est in parte maxe declivi, ut pus facilius exeat. — Simplex punctura D. mat. aut cerebri pejus curatur quam sequendum dedolatio. — Exempla in sua praxi novi dedit curatorum, dedolatione cranij, aliquando D. Mat. imò aliquando ipsius cerebri substantiæ laborantis. — Incisio triangularis tantum fieri debet in fronte, ne cicatrix videatur, fictio à stigmate publico. Glone.

Si ex dura matre caro molliuscula et fungosa (cerebri fungus dicta) propullulat, ea quantocyus auferenda et absumenda, non acribus, non corrosivis medic., sed exsiccantibus, ut vocant, aspersione viz. pulv. abinthi, per pulv. Marchetti, ℞ schænanthi et flor. cum nardi, ana q. s. per ulatus terebinth. pulveris. per pulv. Jr. florent. aut aluminis calcin. per ulatus sp. vini aut tra aloes; et si larga sit, utendo compressis remediis spirituosis imbutis. In usu horum omnis caro debet pauleum comprimi. Nonnunquam vero fungus iste fauces sumit incrementum, ut necesse habeamus filo serico eundem arctius circa radicem tandiu ligare, donec suo nutritio destitutus emarcescat, tandemque decidat. (Quidam illud excindunt scalpello) Alias in principio exprimens ex laminâ aureâ per argenteâ ita apponitur duræ matri, ut carnis fungosi incrementum compressione istâ impediatur. Marck. 22. Clone 171. Charr. 232.

Si cerebri contus. ad pus aut sanie. mut. meninges habere; incidendam D. matrem sine non sine perire. Lancettâ tenui in limbo, ea istâ aufendica, ne adhaerentem præcipitant, contusionis. March. 24. Clone 271. Charr. 231. Dorth.

Sitt. Puncturæ in omnibus corporis partibus periculosiores sunt quam incisiones per fractura aut fissura; imò ad eas curandas oportet incisionem fieri, ut locus concitatus remediis applicari. Glone.

Vulnera substantiæ corticalis cerebri non semper mortalia sunt, in albedinem magis opportunis magnitudo remediorum appropriationem facilitat, et cerebris non vixeruntur succulenti; si tamen pendeant ad substantiam medull. continuo lethalia sunt. non solum quod principia nervorum. Adeunt, sed etiam quia ad substantiam eum pendeat non patiuntur absque magnorum ramorum deletione, qui in cerebri anfractibus latent, scilicet uno, unde fit hæmorrhagia magna nullam curam admittens. Charr. 219.

Margin notes:

Unctuosa, et ol. per expressi, cranio, ossibus aliis, nervis, tendinibus, et Ligamentis, noxia. per sp. præcedd.

Si vuln. cranij penetrant, hæmorrhagia statim sistenda pulv. fur. alb. ov. et bolo armeno. Vaug. 16.

In vulneribus cranij à globulis trepanatio statim est ad evacuationem sang. a contusione cerebri. Bibl. 520 Dion.

× Crassitudo cerebri 220.

Symptomata enim spectata et sæpius sunt vicissim. Bonis succubatio nis.

Apertionem cranij, post aperturam satis largam dos remediis applicationem faciliorum. per Charr. 219 et 222.

In defectu cranij, ablatis ossis vulneri foraminibus, scilicet, ictibus, per doris, sed latitudinem partis detectæ, cum ponderosa pyramide trepani, et tegatur stuppâ sp. vini imbutâ; caro tunc exsiccatur, emplastri de Bolon; et cum cerebri. In discesso cranij dividatur tempora, sp. vini mundi et in globe. Dionis 164.

... ... turion ... ... sequi ... praecoxia dosi ... 55.

Bagl. 172. Saepe fit pleuritis. Saepe moritur ex pleuritide, & peripneumonia. 56. Quo citius apparent sputa, eo citius pleuritis curatur. 57. In maligna lue vix sang: missionem omittere. 58. Pleuritidem quinque signa concomitantia comitantur, dolor vehem. lateris punctorius, spirandi difficultas, pulsus durus, tussis, &c. 59. Quanti deterrimi sunt purgantia in pleuritide, et pectoris morbis, tanti ex adverso utilitatis sunt diuretica; potissimum omnia ex terebinthino, millepedes praeparati, syr: de Althaea Fernelii, et herba vulgo dicta aperientes. In morbis praedictis diuretica ex acidis parata suspecta sunt; acidum enim pectori inimicum. Ideoque balsamum sulph: in phthisi et morbis pectoris rejicimus quia acido pollet urinoso, et auget tussim, quae eradicat phthisim. 60. Pleuritis lateralis ... sputis statim apparentibus in initio, ipsam abbreviat; si vero postea apparentibus ... producit. 61. Qui ... aeri in initio caloris ... exponunt ... pleuritide corripiuntur. ... 62. Remedia specifica ... sunt quae sang. ... subtilitant, et attenuant, ut flores equin. aut Mullus infus. in vino albo; sanguis ... hirci maris pulv. ... volat. Italia ... Urtica in vino ... ex saccharo, mirabile est; bibitur ... et residuum lateri per modum cataplasmatis applicatur. 63. ... aq. & potus alii ... potissimi

Margin: 182 · Ett. 2. 81. 82. · Walkin · Hipp. · Charr: 147. 149.

Acta philos: mensis Oct: 1670.

Francisci Josephi Burrhi Epistolae duae ad Tho: Bartholinum. Hafniae 1669. 4°.

In posteriore agit de modo curandi diversos morbos oculorum, et specialiter de quibusdam prodigiosis, quos ipse curaverit. Ubi affirmat, quod dicta ... oculi diversorum animalium, et expressis humoribus, vel ipso Crystallino, illis ... vitia restituerit; et quod oculi istarum avium in quibus hoc experimentum institueret apparerent meliores et viridiores, quam ante; et quod hanc operationem exercuerit in pluribus hominibus tam felici cum successu, ut in illorum oculis nec minima vestigia cicatricis reliquerit. Post hanc relationem describit modum perficiendi hanc operationem, addens cautiones in ea observandas, et simul remedia; quod praecipue consistit in quadam aqua Celendinae, et phlegmate vitrioli Martis.

Si quis suspicaverit mulierem Gonorrhaea virulenta & lue venerea laborare et certiorem se reddere velit, Limonis in manu quam optime comprimat et perstringat, tum manum pudendo mulieris admoveat, et si faciem stringat et corruget foemina, certo scies eam morbo dicto laborare; alias non. Author erat ~~[illegible]~~

Experimentum de Injectione in ... ... Rud. ... in Keils anat.

De vasis ... ab

Perituri sc. hominesq. subito mori ex percussis subtilia medulla spinalis dorsi cervicis aut omnino est, quoniam nervi spiritus ad functiones partis vitalis et naturalis suppeditantes et eo immediate originem ducunt. Charr. 215. 27. 75. Eximiis confirmatur hoc, ut et functionem medullae spinalis Ethalo esse. Perrault Ess. vol. 3. p. 154. &c.

Ib. 3. c. 3. operat. 1. Cataractae et suffusionis generationem et formationem praecedit vehemens dolor capitis, aliquando gravativus, aliquando pungitivus, praesertim in fronte, qui post cataractam formatam cessat. Operatio non instituenda 1. si aegrotus adhuc dolore capitis laborat; signum enim guttam serenam ei supervenisse. 2. ubi febricitat, aut in aliis morbis notabilem cacochymiam incidit. 3. Ubi cataracta ad nigredinem aut flavedinem vergit, & plumbei coloris conspicitur. 4. Ubi facta palpebrarum frictione iris neque dilatatur, neque contrahitur, sed in suo situ permanet immobilis. 5. Ubi magis profunde sita est, humore aqueo et iride bene constitutis; tunc enim est incuratu humoris crystallini. 6. Si cataracta sit instar crustae, friabilis enim tunc est, et humorem aq. turbando suffusionem causabit. 7. Si cornea non sit glabra, & cataracta in eo esse appareat, tunc enim corrumpitur et vitiatur cornea. Nott. 1. Plerique seu pannus oculorum non esse cataractam. 2. Si occaecatio in pupilla non fit a cataracta, at a gutta serena, cui tamen supervenit suffusio, hic cataracta, qua sublata non restituitur visus. 3. Si tantum apparet suffusio in oculo, patiens tamen caecus, gutta serena laborat suffusione comitata. 4. Cataractas caeruleas, virides, ut et eas colorem margaritarum aut ferri expoliti referentes curari posse operatione chirurgica. Cataracta nondum matura est 1. si apparent tantum instar nubis densae, tunc enim tantum suffusio est. 2. si patiens aliquid videat tantum instar nubis densae ... phialam aq. repletam transeuntes, percipiat, colores, seu si radios candelae, phialam aq. repletam transeuntes, percipiat, colores quodammodo adhuc distinguat. 3. si post factam palpebrarum frictionem, pupilla in partes divisa vel mobilis conspiciatur. Glone. Nuck. Haug. Charr.

Nott. Glone. oculus affectus operationis tempore speculo oculi recipit. | *Cataracta.* | *Signum enim est cataractam ad: haerere uveae aut retinam affici.*

Ib. 3. c. 3. oper. 4. Nott. cannulas omnes quas introducimus, ferri candens intra corpus, ut in fistula lacrym. operatae, linteo debere tegi, et alb. ov. inungi. | *Canula.*

Ib. c. 7. oper. 5ta. Gravidis aut nunquam aut rarissime dentes evellendi, praeprimis si dentis mobilitatem ... quod foetus ocaeiorum vitio aliquo exinde fuerit affectus. Nuck. — In dentis mobilitate blandiora astringentia antiscorb. mitia usurpanda, quale est illud Ettmulleri in mobilitate. ℞ Rad. Bistort. ℥ß Fl. ros. rub. ℥j Fl. Balaust. ʒv. alum. ust. ʒjß. M. cum q. s. sp. Cochl. &c. | *Dentis Extractio, Mobilitas & Dealbatio.* | *ψ Dion. Bibl.*

℞ ℞ Herb. Scord. sicc. pug. j. Myrr. opt. ℥ß alum. ust. gr. vi. coq. similiter in vini albi Gall. ℥iij. Colat. ℥ij adde Mellis alb. opt. ℥iij. sp. vini camph. ʒjß. sp. Cochl. ℥j. M. f. oris et gingivarum collutio. Haec mixtura in scorbuticis oris affectibus etiam prodest.

℞ ℞ Herb. salv. rorism. Fl. ros. rub. ā ā p. j. Myrr. opt. ʒij alum. ust. ʒj Caryoph. No. vi. coq. in vin. Gall. & aq. chalyb. ā ā ℥ijß. Colat. ℥iij adde Mel. ros. ℥vi. sp. cocal. ℥j. M. — Dentes Hippopotami optimi ad dentes artificiales conficiendos, diu enim albedinem retinent, ebur autem cito flavescit. Nuck. — Ad corroborandas gingivas, dentesque dealbandos, matronae quaedam Parisienses sequenti pulvere, ut Dodonaeus observat, utuntur. ℞ Ossis sepiae, Corall. Crem. Tart. Lapid. Prun. ā ā ℥ijß Bol. rub. pulv. ros. rub. ā ā ʒj. M. f. pulv. quo dentes quotidie fricentur. id. ib.

Ib. c. 14. oper. 2. Laryngotom. 2bus in casibus instituitur. 1. in angina vera, ubi musc. laryngis ita inflammantur ut rimula occludatur et respiratio denegatur. Hoc tamen malum saepe cedit V. S. potentibus et repetitis ad ℥xxx, XL, & L, prout vires requirit et aegri vires ferunt. 2. In vuln. quibusdam colli, ubi larynx a globulo, ense, et sim. laeditur, quorum inflammationes V. S. non cedunt, cujus instantiam in sua praxi nobis dedit, ideoque operatio necessario instituenda. Instantiam etiam nobis dedit mulieris apud Kinfans se novacula vulneraverat transversaliter ad laryngis fere discissionem cum magno hiatus qui a Mro G. Robertson curata fuit, instituta nempe sutura cum punctis separatis ultra annulos primos in utroque latere vulneris, relicto tamen foramine ad canulae introductionem. Singularis haec est instantia. Glone. Causae inflam. ordinario fiunt, & a vulnere, & a clamoribus magnis, & a sermonibus longis, potionibus violentis, aut humoris alteratione, et sim. Charr. vide. | *Laryngotom.*

Ib. c. 15. oper. 1. Si in incisione lateris multus sang. in cavitate thoracis effusus fuit, fiat injectio ex alb. ov. conquass. aq. plant. Bolo, &c. Postquam pus fluere coeperit fiat | *Empyema, et vuln. thoracis.*

Injectio

injectio dolorem ex Dec. aristol. rotund. Scord. Millep. Demum vero injectio incarnans ex Bals. Lucat. et oleo. – Cum vulnerantur capillaria vasa, sanari potest vulnus; cum autem vasorum truncus, immedicabile est. – Instantia militis in thorace vulnerati qui 2do aut 3tio post vulnus die, omisit singulis diebus per spatium trium aut quatuor dierum, ℥xv circiter aq. limpidae, et praeterea nihil; tandem vero vulnus omisit pus, crassum, et sanatus fuit. Glone.

Cancer. ib. c. 15. oper. 3tia. Si cancer non ulceratus, fiat Initio cutis crucialis, prehendatur cancer, separetur a cute et evellatur. Vaug. et Nuck et Charr. Curatio cancri nonulcerati tentari debet refrigerantibus, temperantibus, dissolventibus, paulatim repellentibus absque fermentatione excitante, et sunt aq. mori, aq. plant. aq. fragrar. aq. ranarum, lumbrici terrest. sal saturni, cremor lactis, catap. ex ... , sagmina seu lamellae vituli, catelli dissecti, etc. In cancro ulcerato ... dia opt. sal. alcal. ... mista astringentibus; hae enim partem suam ... corroborant, illa obtundunt et absorbent mucrones salis vitriolicorum, etc. medela acria et corrosiva malum incurabile reddunt. Charr. – Ut palliative curetur cancer occultus et ejusdem ulceratio impediatur, applicetur Catapl. cicutae recens tusae. omnes species Cichorei, Dec. solani, succi ... plantag. succ. ... , geran. robert. herniariae, ... etc. sunt propria in initio. Astaci fluviatiles in mortario plumbeo tusi, et eorum succus, excellens est. Spongia ... , aut urina distillata cancro occulto applicata, bona. ℞ Saturn. calcin. ℥j ol. ros. ℥ij Croc. ʒvj. Miscantur omnia in mortario cum pistillo plumbeo calido, et applicentur. Amalgama ☿ cum saturno bonum. Purgetur patiens helleboro nig. et ☿ dulci. Sumatur interne a ℈j ad ʒß pulv. Limacum (Elopertes) cum ... cancri. Cum autem cancer ulceratur feliciter usurpatur sp. fuliginis; et cancrorum marinorum calide in ulcus immissum, bonum est remedium. Glore. – Inter medela externa hactenus nulla vidi quae cancerum curarent, sed illa ex solano, ranis, succo cancr. plumbo, et sim. facinit parata; nec magnarum est virium compl. ... . Ad cancrum ulceratum tamen medela occurrunt, quae malum retardare, illiusque progressum ad multos saepe annos inhibere valent. Si tota mamilla tumore non est occupata, mutilo forte integram extirpare, sed partem solummodo affectam auferre satis foret, quo facto medela stiptica ... admoveantur. Nuck. Omnes conveniunt in eo quod suppurantia, maturantia et aperientia non usurpanda sunt, ut ... in Charr. Omnes etiam consentiunt quod ubi tumor cancrosus ita se extendit, ut glandulae axillares male afficiantur, et costis adhaerent, nunquam extirpatio est instituenda. Omnes etiam loquuntur de virtute Limacum magnarum rubicundarum terrestrium absque testis, quod sc. cancro ulcerato admotae frequenter illud sanant.

Gastroraph. ib. c. 16. oper. 3tia. Si quis ita vulneratus in abdomine, ut portio intestini exstraheretur, mo... itus, nisi Chirurgus contineat intestinum peritoneo et tegumentis, ita ut ad ... eorum disponatur, et speciem ani formet, ad excrementa per vulneris aperturam ejicienda; et saltem nisi natura ipsa operetur, ut accidit militi in Hospitio Invalid. Dom. Parisiis. Charr. Vaug. Hanc historiam etiam exhibit Glone sed ait ... factam a ... Sutura intestinorum nimis magna et stricta. Clore eandem refert. Antequam fiat sutura intestinorum, fomententur sp. vini Camph. Si vero mortificentur intestina, non contu... enda sunt, sed spirituosis fomentanda. Clore.

Calculus in urethra. ib. c. 18. oper. 3. Si calculus haereat in vesica spermatica, repellendus est catheterem. Si vero fit prope glandem, premitur digitis ut exeat, et extrahatur cochleari parvo, et fiat incisio a latere urethrae. Si denique haereat in urethra, et neque cochleari, neque digitorum pressione, neque suctione, neque inflatione, extrahi possit, necessario incisio facienda a latere urethrae, ... sculpo prius retracta versus penis radicem, ponenque calculo inter digitos pred... tenti, et per digitorum pressione per cochleari educendus. Si incisio parva fuerit, ... de se curatur, cute rursus depressa; si autem magna fuerit, canula plumbea ... siccativo et cicatrisante oblinita in urethram immittenda, ne cicatrix urethram obturet, vulnusque balsamo quodam curanda; dein fiat theca seu capsula ex lino ... , in extremitate perforata ut urinae detur exitus, poni ... ad ... suctionem; in altera extremitate consuantur fasciae circa corpus ligandae. Clore, Vaug. Charr.

ib. oper. 6ta. medelis praecipue internis, ☿ d. dieta ex lignis, etc curantur. Ex...

terno autem cura accelerat catheterem perforato urethrae immisso, cujus stylo extremitati annectitur cotton aut linum Sp. vitriol. aq. sublim. et aliis causticis imbutum, eoque tangitur hypsarcosis. Dein catheter flexilis in usum ad urinam accipiendam, pars caustico tacta maxime patiatur dolorem. | Ruck. p. 53

ib. c. 19. oper. 2. Hernia et sunt completae et incompletae. Completae sunt ex inviis partes ad scrotum descendunt, in faeminis vero ad vulvae labia. Incompletae ex ultra inguen non se extendunt. Charr. 62. et cet. antequam instituitur operatio, tentetur intestinorum reductio, aegro supino collocato, capite decliviori, genubus sursum factis protentis. Si vero flatus aut excrementa obsint, tunc aliquid alvum laxans offeratur aut Clyster emolliens injiciatur. Quibus nihil juvantibus sequens Cataplasma applicetur. ℞ Rad. Althaea ℥ijß herb. malv. Mj. Violar. pariet. fl. camom. melil. ana Mß furfuris Mj. coq. in aq. com. tandemque expressione, adde farin. hord. fabar: ana ℥ijß farin. lini ℥ijß ol. ros. lil. alb. ana ℥j. fiat Cataplasma calide applicandum. Balnea ex lacte dulci, aq. com. in qua herbae emollientes coctae, ut et linimenta varia externe calide applicata, magnum habent usum. Intestino restituto, Emplastrum stipticum Crollii aut ad Rupturas Hoerneri applicato, fasciis vinculisque commodioribus. tamdiu detinenda intestina, usque dum peritoneum aut consolidatum, aut corrugatum fuerit, quod in infantibus fere semper felici peragitur successu. In adultis saepe periculum in mora, potissimum ubi praescriptis modis intestinum non statim restituitur. — Si operatione instituta, contingat intestinum adeo in tantam molem esse distentum, ut commode restitui non possit, variis in locis subtiliori acu erit perforandum. Ruck. | Bubonocele et Herniis completis.

et Gamones et obs. ad eos. Enterocele in qua intestina testiculo adhaerent, est periculosa et saepius lethalis. Si sit vetus, felicissime tractari non possunt absque testis jactura; satiusque est aliquid a teste quam ab intestino amputare. In Epiplocele vero si Epiploon testi adhaereat, prius scindendum, parsque ejus testi adhaerens linquendum. Cohaerentiam partis ex testibus dignoscis, si tumor per longum tempus non disparuerit, si dolores vivos et vehementes sentiantur, et de magna testis gravitate queratur. et Charr. Clerc.

ib. c. 19. oper. 3. Glenc. nobis historiam narravit de quodam montano Balneacensi, qui tumore sarcocele et ulcere testiculi unius correptus, duobus stiletis per transversum testis trajectis ab audaci quodam Empirico montano curatus fuit. Glenc. patientem vidit ex malo laborantem, et post curam peractam. — Castratio quatuor in casibus instituitur. 1. Ex in Enterocele testis adeo intestino adhaeret ut magna ejus portio auferri debeat. 2. In Contusione, ex vasa quasi contorta et collidentur, sanguinisque circulatio impeditur, quod rigiditate et mortificatione testiculi cognoscitur. 3. Ex testis varicosus est, remediisque non cedit. 4. In excrescentiis inveteratis, seu in sarcocele. Charr. Vaug. et cet. | Castratio

ib. oper. 4. Ex Hydrocele Hydropis comes est, frustra instituitur operatio. Charr. Vaug. Dignoscitur hic affectus ex tumore, et transparentia, nonnunquam dolor quoque adest si Ascitem concomitatur, raro nonnihil scroti detumuisse apparet; si vero a testis vasis Lympha disruptis oriatur, scrotum aequaliter distentum manet. Haeret autem aq. et inter scrotum et tunicam vaginalem seu expansionem peritonaei, et vaginalem inter et albugineam. permissis gratioribus quibusdam remediis internis, externa quoque conducunt, inter quae primas obtinet Rad. Bryon. contusa et Sp. vini irrorata calide admota. et folia et Cataplasma ex Cephal. calefacient. et penetrant. parata. et seq. Empl: — ℞ Empl. de Cumin. Melilot. Ranis ex ☿io. ana q. s. M. Operatio instituitur et instrumento Trocar, ut in paracent. abdom. potissimum in adultis, et pueris, vicinaque, praesertim si sit suspicio Hydropis; et instituitur Lanceola in infantibus, loco et punctione et incisione seu scarificatione, et aq. simul et semel exhauritur. antequam fiat punctio retrahendi sunt testes deorsum, ne laedantur vasa, erigendumque scrotum in tumorem. Punctura faciendo in superiore scroti parte, minus enim dolorosa minusque inflammationi obnoxia quam inferiore. Si sit suspicio de Cystide in qua Hydrocele includitur, membrana Cauteriis consumenda. Applicetur Cauteriis super | Hydrocele. | [illegible] scroti [illegible] sopitis mediis.

sup loci incisioni destinatis, aperiatur scalpro lanceolâ: hoc modo insensibiliter membranae consumuntur, et suppuratione auferuntur. Evacuatione peractâ, contemplatus qz Cistae, vulnus immissâ turundâ &c ad cicatricem perducere oportet. Quod si vas Lymph. semel disruptum, inductâ cicatrice denuo lympham exudet, singulis sequentibus annis semel operationem per instrumentum Groeer vibrare licebit, quemadmodum tales novimus, in quibus cum successu quotannis instituitur. Si verò operationem toties repetendam aegrè ferat patiens, Ostiolum necessario extirpandum erit, quo ablato Lymphae stillicidium certò cessabit. Nuck, Chirur. & plura in Vang. Chirr. & Tumores et obs. in eos.

Gangraena.

Bezoar. orient. interno.

ib. c. 22. oper. s. In genere causam gangraenae et Mortificationis partis alicujus esse, Dissipationem, Absentiam, aut Concentrationem partium sang. spirituosarum quae partem vivificare deberent, & potius motus sang: impeditionem, ejusdemque coagulationem, assero.[249] omnes consentiunt vini sanitatem consistere in mixtione ejus maxè subtilis et spirituosorum exaltatione; at cum salia acida aut sulphurea salina supremum tenent, vinum fit acidum, acre, aut rancidum.[250] Phiala vino repleta frigori hyberno exposita, paulatim gelescunt partes vini extremae, spiritusque in medio concentrantur; idemque accidit in corpore humano. — Applicatio oleosorum, emplasticorum, et sim. transpirationem insensibilem impedientium, inflammationibus, sang: stagnantem corrumpit, adeoque gangraenam inducit

Du Vernay de fracturis, idem dicit.

— Qui volunt spr: aetiop [illegible] ad gangraenam efficiendam conducere, eoque pars mortificata motu et sensu privatur, et quod magnus dolor inflammationem causat et adeoque gangraenam, non animadvertunt gravitatem partium sang: crassior in parte stagnantium, arteriis semper vicinos, nervos premere, adeoque spr: motum interrumpere, caeterisque partibus non amplius percipi. &c 248. — Recentiores quidam praetendunt motum sang: impeditum, ad sensationis et motus in parte abolitionem sufficere, sublata nervorum compressione: ad hoc probandum, aortam descendentem ligant, hincque observant partes inferiores motu et sensu privari. Non autem perpendunt partes has, non amplius irrigatas et lentas sang. arteriali, necessario collabi et desiccari, indeque nervos, quorum substantia mollissima est, comprimi; unde concludo, in omni gangraenae specie, ubi sensus omnino perit, nervos compressionem aliquam semper pati. 267. — Gangraena in senibus, et tibiis hydropicorum, ob absentiam caloris, semper mortales sunt. In partibus mollibus et delicatis, praesertim internis, valde periculosa, repente in sphacelum transit. Quae à magno frigore oritur, et extremitates ordinario corripit, curari potest, modo pars non integrè mortificetur: Calens igni moderato admoveatur, pars fricetur, aq. tepidâ lavetur et maceretur, cum signis minuitur, spiritusque in superficie se spargere incipiunt, fomenta calida, digestiva, nata media applicantur. Quae inflammationibus magnis, tumoribus, fracturis, luxationibus, contusionibus, aneurismatibus, erysipelatis, ulceribus, combustionibus, maculis scorbuticis, aculeis venenosorum morsibus, applicatione remediorum emplasticorum, causticis cauteriis actualibus, et generaliter omnibus magnis compressionibus, succedunt, in initio sui progressus curari possunt, remediis nim. progressum hujus mali extinguentibus et impedientibus, qualia sunt scarificationes profundae, &c. Charr. 260. & ib. causas omnium gangraenarum, signa, accidentia eorum explicatio, &c. & etiam Tumores, et obs. in eos. & Willis, Etmullerus, Silvius, Vang. &c.

& Instit. nostras [illegible]

De gradibus mortificationis. Sp. vini [illegible] dissolutum, &c [illegible]

Varix.

& Tumores et obs.

ib. sp. 8va. antequam operationem instituatur, videatur quid valere possint seq. remedia. ℞ mucil. sem. psyll. Lini, foenug. ung: popul. ana ℥ij et lumbric. Hyper: ana ℥j farin. tritic. ℥j. cera q. s. ut f. Empl. extendatur super linteum aut alutam, et applicetur varici. & ℞ Ung. popul. mucil. sem. psyll. Lin. foenug. ana ℥ij ß. ol. Camom: et fabarum ana ℥ij. cera q. s. ut f. empl. & ℞ spongiam imbutam Dec. alum. [illegible] et quatuor granatorum, applicetur bis in die et continuetur per mensem. Cum varix desiccatur, removeatur spongia, parsque [illegible] per spatium unius aut duorum mensium, donec tumefactio perfectè dissipetur. & ℞ Granat. No j. incidatur minutim, coq. cum sal. pug. j. in aceti vini lib. iij. imbuatur spongia hoc aceto, et applicetur varici, continuetur bis in die per mensem. & applicentur hirudines varici, si sang. nimis abundet, & fiat V.S. cum lanceolâ, dein ligatio arcta continuanda donec tumor decresset; uti cum salis sang. evacuatur, applicetur lamina plumbi [illegible] adstring. [illegible] Chirr, Vang.

Anevrisma.

ib. op. gra. Anevrismata in axillis incurabilia, et fere etiam in inguine. Glone. + Humores et Obs. in Dos. — ex parvo est anevrisma, et a V. S. male instituta provenit, fiat iterum V. S. semel + bis, ut moles et quantitas sang. minuatur, et appli: etur lamina plumbi, argenti, &c compressa inclusa, arcteque ligetur; charta masticata opt. + applicentur plures laminae, quarum infima minima, intermediae sensim majores, suprema maxima, fasciaque arcte ligentur. si Anevrisma magnum sit, usurpetur Empl. adstring. quale est [illegible] 24 Bol. sang. Drac. thur. aloes hypocist. aa ℥j. Ov. conquass. No ij. cera q. s. ut f. Empl. quod applicandum + solum, + miscendum cum Empl. contra Rupturam p. a. Empl. de cicuta etiam opt. — Anevrisma verum ad certum incrementum et non ultra progreditur, atque operatio potest in longum tempus differri absque noxa. Spurium vero in suo incremento illimitatum est, et operatio quam primum instituenda. Operatio eodem modo instituitur in vero et spurio. + signa utriusque in Charr. Vaug. Huck. &c et operationem in omnibus.

Obs. de suturis. + Sextus. p. 35.

Suturae faciendae 1. omnino in vuln. transversis, ut et in angularibus, obliquis et ubique ubi fascia uniens rem perastare non valet: ideo in plerisque longitudinalibus sutura inutilis, fascia enim uniens ijs inservit. 2o. malleolis adeo, si non multum corrumpantur, fieri possunt suturae non admodum strictae. 3o. si vulnus sit recens, etiamsi contusione comitetur, sutura adhibenda. 4o. In deperditione substantiae parva, ut in labio lepor. Cancro labiorum, &c, sutura facienda; non vero in magna, saltem vulneris labia non arcte approximanda. — 7o. In vuln: cum osse detecto, nisi fractura aut contusione ossis comitetur, sutura in usu sit, praesertim si vulnus sit recens. Glone. Charr. Vaug. In vuln. longitudinalibus fascia uniens absque sutura sufficit. Vaug. + Bogh. 50, 51, 52.

Sutura transire debet ad fundum vulneris, ne sang. resideat inter vulneris labia et unionem impediat. — Nodus superior sit currens, [seu laxus,] non chirurgicus, ut laxetur ad libitum si sequatur inflammatio &c. — si sit angulus in vulnere prima sutura, primusque nodus debet esse in angulo. — Opilis praeferuntur serico, hoc enim carnem lacerat. — In vulneribus superficialibus utendum acu recta, in profundis curva. — Opila quibus consuitur plaga, supposito explorator[io aut conductore] scinduntur. cum + inflam. magna supervenit, + vulnus reunitur. Charr. Clare, &c de suturis. Pulvinaria inter nodos locandi fiunt ex Empl. Diapal. [extenso] linteo extento, + ex Sparadrapo. — si vulneri post suturam imponatur Empl. + Balsam, nodi tegantur plumac. siccis. + [illegible] sutura [illegible], p. 3. et p. 15. Ad suturam siccam removendam, humectentur Empl: aq: tepida. Bibl. 448. Dion:

Vulneraria. + Sholfin de Modis Vulner:

Vulneraria constare debent partibus oleaginosis et salinis. Sarcotica abundare debent partibus sulphureo-salinis subtilissimis et alcalicis fixis et destruatoris. + Charr. 10. — Vulneraria vulner: pro Dec. interne assumendis, sunt Alchym. Hed. terrest. Veron: Hypp: Agrimon: Centaur: Bugul: Sanic: cons. fol. &c Clare 191. et 69. cocti in vino albo. [illegible] &c Sabin. vine quine Clarc. 69. in vulneribus et externa exponenda. Vaug. Vulneraria externa [illegible] &c lavan sp. + Dec. trifol. Clemat. Scord: absynth: angel: pyrol: consol. Scrophularia sanic. perfol. maris, &c Charr. 393. Lotiones vulnerum fiant vel Dec. vulnerariorum, vel Lixivio eorum cineribus facto. Lapeyronie.

Lymphatica + 7. 2dam post:

In omnibus fere vulneribus observantur loca quaedam alba et dura, quae nihil aliud sunt quam Lymphatica rupta, quae a plerisque practicantibus credunt initia esse cicatricis. In hoc casu ag. calcis necessaria est ad vasis extremitatem desiccandam, partesque lymphae glutinosas dissipandas, quae aliter hypersarcosis producerent supra haec vasa. Et proinde distinguendum est inter hanc notam albam et extremitatem nervi detecti; si enim [illegible] aliquis nervo applicaret, dolorem intollerabilem excitaret; quod non fit hoc in casu, ut experientia probatur; Quamque enim auferetur glandula et vas lymphaticum Bubonis venerei, sequente die apparet punctum rotundum et durum, quod a [illegible] remediis consuetis non potest quam vitriolo rubro pulv. [illegible] alia, ut praecipitatum, [illegible] [illegible] inutiliter applicantur. id tamen mirabile est, pulveris hujus corrosivus, qui nihil [illegible] dolorem intollerabilem [illegible] non [illegible] in hoc effectu. Not. [illegible] vas lymphaticum aperiatur in fundo vulneris, lymphamque vertat, saepe degenerat in fistulam

fistulam. In hoc casu, ut curetur fistula, oportet ut aperiatur usque ad glandem, si fieri possit, ad eam destruendam, ejusque originem desiccandam; & impeditur affluxus lymphae in fundo vulneris desiccando extremitatem vasis, et procurando generationem carnis promptissimè. Charr. 296.

Strabismus. Ubi Distortio vertiginosa observatur, nonnulli floccos chermesino colore tinctos angulo externo apponunt. & Larva duobus foraminibus oculorum regioni oppositis prædita faciei superimponenda. v. Scult. append. tab. 9. fig. 6. Si verò Oculi distortio ab humore acriori alterutrum ex musc. vellicante et contrahente oritur, ducenti Catapl. ex Lacte dulci ex pane bis cocto et lentillo croci parat., saepius levamen attulit. Si ex paralysi oriatur, Antiparal. conveniunt, sic fotus quos Salv. Anoth. Beton: Hyper: Rut. &c ingrediuntur, magnam saepius tulit efficaciam. In adultis, malum hoc ferè inemendabile. Ruck. Occlusio per paucos dies etiam prodest, ut in D. C. Murray.

Auris Excrescent. et ulceratio. Auris excrescentia carnosa & fungosa forfice & cultello, si possibile abscindenda, partibusque laesis styptica pars aut nihil de acrimonia participans, ne tympanum laedat, applicandum; mox inungenda durior Ung. cicatriz. obtusa et malo. C.C. ust. asperata immittenda. alias ~~[illegible]~~ sequens modus maximopere commendatur. R Ol. Sp. Sal. ppt aa ℥ij C.C. ust. aloes Col. tritol. rot. aa ℥i alb: ust. ℥ß M. f. pulv. subtiliss. Deinde R Ol. Ros. ℥ij Lithargyr. aur: ℥i coq. ad Empl. consist. tunc ab igne removeatur et addatur prædictus ℥ii, M. ad ignem donec duriatur, sed et modice. Hujus portiuncula Excrescentiae admota eandem statim consumit. — Si meatus auditorii membrana claudatur, ea pertundenda et cicatrizanda: si verò membrana prope tympanum conspiciatur, eamque tegat, cave operationem instituas. Ruck. & Leclerc.

Colli incurvatio. Emollientia et fibras tentas relaxantia, non tantum musculo contrahenti (qui praeter non laborat) sed et relaxato applicanda, ut Ol. viol. Lumbric: de Lateribus, Vulpin. axung. hum. & R Ol. amygd. dul. Lumbr: aa ℥i axung. hum. ℥iij Ung. Althae: ℥ß Ther: ℥i Sal. C.B. ℥ß Campha. gr: xij M. f. Linim. & R Ol. Chamom. Rut: aa ℥vi. Ol. Nard: Anoth. aa ℥ß Sp. vini ℥iij M. f. Linim. His & sim. pars contracta et relaxata bis quotidie illinatur, dein ter quotidie singulis diebus ex instrumento Glossocomo dicto (cujus hic & delineationem) quadrantis horae spatio suspendatur patiens. Operatio ex instituenda ita se habet. Elevato patientis mento [illegible] patiens. [illegible] tendinosam musc. Mastoidaei partem (quae ex clavicula conjuncta per scalpellum) Chirurgus arripiat, eamque, si possibile, unica incisione cultello curvo [illegible] secet; et si plures partes tendinosae hujus musc. impedimento fuerint, sectionem iidem [illegible]. Haemorrhagia sedata, vulnus hians (cujus labia non adducenda, sed deducenda) plumac. Bals. Copayv. et Hyper. aa q. s. irroratis adimplendum, cicatrixque ampla generanda ope ligaturae cujusdam caput versus oppositum latus inclinantis. Cauteris potent. quidam vice cultelli utuntur, ut Experientia periculosissimum [illegible] docuit. Ruck. & Roonhuysen, Meekeren.

V. S. et punctura nervi aut tendinis. Locus pertundendus manu aut linteo calente fricetur. Venae secandae sunt, frontis, Ranina (post ligaturam collo injectam) Jugulares externae (quas omnes tutissimè [illegible] caret licet, quia nervi, tendinis, aut art. laesio non molestanda) Cephalica, Basilica, Mediana, Salvatella (quarum prima tutior, secunda dein, minus tuto mediana secatur, ob saepius subjectos nervos, art. aut musc. Bicipitis tendinem) Salvatella, Saphaena [illegible] aq. calenti immersis, [illegible] in manu [illegible]. Nervus & tendo punctus [illegible] dolores, inflam., convuls. & Spasmi causa existit. In dolore convenit [illegible] pulticula ex mica panis tritic. ℥iß Croc. ℈ß. vitell. ov. No i Lact. vacc. q. s. [illegible] instillentur calidè. Sq. R Ol. Lumbr. Hyper. aa ℥vi M. & R Ol. [illegible] ℥i Hyper: Sp. vini aa ℥ß Euphorb. ℥iß M. & R Ther. ℥i et cera ℥ij vitell. ov. No i. Mell. ℥ß. M. Linteo carpsi et dicto madidi admovendi. Spatulaque ferreâ ignitâ tandem comprimendi, quod in patiens ferre poterit. Secta venâ aliquando sang: extravasati

[illegible] portio in partibus cutaneis haerens (Ecchymosis dicta) maculas livescentes aut flavi coloris inducit, et nodulus ab humore viscoso productus post V. S. remanet; quorum curatio facile fit seq. ℞ sp. vini ℥ij sal. Armon. ʒß M. et ℞ sp. vini ℥iß sal. vol. oleos. ʒij succ. absint. ʒß M. et plumaceolis bis terve de die applicentur. (Empl. Diachyl. in Bolling.) Nuck. Vaug. Dionis. Instit. Glone. L'Art de saigner, de pommer

Institutâ V. S. praesertim in brachij flexurâ (apode), lympha aliquando non raro remanere solet stillicidium, à vase Lymph. vulnerato causatum, cujus cura in hac et aliis corporis partibus facile perficitur, si imprimis parti laesae seq. pulveris portiuncula aspergatur. ℞ Bol. arm. ʒj nuc. cupress. ʒiß sang. Drac. sem. Hyper: āā gr: XV. M. f. pulvis. moxque vulneratum compr: liquore stiptico irroratâ fasciâ opere comprimatur; neque hoc sufficeret, nisi et alterâ compr: eodem liq. madidâ, infraque partem vulneratam locatâ, eâdem fasciâ fortius constringatur, ut hoc modo vase lymph. compresso, lympha per aliud vas lymph. viam sibi quaerat, motusque suum absolvat. Atque haec cautio observanda in vuln. omnium aliorum Lymphae ductuum. Hic non proficientibus Cauteris actualis applicandus, quo solo ejusmodi vulnus subinde fuisse curatum Experientia docet. Nuck.

Hic affectus ab interiori ossis superficie originem ducens, gravissima symptomata causare non omittit, et ad externam ossis superficiem serpit, eamque perforando periosteum [illegible], unde dolores lancinantes cum tumore molliusculo et concolori, febres et ulcera fistulosa, patientis emaciatio, et cartilaginea excresc. sup. partem affectam. Antivenerea sudorifera [illegible] prosunt, ut et salivantia. Aperta tumoris incisione, repurgatione cum sp: ⊖ et sp: vini admoveantur. Sed praestat Spongiae coctae [illegible] mixta cum Ung. Egypt. mixta. Fomenta seq. magnarum est virium. ℞ Rad. Lig. Guajac. ℥iß rad. cort. [illegible] ʒj herb. C. B. Absint. āā M j. flor. Centaur: min. Rut. āā M ß. Coq. s. a. ex aq. et vino āā q. s. Colat. ℥xx add. Aq. theriac. ℥ij Mel. ros. ʒj. M. f. fomentum plumaceolis pedtijsque madidis calide applicandum. quibus frustra adhibitis, scalpro et terebrâ omne vitiosum abradendum, pulveresque exsiccantes et calli generantes (ut Myrrh: Aloes, Sarcocoll. [illegible] Tinct. Myrrh. et [illegible] Tinct. myrrh. et Aloes cum Ol. [illegible]) facto foramine inspergendi. [illegible] admovenda, per tempus ferro candenti pars affecta urenda, per quod eadem modo praedicta applicanda. Hic non succedentibus, ad amputationem deveniendum. Nuck. — cum tumore seu inaequalitate ossis, minime cum inflammatione [illegible] firmior enim ossi adhaeret. In initio ulantur [illegible] āā q. s. cum pauco [illegible] externe, et sp. [illegible]

Parte laesâ decenter locatâ, duobus in locis unamquamque tendinis extremitatem perforamus, filumque bis ceratum obsuetum trajicimus; hinc interpositâ laboris aut lorei particulâ, extremitatum adductio, filorumque adstrictio certior redditur, neque tendinis extremitates facile lacerantur. Si tendo ex parte saltem resectus fuerit, eum integrè resecare praestabit; si vero major pars integra, resecanda non est. Suturâ peractâ pulveres [illegible] cocti et inspergendi, vulnerisque deligatio digestivo coi, seu Bals. Arcaei instituitur. Membrum non movendum aut extendendum est, quapropter absolutâ curâ contractum quodammodo redditur, sed sim nihilominus progressu temporis extenditur, usque naturam recuperabit. Hac methodo distincte servatâ, felicem successum sperare licebit, uti non simpliciter constat experientiâ. In nimiâ extremitatum resecti tendinis retractione, opera haec nullatenus locum habet. Nuck. Extremitates retractae forcipibus extrahendae. si non progrediantur emolliendae sunt Ol. cerae, et Ol. Amygd. d. per expressionem. Vaug. Charr. Clerc. (Hanc operationem dudum in usum revocavit D. Bl. Parisijs.) [illegible] explicatio [illegible] in Vaug. ubi sutura tendinis fit [illegible] [illegible] dolorem [illegible] Vaug. [illegible] partes nervosa unienda. Vaug. 15. 19. — Extremitates tendinis conjungendi [illegible]

Vuln. vasorum Lymphat. V. S. [illegible]

Spina Ventosa.

ad saliva[illegible] interne. Hisque non proficientibus, fistulamque et ad periosteum deveniat, tumque aperienda tegumenta cauteriis, non scalpello, atque os denudatum forcipibus aperiendum et [illegible] procedendum: ut in Nuck. Dionis.

Sutura tendin:

[illegible] nervi et tendinum vulnerati [illegible] convulsiones [illegible] interne [illegible] convulsiones [illegible] ut et Ol. [illegible] et succini. [illegible] āā ℥ij succ. Lumbric. [illegible] membra [illegible] nervorum [illegible]

boni moliores [illegible] 15. 19.

Transfusio Sanguinis.

Ad hanc operationem canales intermedii, tubulis argenteis ab extremitatibus annectendi, optimi sunt Art. Trachea Gallinae aut Analis junioris; hi enim canales in ipsa operatione patuli manentes, sine incommodo flectuntur, sanguinisque motus per illos distincte sentitur, minima mora statim observatur, et exploranti digito percipitur. Nuck. Encheiresin et in Lower de corde, Scultelo, Haug.

Baglivi Opera. Lugd. 1710. 4°.

Praefatio.

Notis est anatomicorum experimentis, de avibus nempe (columbis v.g.) quae exempto licet e cranii latebris cerebro, tamen nihilo secius ad horas aliquot vivunt non modo, sed caeco incertoque volatu cerebro destitutae per aera feruntur.

Praef. 11. Aves.

Rationes aperit Baglivianum systema, quo patet a solidorum mollitudine et flexibilitate coctiones accelerari.

15. coctiones.

Demonstratur quod recipiamus novem partibus quantitatis aeris illius qualis est Aer, quae sanorum functionibus obeundis omnino necessaria est, decimam quantitatis illius partem sufficere posse si unice a morte vindicanda sit vita. Unde, cui ad respirationem, inspiratione singula trahendi erant 31. digiti cubici aeris inspirati ut suam conservaret sanitatem, eidem tres tantum digiti cubici aeris inspirati sufficient, si vita unice sit conservanda (ut in apoplexia, syncope, etc)

13. aeris quantitas ad vitam sufficiens. Pitcarn Dissert. p.57, etc.

Cortex peruvianus interdum alvum aut sudorem movendo curat saepius vacuando nihil. Ipecacuanha ut purgando Dysentericis auxiliatur, eadem quoque nil vacuando curat. Martialia quae in multis menses et haemorrhoides (Fremannus de haemorrhoid. probl. 12. p.277.) revocant, comprimunt in aliis. Laudana et Opiata (vid. Ettmuller de vi opii Diaphoret. et Wedelii Opiologiam) quae in Dysentericis alvum cohibent, in Colicis doloribus (si spasmodici sunt) promovent; eadem quae in calculosis Urinam sistunt, in nephriticis restituunt; et dum in caeteris menses et lochia retinent, in hystericis compressa revocant.

31. cort. peru. Ipecacuan. Martialia. Laudana.

Bagevi Praxis medica. Lugduni-Batavorum. 1700.

P. 1ma. Cap: 9um. Impedimentum 6tum. Intermissum studium tractandi de morbis ex historia (Sliq.)
53. pleuritides latentes et indolentes manifestandi signum certissimum hoc est. Spec ut æ-
ger in dextrum, et sinistrum latus decumbat; decumbenti imperaut fortiter respirat, et
[illegible] simila una aut altera respiratione, pro ab illo an inde respirando et tussiendo
[illegible] dolorem aut gravedinem alicubi in pectore persentiat, qd si affirmet, pro certo ha-
beto pleuritidis sedem illic esse, ubi dolorem aut gravedinem indicaverit.

p. 53. Signum ubi sedes pleuritidis.

58. et annotata in margine præf: ad febres in praxi nostrâ. et hic p. 101, 102, 213.

p. 58. 59.

82. Dolorem lumborum rheumaticum à nephritico p hoc certissimum signum distinguere poteris.
Jube ab ægro, ut se in terram incurvet, et exinde erigat, et difficultate erigatur, adeò
ut p medium scindi quasi videatur; si hæc adsint, pro certo habeto dolorem illum non esse
nephriticum, sed rheumaticum, productum se ab acribus et muriaticis salibus p sero[s]um humor-
em illinc depositis. (Distinguitur etiam contractione partis. et est: 1mae. ad [illegible] 213.

p. 82. Dolor rheumaticus à nephritico.

83. Dolores renum à quinque causis potissimum fiunt, ob fluxione se. sive humoris sero[so] a-
cris, et erosivi depositione, ulcere, inflammatione, lapide, et obstruc[tione].

p. 83.

Cap: 12mum Methodus ad tyrones de morborum hypothesi recte construenda.

Cæsalpinus Italus acutissimus primus omnium sang: circulationem detexit, eamque 24 horarum
spatio fieri judicavit, ut hic notat Quæst. peripat: l. 5. quæst. 4. [illegible] —— Jacobus
Sylvius et universa Bontekoëi schola judicavit, calorem non esse feb: causam, sed ef-
fectum et symptoma; putabatque calorem non obscurum ex signis indicantibus sang: celerius
moveri, [illegible]: adeoque feb: omnem essentiam in coagulatione, sive incrassatione sang:
constituit; ideòque phlebotomiam, frigida, &c. prohibet, laudat & contra spirituosa, vola-
tilia, &c. Helmontius, et pars ab eo dissidens Campanella crediderunt febrem non esse morbum,
sed morbi remedium, à naturâ potissimum excitatum, ut peccantem materiam humoribus confusam eli-
minaret; ideò calefacientia remedia, et naturam, ut aiunt, roborantia imperabant. Henricus
[illegible] sententiam [illegible] fere contrariam excitans, feb: omnes ab infla-
matione viscerum deducit; idcirco damnatis phlebotomia, refrigerantibus, purgatione &c. dissol-
ventia, spirituosa, alcalia volatilia, et sim. præsuppositam viscerum inflammationem et ob-
structionem resolventia præscribit &c. et In [illegible] p. 105. ad Camphoram. et hic Cartesian-
orum de feb: essentia opinionem, à naturâ maxime subtilis. Galenicorum de feb: essentia opi-
nio est, qd præcipua febris pars à putredine humorum originem suam deducat, vul-
garique illa opinione decepti, qd humidum sit productivum putredinis, ab aqua potulenta
[illegible] abstinebant in feb: ut permittebant ægrotantem in imminens vitæ periculum
[illegible] delabi, qm ne minimam aquæ guttam eidem tribuere &c. [illegible]
[illegible] hypothesim stabilit, et a contemporaneis suis Medicis febrium [illegible] nuncupatus. et p. 58. 59.
213. —— Dom: Sydenhamus putat Hystericam, seu affectionem hystericam, provenire à [illegible]

Hypotheses varia.

[illegible] ac [illegible] Sp. [illegible], cujus de causa in [illegible], [illegible] inordinatos excita-
tos [illegible] hystericas convulsiones et sociis symptomatis producunt. Hypothesin hanc non [illegible]
[illegible] & [illegible], ut [illegible] solent; sed [illegible]
vaverit sang: missionem, purgantia [illegible] sang: [illegible]
tia remedia. nec non mærorem, vigilias, jejunia, cibos pravi succi, [illegible] causas,
[illegible], aut exacerbasse hystericam. Contra [illegible] theriacam, [illegible]
hilarantia, et spirituoso-oleosa, equitationem, et longam moram in rure rusticano,
vina [illegible] amaricantibus alterata, et sim. eandem et eradicasse, et magna ex par-
te mitigasse; non dubitavit asserere, ac in hypothesin [illegible], qd hysterica mor-
bus [illegible] à [illegible] ac pene [illegible] Sp: [illegible], et massâ sang: nobiliori, sive balsami-
câ sui parte depauperatâ. et ad p. 178, 209. et Dissert. 1. p. 26.

p. 177. Hysterica hypothesis, et cura.

Cap: 13tium.

In morbis nunquam ab ægro discedas, nisi linguam inspexeris; hæc enim statum sang:
[illegible] aliis signis, et apertius, et certius nobis indicat; reliqua namque signa sæpissime
fallunt, hæc aut nunquam vel rarò: et nisi sapor, color, aliaque linguæ accidentia ad na-
turalem statum redacta sint, nunquam ægrum tutum dato sedstantibus, aliter malè consuluis
nomini tuo. — Quot diebus principium feb: duraverit, totidem et augmentum, status,
ac declinatio: et qualis fuerit morbi principium, vehemens semper, malignum, impetuo-

114. Lingua semper inspicienda.

ib.

[illegible]

[margin: In Cura Febris]

sum. & contrà ... tempore, & talia quoque erunt, facilè comparanda, alia morbi tempora. unde ex solo morbi principio sedulò et sagaciter considerato, prognosticare poteris adstantibus durationem febris, nec non faustos illius aut infaustos eventus &c.

[margin: 115. Equitatio in morbis chronicis opt.]

Quamplurimis morbis remediorum usus obest potius, quam prodest; prosunt contra multis, et in rusticano aere exercitatio. Constans est Doctiss. Medicorum observatio, nonnullos morbos pertinaces et chronicos, praesertim à longo maerore et animi pathematis productos, nullis aliis remediis citius obtemperare, quam equitationi in aere rusticano. — In Colica biliosa valdè pertinaci, in Phthisi, cum fluxu colliquativo et reliquis desperati morbi symptomatis; in Hysteria, et affectu Hypochondriaco inveterato; demum in chronicis morbis, et à viscerum obstructione productis. post alia incassum tentata, non invenitur praestantius, ac ferè herculeum remedium, quam equitatio, primò quidem ad stadia, deinde ad multa milliaria, idque horis potissimum matutinis, et apricante caelo, prout sanctè satetur ter magni nominis Ctho Sydenhamus, sed multò ante ipsum Hippocrates lib: de Diaeta. Neque obstat quod aeger sit nimium debilis, et viribus adeò prostratis, ut ne quidem in lecto moveri valeat; siquidem in tali casu exercitium inchoandum primum erit rhedâ seu curru ad pauca stadia, deinde verò sensim ad plura milliaria equitatione absolvendum. Per hujusmodi enim exercitium equitando saltem imi ventris viscera praecipuè succutiuntur, nam omnis equi succussio, tota quanta est in imum ventrem equitantis terminatur, reliqua verò membra paucissimè exercentur; et per repetitas succussiones elanguida ac prorsus flaccescens fibrarum tonus restituitur; humorum atque sp: motus, & imminuti, & impediti excitantur; et quidquid hinc inde viscidioris viscerum glandulis inhaerebat, amisso circulo vicemperat: quo pacto restitutis, ac post diuturnas equitationes excallatis viscerum fermentis, non solum coctiones illorum, sed pariter ipsorum humorum separationes pristinae incitati, salubritatique restituuntur, et peccans materies tam longo tempore ibidem haerens per opportunas demum naturae vias foras eliminatur &c. Prodest multum haec exercitatio, ubi caelum humidum et nebulosum ferè semper sordet; illud enim solidis humani corporis partibus flaccescentiam, fluidis verò inertiam, ac veluti lentorem quendam afferre solet; unde Cacopleonis, seu assidua capitis gravitas, virium lassitudo, alvi siccitas &c.

[margin: iis qui degunt in locis ...]

[margin: 117. Signa mala.]

— Pessimum erit signum si circa initium status morbi, urina rubicunda, et contentorum excrementitiorum copia valdè saturata, in tenuem et pallidam sensim mutetur: si pulsus evadat creberrimus, debilis, ac ferè vacillans: denique si quidam tendinum subsultus, praecipuè dum pulsus aegrotantis tangimus; inquietas, insomnia horrenda, et ejusmodi alia superveniant; siquidem in tali rerum statu, brevitèr expectanda erunt funesta capitis symptomata, utpote deliria, vigiliae, comata, & etiam aliarum partium mala; sed praesertim caloris febris in malignam mutatio. — Febris, si phaenomena illius spectes, reliquis morbis est notior; si constitutionem et causam, omnis ignotissima. —

[margin: ib. Febris.]

[margin: 118.]

— Spiritu Magnatum frequentius ex inutili remediorum copia, quam saevi morbi, pereunt, praesertim si aulicè laboraverint &c. Paucis utaris, et cum prudentia. — Mania cum Melancholia talem habet affinitatem, ut non-rarò Mania in Melanch: transeat; et initia Melanch: frequenter maniacum quid habent, ut observavit Dodonaeus vir Doctiss:

[margin: ib. Mania.]

[margin: 119. Specifica in dolor. flatib. cruditatib. Stomachi &c.]

— Tribus horis à prandio solent nonnulli affectionibus stomachi, sed praesertim doloribus flatibusque, cruditatibus &c tentari. Specificum in tali casu expertus sum pulv: stomachicum Quercet: ad ℈i. cum potu caphe tunc temporis sumptum, praesertim in humida corporis viscidaque humorum constitutione, multò magis si aeger intemperantius vivat. Tinctura cort: lign: sassafras cum sp: vini facta, et ad duo cochlearia tunc temporis sumpta, et etiam in die repetita, flatus mirè ac ferè momento discutit. Tinctura Rhabar: itidem cum eodem sp: eandem praestat. — Ol: Menthae in omnibus ventric: morbis est proficuum. — Febris hectica Gallicorum, quamvis pro desperata videatur, facillimè tamen tollitur, ablato lue Gallica seminio per specifica eidem opportuna. — Febres quae cum magna syncope, singultu, aut vertigine incipiunt, vocantur à Medicis syncopales, singultuosae, et vertiginosae. Harum curatio statim inchoanda est vomitoriis; nam fomes febrilis in ventric...

[margin: ib. Febr: Gallicorum]

[margin: 121. Febres syncopales, &c]

latet, humor sc. acris et erodens, qui tunicas ventric. vellicando et afficiendo, per consensum cor, diaphragma, aut caput offendit, unde praefata symptomata. Vomitorium in his est mihi familiare, est ol: amygd: dul: cum aq: tepida. — Vomitu peracto, diluti lisque cum acribus salibus. Statim utor lactis, dulcificantibus, et emulsionibus, cum sero lactis, et dec: fl. viol: et ita feliciter sanantur. — In feb. et aliis quoque morbis, qui cum magna anxietate incipiunt, aegri inquieti sunt, loco stare nolunt, hinc inde per lectum agitantur ac praefatus acris humor tunicas ventric: afficiens (unde tot mala) ac cutari quoque debet. Unicum remedium in talibus anxietatibus et inquietudine, est vomitivum antimoniale, ex croco metall: cum vino, et aq: tepida, et oxymel: scillitico; nam absoluto vomitu statim liberatos vidimus, multo magis si cardialgia et affectibus stomachi sensibiliter laborat patiens: post vomitoria ad pacationem dari poterit pulv: Marci Cornachini, &c. — Quod febris magis ad statum vergit, eo minus utendum est refrigerantibus, ne per ea crisis impediatur; circa initia vero liberalius praescribenda, nam tunc nimia febrilis caloris excitatio, impetus, et orgasmus, gravissima minantur mala, nisi per prudenter repetita humectantia et diluentia leniantur, motusque sang: ad eam reducatur mediocritatem, quae absolvendae depurationi sufficiens est. — p. 122, 123. Whistoulas et obs: rariores. —— Si febricitantes nullo modo dormientes, manentes tamen quieti sine ulla querela, et nullo modo loquentes, nisi interrogentur; et si explorato pulsu contrectentur, manus retrahunt tremulas, et, ut aiunt, jactitantes, omnes moriuntur. Sed dum aegri pulsum exploras, semper observa an manus illius sit tremula; nam malum erit graviter et pauci certe ab eo evadent. per febris obs: 15, 21. —— De sang: mittendo in pleurit: et non potest exire, et ob summum dolorem et ob crassitiem, jubeo ut aeger vehementer tussiat, nam statim exibit. p. pleurit: obs 52. —— Nemo Auctorum, quod sciam, expertus adhuc est an China China per clysteres injecta vim febrifugam communicet corpori. Ipse nuperrime eandem tentavi in puero quinquenni Romae, qui duplici tertiana laborans, cum nulla prorsus remedia per os sumere voluisset, et ea de causa in statu fere desperatae salutis redactus esset, injecto mane clystere evacuante, post elapsas aliquot horas, jussi ut injicerent statim alium clysterem ex aq: hord: et Chin: chin: ʒi pulv: eumque repetendo singulis diebus, post injectos tertio clysterem cessavit omnino febris, et puer praeter omnem expectationem pristinae saluti restitutus est.

Cap: 14. De Medendis animi morbis, et instituenda eorundem historia.

Multi ob repletionem in morbos incidunt, sed multo plures ob animi pathemata &c. — Hypochondriaci, melancholici quippe natura sunt timidi et inconstantes, frequentius in morbos incidunt, eo quod affectus animi moderari nesciunt, aut coercere nequeunt; et licet tales horum morbi primo aspectu perniciosi et incurabiles videantur, sanari tamen facile solent, non quidem per nimiam remediorum copiam, sed aut per grata amicorum colloquia, aut per honesta rerum oblectamenta, et equitationes frequentes, aut tandem per vivendi normam a sagaci medico institutam. In principiis pestis multi hoc morbo corripiuntur et pereunt, quia tanti mali timore, et calamitatis publicae anxietate potius quam contagio eundem contrahunt: progressu vero ejusdem repetita casuum observatione impavidi, magisque constantes redditi homines, non ita facile corripiuntur, et si corripiantur, facilius liberantur, ut Autores fide digni observarunt. Mulieres ob timidum et imbecillem illarum sexum, morbis ex animi pathemate obnoxiae magis sunt quam viri, iisdemque vehementius afficiuntur, ut patet coloris deducitur ex morbis quos patiuntur puellae amoris ignibus flagrantes. & Chlorosi: Morbi, Animi pathem. in gen: —— Fateor tamen ea remedia aliquid posse contra morbos animi, quae statum sang: funditus immutare valent, quaeque non superficialiter agunt, sed fluidarum sique et solidarum corporis partium intima quaeque loca pervadunt. Inter haec sunt balneationes frequentes, delectus ciborum quorundam particularis, sive diaeta morbo accommodata; exercitia campestria, migratio in exteras regiones, venationes in amoenis locis et montanis occurrens, mora diuturnior in aere rusticano, frequentiorque in eodem equitationes; pariter usus martialium, lacteorum, et sim. in idem coincidunt. Quae quidem omnia blanda animi

et varia Curatio.

ib. Febres, et alii morbi cum anxietate, et eorum Cura.

122. Cautiones in febribus

122, 123.

127. Signa mortifera in febr:

ib. affg. in pleurit:

128 China China in Clyster: opt: febrif:

129.
130. Cura Hypochond: melanch: et aliorum animi morb.

de Puellis.

134. Cura Animi morborum.

animi oblectationes, morbosam quoque corporis constitutionem sentim tolli nunc, arvalesque imaginationes mox in pristinas reducunt. — In animo aegris curandis praestare maxime meretur debet medicus, ut quaecunque remedia aut praecepta curationem substantia merito proponit, ea tali arte, et intrepida dicendi libertate imponat, qua illi ad patientiam et tranquillitatem componere, et ad summam medicis praebendam fidem hortari valeat. Siquidem fateri vix possem, quantum verba medici dominentur in vitam aegrotantis, ejusque phantasiam vacillantem & casu: optime dicta.

138. Cautiones in cura morborum animi.

Cap: 15. De stabilienda medendi methodo popularibus pro caloris accommodata, ubi obiter de aere Romano, curandisque Romanorum morbis.

In Gallia futura londini vulneratores, opera Bubonocelem, cura Leporinum ... se feliciter succedunt in ad sanitatis totius audivimus: contra in aere Romano, etiam si a solertissimis Chirurgis praefata operationes instituta fuissent, in summum vitae discrimen conjiciebam aegros enim. Febres semitertianae, quae alibi raro in malignas transeunt, Romae magna ex parte sunt malignae, & perinde valde periculosae, quod et olim Galeno Romae degenti innotuisse. & hic de causa Crisis in Graecia et non inter nos, ut et p. 254. et seq. ad longum. — Incolae urbis Romae temperamento praediti sunt melancholico, subfusco, et nonnulli ... colore, ea bilem corporis macilento potius quam pingui, ... de causa ... affectionibus et iis praeservis morbis subjacent, quos aeris gravitas solet producere simul, aut pulmonum vitia, febres malignae, cachexia, pallores vultus, incubus, tabes, et consimilia. — Si aliquis in Ostia, Porto, aliisque Latii locis pernoctaverit, et exinde Romam reversus, corripitur statim maligna febre: estque haec sui generis, et ab aliis summopere differens, tum in methodo curativa, tum in symptom: eandem concomitantibus; et enim ... in eadem apparent, idque observamus ubique ... : eidem ... contra sang: missionem ... quam maxime ...

140. Operationes chirurgicae non succedunt in Italia.

142. Romanorum constitutio ... morbi.

143. ...

Romae incolae ... obsolet ut ... valde febrium, et quod ... non ... inserviunt et ab ... usu carnis ... summo ... abstinent ... acriditatis, & gravis humoris ... ansam ... — ... urbis difficillime ferunt medela spirituosa, et maxime activitatis, qualia sunt sal: volat: ... et generaliter medela nimis aromatica, aut acria; ab horum enim usu ascendunt capiti et nervi, ... tensiones, ardores, alvi fluxus, ... excitant; si autem aliquis morbi nata talia remedia requirit postulaverit, ut praefata incommoda producant, solemus ea diluentibus, unctuosis, aliisque illorum nimiam activitatem reprimentibus temperare, quo pacto nobis medicorum ... remedium spirituosa, quae aliqua unctuositate simul pollent, i.e. spirituoso-oleosa, omnem paginam in nostris aegrotantibus adimplent. — Generaliter observamus in cura morborum, praesertim acutorum, ... ab ... calore ... remedia diluentia, emplastica, et gelatinosa, ... gelatina ... ol: amygd: dul: ... ol. amygd: ... syr: ... cremores, aliaque ex hordeo praeparationes, diaetam lacteam, ... remedia pariter spirituosa, ... diluentibus temperata; contra medela volatilia, acria, spirituosa, aromatica, nimis solventia, et magnae activitatis, generaliter ... in exigua proportione ... — Dottiss: Petronius adinvenit electuarium purgans, ab ejus nomine Alexandrinum dictum, quod mira praestabat in curandis Romanorum morbis. ... et exercitiano ... commendatis nostris popularibus. — Medici Germani Emetica remedia in summo ... usu in omnibus morbis: Hispani jactant sang: missionem; Angli ... opiatorum; ... medela diaphoretica ... quod inde fit quod horum quique ex eorum remediorum usu ... eventus in suorum popularium curatione observarunt. & ... alia multa curiosa de aere Romano, morbis ibidem dominantibus, remediisque iisdem appropriatis.

142. Romanorum constitutio.

143. ...

144. Romanorum remedia.

145.

146. Electuarium Alexandrinum.

147.

Pars 2da. Cap: 1mum. Prolegomena.

Morbi sunt & acuti & chronici. Acuti sunt qui sedem in fluidis praecipue habent, & ad ... tamen ... pendentes ... morbi suos ..., et ... in ... aut in ... diuturnos et incurabiles. In iis ... ratio, et sagax medici in agendo judicium magnam vim habent ad sanationem, et ... hic et nunc ... Chronici contra qui frequentius a solidis vitiatis proveniunt, & a nimia fluidorum indigestione et vassilia ...

150. Divisio morborum in acutos et chronicos.

... ardbe eiusmodi ad coctionem perveniunt, & raro eandem attingunt. — id vix q(uo)d, ussposito ab offbla alq: sanguinea proutq solidorum ac fluidorum nãa pondentibus, tota vis sanationis à medici praestantia, remediorumque energia dependet; et in illis nec fortuna nec nãa necessario possint.

Cap: 3us. Regula instituendi et promovendi historiam morborum, &c.

Schola medica quae floruit apud Coos, summa fuit semper apud omnes medicos auctoritas alq: existimatio. neque sane immerito, nam sive rei tractandae pondus alque methodum, sive rerum inventarum copiam spectes, scholas omnes hac in re superasse profecto fatendum. Inter caeteros eximios viros peperit Hippocratem ex Asclepiadarum familia oriundum, vigesimus à Dono, decimus octavus ab Aesculapio, et nonus à Rege Chrysamide. Hic scholae illius vestigia secutus, in observandi fuit nullo, in historia morborum fideliter exactique delineanda diligentissimus, in stabiliendis demum praeceptis practicis longo usu confirmatis supra caeteros mortales sapientissimus, ac fere miraculis.

Cap: 5us. Solutio obj: contra Academias Medicorum publicas.

Febris Gortiana incipit cum rigore et vomitu, mox aeri calore urit; 12 horis partaris — acutis finitur, septenis circuitibus accessio urtis, sive totus morbus. Quamvis medicus non erravit in methodo; purgationem et phlebotomiam in principiis respuit; accessio vero — Caris sudore ut plurimum terminatur; non nisi saepius iteratae febrifuga profligatur: Urina saturatio colore, sive impense rubicundo tingitur, atque talis color signum fere pathognomonicum hujus, aliarumque intermittentium. — Hysteria à specifica quadam sibique propria humoris exaltatione producitur, atque remediis sibi prae caeteris familiaribus curatur, invadit: variantem symptomati sibi maxime frequentioribus, gulae sc. strangulatu, palpitatione cordis, tensus expectorationes et motibus convulsivis, in abdominis vel aliquarum corporis partium, sensu frigoris in vertice capitis, quod inter maxima veri solo hystericarum diagnostica; refrigeratione extremorum. Praefata omnia succedunt, quod hystericus humor hinc inde vagatur, nondum sedem figit: at si contingat, ut aliqua in parte consistat, morbos — producit una cum symptomatibus, cuivis parti prae caeteris essentialibus. Ita si caput occuparit, vertiginem, & dolorem, & alios capitis morbos simulabit; si nervorum systema, motus convulsivos; si cor, palpitationes et angores; si pulmones, tussim, asthma, et reliquos illius morbos; si intestinum colon, dolorem colicum pertinacissimum; si renes, aut lumbos, dolorem nephriticum adamussim simulabit; si vesicam, urinae suppressionem; si ventriculum intestina, vomitum et Diarrhaeam; et sic de reliquis. Quamobrem si medicus valde sagax et doctus non fuerit, et vivoritque causam specificam unius morbi saepissime udere sub persona alterius longe diversi, putabit morbos antedictos à causis sibi & effectis parti propriis produci, et ideo praescriptis vulgaribus remediis, laterem, ut aiunt, lavabit, aegrotisque magnis afficiet incommodis. Et revera illi à simili hysterico — in medicinae pendentes, irritissimique quibus libet aliis remediis, sola antihysterica momento temporis curantur. Vide de Lue Gallica, et reliquis huiusmodi morbis magis principalibus, ut fuse inferius Cap: de causis Morborum. & p. 107, 209.

Cap: 8us. Specimen historiae prima in describenda Podagra, ejusque aphorismis practicis, &c. & Obs: ad Arthrit:

Primi podagrae paroxysmi in utroque pede, et quoad motionem, et quoad durationem sibi invicem ... Podagra vespere et nocte recrudescit, mane lenitur et mitescit. In podagra aggreditur florentes aetate, et varios ei obnoxios, 14 dierum spatio generalis paroxysmus terminatur; in vero senes, et frequentius eadem laborantes, ad duos menses extenditur. Tandem & aetate, & diuturnâ hujus affectionis morâ protendit jam fractos invadit, non recedit, nisi eosdem ad mediam fere aetatem fatigaverit. Paroxysmi particulares sunt qui singulis diebus recrudescunt hora potissimum vespertina, et circa Galli cantum aut auroram mitescunt. — Circa Aequinoctia et solstitia generalem paroxysmum ordinario revocat; praecaeteris vero ineunte Februario, aut circa Calendas Martias. — Manus digitos, & instar pastinacae contorquet, et motu privat, demum tophaceas concretiones in exteriori articulorum superficie manifestantur, quae quidem temporis progressu paulatim cutem articulorumque acrimonia sua exedunt, aperto se exhibent in formam calcis emortuae, aut pellicularum cornu cervi: neque digitorum articulationibus infesta duntaxat est, sed et cubiti; in qua tumorem subalbum ovi ilaro solet magnitudine

160. Schola Coos. Hippocr:

172. Nãa febris Gortiana.

178. Hysterica symptom:

186. Podagra.

184.

187.

ovi gallinacei, qui frequenter inflammatur, aut insigni rubore suffunditur.

Cap: 8um. De Signis Morborum Diagnosticis, &c. per Caelium Aurelianum Epl.

402. Modus cognoscendi fluorem albm à Gonorr: gallicâ.

Fluor albus uterinus infallibiliter dignoscitur à Gonorr: gallica, quoad similibus comunicantibus symptomatis, hoc modo. Pete à muliere an superveniente menstruo sanguinis fluxu, perseveret quoque eodem tempore fluor ille albus nec ne; si dicat quod sic, significatio est quod morbus à quo divexatur sit Gonorr: gallica; si vero durante menstruatione fluor albus evanescat, et eodem finito denuo regrediatur, pro certo habeas mulierem fluore albo uterino laborare. Altera signa fallunt, hoc vero constans est, et mulieres dolos aperte detegit. — Signa Hydropis pectoris valde obscura sunt et dubia; si tamen æger dyspnœa afficiatur, horâ somni potissimum ingravescente, ita ut post paucas horas somno inceptas derepente expergiscatur, expergefactus suffocari se sentiat, fenestram aperiat, et liberum aerem excipiat, pro certo et infallibili habeas, ignorum ægrum hydrope pectoris laborare; nam et pedes intumescunt, aliaque signa minus constantia adveniunt; et si fidem tibi præstare noluerit, subsequens morbi progressus, et apertio cadaveris, de solidâ hac veritate nos erudiet. — Tuberculum pulmonum, et morbosa pulmonum costis adhæsio, eadem ferè habent signa; verumtamen hæc constantiora sunt.

ib. Signa Hydropis pectoris.

407. Signa Tuberculi pulmonum et Signa adhæsionis pulm: cum costis.

Signa tuberculi pulmonum, quod scilicet talis ægrotantes de colore bono se habentes, difficulter spirare incipiunt, difficilis spiratio sensim augetur, inter spirandum non stertunt, et nihil exspuunt, dolorem quoque in pectore sentiunt continuum, et dolentem in latere decumbere non possunt, sicca tussi laborant, tandem genæ rubent, febricula supervenit; et negotio ad suppurationem vergente, alia suppurationis symptomata accedunt. Duo tamen tanquam signa pathognomonica crudi et adhuc incipientis tuberculi sunt, tussis sicca, et dolor lancinans in alterutro pectoris loco; et quamdiu quidem tuberculum adhuc crudus fuerit, dolorem acutum ac tussim siccam inducit, &c. — Sciendum tamen quod si dolores vehementes lateris in tabidis superveniunt cum aliis præfatis circumstantiis, talem tabem oriri infallibiliter à connexione præternaturali pulmonum cum costis. + Hæc in Obs: ad loca propria.

Cap: 9um. De Causis Morborum.

409. Hysteria

+ ad p: 107, 178. Ludit etiam Hysteria sub specie tumoris doloris que tibiarum, frigora tris partium externarum, gravissimorum dorsi dolorum, &c. Asthma hystericum, seu Hysteria ludens sub formâ asthmatis, curatur non anti-asthmaticis, sed anti-hystericis, ut sale [illegible] in aq: melissæ, et apposito Emplastr: matricali Mynsicht. cujus concepti non sat, febris parit inveteratis in regione umbilicii paucis diebus. — Ophthalmia Gallica, seu à seminibus Luis gallicæ, quæ sæpe per triginta et plures annos inhærere solent, in corpore relictis orta, curatur non anti-ophthalmicis, sed remediis luis gallicæ propriis, et longâ potione ad instar aq: thermalis dec. sarsaparill: antim: crudi &c spatio decem dierum. + p 415.

ib. Ophthalmia gallica

310. colica convulsiva

— Dolores multis difficultatibus urgebantur in curatione colicæ convulsivæ, donec primus Ettmullerus 6. patholog: 10. docuit colicam illam non à frigidis intestinorum humoribus, ut credebant, produci, sed ab irritatione et convulsione nervorum mesenterii; eamque purgantibus, calefacientibus aliisque calidis remediis magis exacerbari; mitescere contra anti-nervinis, dulcificantibus, et merè anodynis. — Morborum causa distinguuntur in Procatarcticam, Proëgumenam sive dispositionem corporis, et Proximam, quâ positâ ponitur morbus, et ablatâ aufertur.

312.

313. Febris et alii morbi non ab acido.

— Recentes Medici aiunt non tantum febres, verum etiam morbos omnes ab acido pendere; ideo alcalia volatilia uberiori dosi præscribunt, ut praesuppositum hoc acidum infringant, et per diaphoresim eliminent, sed errant. — Aliter enim tractare debemus febrim ab intempestivo frigore, aliter à crapulâ, venere, insolatione, animi pathematis, aliisque causis productam. + p: 58, 49, 101, 102. — Insaniret Medicus qui ardentem feb: à nimiâ venere productam eadem methodo purgantibus, V: S: nis. &c aggrederetur, quâ ardentes aliis causis natas debentes aggredi solet. — Nobilem virum gravi [illegible] laborantem nuperrime curavimus, irritisque optimis remediis, desperabamus de salute recuperandâ; cum vero per transennam nobis innotuisset, se 20. ab hinc annis bubonibus gallicis affectum fuisse, statim suspicionem dedit Ischiadem à fomite gallico pendere; quamobrem mox ipso dec. sarsapar: antim. crudi, cort. nuc. &c. paucis diebus interjectis, à gravi Ischiade perfecte convaluit non sine astantium stupore. + p: 209. — Causa morborum [illegible] [illegible] Praecognita causa Procatarctica et Proëgumena seu dispositiva. 2°. plures morborum causa immediata facillime manifestantur, ut in Hydropicis aqua, in Empyematicis sanies, in Nephriticis calculus, quibus ablatis, ipsi quoque morbi [illegible] evanescunt, &c. 3°. Ab Excedentibus et Retentis, aliisque per oculorum fidem se manifestantibus, ut ex lingua, oculis,

315.

ib. Ischias à fomite gallico

320. Causa morborum proxima unde &c:

Juvit, &c. effectivi... 4°. A juvantibus et lædentibus, sive methodo curativa tali morbo appropriata. 5°. Indagando naturam eorum quæ juvant, et eorum quæ nocent, &c. 6°. Ex mutatione unius morbi in alium, succedentis per similis, vel remota. 7°. Ex læsione operationum principalium, utpote motu, respiratione, robore aut languore virium &c. 8°. Ex symptomatibus morbi antecedentibus et concomitantibus, eorumque natura, vi, &c. De duobus primis hactenus. 9°. Quod spectat ad Excreta et Retenta, inter ea principem locum obtinent Stercus, et Urina, Sputa, Sudor, vomitus, sanguis &c. emissus, color cutis, unguium, oculorum, &c. Quibus principiis componatur urina, chymia nobis abunde manifestat; præpollet tamen præ caloris in statu naturali sal indolis Armoniacæ, quod urinam colorat, et ponderosam reddit &c. Si flava nimis, vel potius viridia, nigra &c fuerint stercora, acido-acris et vitriolicorum salium copiam denotabunt; si vero alba, copiosa, aut liquida fuerint, vel inertiam fermenti primarum viarum, vel salinarum et sulphurearum partium (a quibus stercoris odor et color majorem quam par est inopiam. — Pro secreto tibi sit factor, me certiorem de sang: statu indaginem aliunde non haurire, quam ex lingua; siquidem ea sit congeries infinitarum glandularum, et papillarum nervearum, per quas immediate manifestatur morbosum illud in sang: superabundans, neque in itinere mutatur, prout in excretis ex alia corporis [illegible] contingit; ideo magna fides linguæ affectibus et mutationibus adhibenda in morborum cognitione; reliqua enim signa frequenter fallunt, hæc aut numquam, aut raro. Cave igitur ne discedas ab ægroto, in cujuscunque morbi curatione, nisi prius linguam inspexeris, præsertim si de internis inflammationibus suspicio fuerit, quam tibi certissime explorabit lingua, utpote quæ in minima inflammationis suspicione siccari incipit, et crescente inflammatione, crescit pariter et siccitas linguæ. — Sudor et vomitus iisdem ferè subjacent quibus urina et stercus: et ex illorum colore, odore, copia &c explorabimus indolem causæ proximæ aut antecedentis, prout in præfatis duobus excretis diximus. Sang: si rutilans nimis fuerit, partis volatilis et inflammabilis, si nigricans, terreæ et fixæ copiam indicabit. In omnibus inflammationibus partium internarum, præsertim acuta pleuritide, observavi sang: &c. extracto, crustam quandam albam veluti gelatinosam in superficie excrescere, quæ quidem nil aliud est quam nutritia seu chylosa sang: portio, ob nimiam illius incalescentiam, partiumque volatilium copiam, a sudore aliquo natis dissoluta, et in albam illam crustam coacta. Unde porro in curatione talis morborum fermentatio nimia compescenda per repetitas phlebotomias, et per [illegible] a [illegible]-alcalia, ut possint hoc pacto rubicunda atque nutritia sang: partes amico vinculo adunari, dissolutionique hujusmodi inflammabilibus ansam [illegible] [illegible]. — Nemo medicorum curationem feb: feliciter absolvere poterit, nisi prius quæsiverit adhibita remedia, certior factus fuerit de statu sang: utrum scilicet is; an &c. sit nimis concitatus, tenuis, inflammabilis &c vel contra coagulabilis, tenuis, [illegible] &c, siquidem in [illegible] diverso sang: statu diversa pariter curationis indicationes [illegible] sunt. — 4°. Medta quæ conferunt in feb: intermitt: sunt amara, acria, volatilia, lixivo-alcalia &c. [illegible] [illegible] [illegible] ante, victus nimis humidus, medta viscida &c. [illegible]. A quo gravi succi, et intemperantia succorum exacerbantur paroxysmi, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commiscentur. Vel [illegible] in Obs. — [illegible] [illegible] aeris, [illegible] [illegible] acutarum [illegible] valet, quam lac et aq: quæ partibus constant tenuibus, flexibilibus, [illegible] [illegible]. — 5°. In feb: ardentibus conferunt emulsiones, [illegible] [illegible] [illegible] minora, et [illegible] remedia, quorum partes sunt lenes, aquosæ, et pauci impetus, ergo [illegible] feb: ardentem producentes constabunt ex volatili, acuta, acri, et [illegible] [illegible] [illegible] in plurimis feb: diuturnis, et chronicis nonnullis morbis, magnam afferunt [illegible] [illegible] medta quædam austero-amara de genere ferè stringentium, ut sunt Chima chinæ, [illegible] rad: pentaphyl: alum: crudum, chalybeata, cort: fraxini, medta vitriolico-martialia, et medta ex genere stypticorum amaricantium et aliquantisper spirituosorum, aliaque hujusmodi, quæ [illegible] et roborando operantur. — [illegible] mulierem hemiplegia et linguæ paralysi correptam, hac methodo feliciter post [illegible] curavi. Evacuatis [illegible] sang: [illegible] [illegible] paralyticis [illegible] [illegible] mixturam ℞ Aq: fl: pæon: et Card: āā ℥iij. Sp: [illegible] [illegible] [illegible] āā ʒi. M. f. potio. Spinam spinam et medullarem [illegible] [illegible] [illegible] et vulnerario et sp: vini mixto, et calide inuncto. Gargarismata in [illegible] [illegible] ex [illegible] [illegible] [illegible] — Sang: missio incipientibus humoribus [illegible] [illegible] [illegible] illorum orgasmum momentum compescit, ut experientia [illegible] manifestum est. — 6°. [illegible] totamque ex repetitis cadaverum sectionibus [illegible] [illegible] cordis, [illegible] [illegible] intermissionem, et consimiles affectus, si [illegible] [illegible]

cognoscitur

Urinæ principia.

221.

Stercoris signa.

Lingua semper inspicienda.

222.

Sudores vomitus et sanguinis signa.

223.

[illegible] curatio.

224.

Remedia conferentia in febr. intermitt.

225.

Lac et aqua.

226.

[illegible] in feb: ardentibus, diuturnis &c.

227.

[illegible] hemiplegiæ et linguæ paralysis.

228.

V.S. commoda

229.

causa, utpote polypo, aneurismate, ossificatione respondeant, non ergo indolentes, sed continuè aegros molestant, faciès pallido aut alio morboso colore suffusa erit, gravibusque alijs symptomatis hydropi affinibus subjiciuntur patientes; si verò fluida materies acrimonia et irritatione peccans eosdem producerit, ergo intervalla tantum aegrotantem afficiunt; praesertim dum constitutio temporis austrina dominatur, vel animi pathemata supervenerint, coloris faciei naturalis est, nec admodum vehementibus aut continuis excitantur symptomatis; quo loci igitur prima et repetita laterunt symptomata, ibi morbus adesse admonemur.

Cap: 10mum. De Indicationibus ritè instituendis.

277. et seq: unde omnes morbi pendeant.

Galenistae ab humorum quaternione singulorum morborum causas deducentes, eandem fabulam in curandis semper agunt. Recentiores contra à molestia alcali aut acidi vertigine, morborum omnium causas petunt, et ab ijsdem indicationes curativas deducunt; sed mala quotidiana enim experientia testatur contra esse quae hominem laedunt, singulosque morbos à praeternaturali quadam humorum specificatione cuilibet familiari, seu à structura et sui sola propria humorum exaltatione et ab exaltatione seu specificatione morbi principalis, cujus ille est sectionem credere, latetque omnes humorum specificationes ita naturae legibus subjacere, ut reliqua corpora sublunaria; sed in quibus potissimum constitat specificatio illa, seu minima partium modulatarum mutatio, ergo cum quilibet morbus in speciem sibi debitam exaltatur, id sane modis est: sed non ad angusta quatuor humorum, aut alcali et acidi spatia, tanta morborum causae redigendae sunt. et cet. hic. — Unus idemque morbus calidus aequè ac frigidus, ac sibi invicem contrarijs, tollitur remedijs: tollitur quoque si methodis planè contrarijs tractetur; aq. spadana,

236. aq. spadana vires.

teste Henrico ab Heers, quamvis in promovendis diu suppressis menstruis expertissima sit, eorundem tamen nimis fluxus quovis alio remedio faciliùs etiam feliciusque sistit idem de aliis remedijs asseri potest. — Quidam nobis amicissimus dum in aere aut Neapolitano, aut pinguiori regni regionum vitam degit, statim Sciade et fluxu haemorrhoidum corripitur; crudelis

237. Casus singularis.

quibusvis remedijs, imò potissimum et momento ferè temporis convalescit in Sorracinam, Italiae, per Romam ipsam attingere. Chinenses aliique Indiarum Medici morbos eliminant ustione per moxam et acus punctura: imò febr. quartanam intermitt: ad miraculum ferè eradicari solâ ustione in talo factâ testis Wilhelmo ten Rhyne tract: de Arthritide. — In quolibet mor-

Pura febr. intermitt: et aquae frigidae.
240.

bo quatuor sunt consideranda: morbus, causa morbi, symptomata, et vires. Indicationes curativae in morbis aliunde nunquam deduci non possunt, quam à symptomatis hunc temporis graviori et supra reliqua praedominantibus: quippe quae morbi genius et gravitatem prae reliquis apertè nobis ostendunt. — In morbis chronicis, ut phaenomena sint diuturna et constantiora, non

241.

aliunde certiùs desumi poterunt indicationes, quam à juvantibus et laedentibus, nec non à sedulâ et fideli eorundem autopsia, à sectione cadaverum morbis denatorum post calorem desumendâ.

Cap: 11mum. [illegible]

242. Lactis usus et cautiones eo. 243.

Sola remedia sanant. — Lac si sit specificum remedium ad sanguinis acrimoniam compescendam [illegible] ... [illegible]

[illegible] lac tuius exhiberi verno et autumnali tempore, cum aestivo in quo quidem [illegible] [illegible] ... [illegible] et si acidi humores primas vias [illegible] ... eadem cavendum; si Diarrhaea ex ventriculi cruditate vigeat, abstinendum pariter [illegible] ... ergo [illegible] laborantibus nervorum aut capitis affectibus noxium maximopere est lac; lac enim nervos et capiti contrarium est, ipsatori familiare; domi intimo ventri flatulentum. Ne lac [illegible] macho saccharum aut [illegible] ... [illegible] ... sed duos ordines testacea exhibenda ad acidorum [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

244.

[illegible] ... Quidemque de lacte [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... lia et amaricantia volatilia, et imprimis saponacea, morbi chronicis [illegible] ... contra [illegible] — Exemplo septennio ut olim Patavij vir quidam [illegible] ...

250. Vulnera pulmonum sanata.

extra thoracis partem ad pulmonem usque penetrans; [illegible] ... tamen sola [illegible] non inter costas locis [illegible] ... tali pulmonis [illegible] ... vulneraria syringariis et [illegible] ... plus duobus mensibus perfectè cicatrizavit. Tandem propemodum [illegible] ... [illegible] ... recensentis in mezado [illegible] ... pulmonis, [illegible] ... [illegible] ... in momentum [illegible].

vid. Instit. ... Ruyrs: de ... Thorac:

[illegible]

[illegible] plu[illegible] sang [illegible] liquoris fermentantis, [illegible] dispumati [illegible] [illegible] mediaeq[ue] [illegible], et depuratione [illegible] in quibus calor liquoris [illegible] [illegible]. In his liquoribus nam [illegible] causa est [illegible] fermentationis et depurationis, [illegible] motus determinates [illegible] quâ [illegible] minime [illegible] quotidie [illegible]. [illegible] enim est tempus quo interim mults in depuratione perficiendâ, ab eo quo cerevisia, [illegible] aliusq[ue] liquores [illegible] nam procedit [illegible] similiter [illegible] quorundam liquorum [illegible] [illegible] maturationem perveniunt [illegible] quatenus [illegible] artifices [illegible] nam statuts tempus [illegible] liquoris [illegible] fermentationis [illegible] maturationem [illegible] [illegible] [illegible] ad corruptionem [illegible] ad maturationem [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] tempore [illegible] vocat [illegible] nam machina quâ [illegible] omnes [illegible] et [illegible] homines, [illegible] [illegible] [illegible] — Hippoc[rates] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] cogerets, in progressu morbi sola ptisana [illegible] [illegible] tempestata [illegible], [illegible] nam [illegible] committens, [illegible] [illegible] [illegible]. — Autumni tempore [illegible] humani corporis, [illegible] frigiditatem ambientis ad[illegible], [illegible] crassiores [illegible], [illegible] aliquantulum, et eo magis [illegible] impuriores evadunt, cumulatis interim in massa sang: ob impeditam magis transpirationem [illegible] impuritatibus. In tali sang: statu, et tali pariter anni constitutione, acuta febres longo temporis intervallo consumunt in absolvenda perfecta crises despumatione; imò ob antedictis partis crassioris heterogenearumq[ue] copiam, insigni confusione afficiunts humores, et hac de causa ad despumationes nam regulares difficulter perveniunt: tunc temporis etiam febres non ita acuta sunt, nec ad celerem despumationem faciles, uti solent esse [illegible]. Eadem pariter de causa in frigidis paludosis, et septentrionalibus regionibus rarò crises perfecta observantur, ut frigidarum regionum medici [illegible] testantur. His igitur in casibus indulgendum aliquantis per medicis paulò calidioribus, digestivis, et roborantibus, quibus nam [illegible] [illegible], tantus in humoribus excitet motus, quantus requiritur ad depurationem [illegible] tempore, et feliciter absolvendam. — Antedictis pariter de causis in Graecia et Asia crises olim feliciter procedebant; aer enim talibus regionibus circumfusus, et orientali plagae proximus, cùm ingenti praeditus sit puritate tenuitateque, non solum vina, et reliqui telluris fructus, perfectam maturationem citò et feliciter attinguunt; verum etiam ipsa sang: massa crassioribus et impuris aeris partibus non [illegible] data, [illegible] summa [illegible] puritatesq[ue] à morbosis partibus quibus febriliter [illegible] [illegible], [illegible] nam crises [illegible] [illegible]: qui non fit in aere crassiori, paludoso, et frigido. Igitur quo regio erit calidior, anni tempus pariter calidius, et aer [illegible], [illegible] [illegible] perfectiusq[ue] absolventur crises in morbis acutis. — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inflammatorias febres, praesertim variolosas, ut opinor, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: ardor, impetus humoris ad caput, aut alia [illegible], [illegible] causa [illegible] analogis [illegible] [illegible] victus praescriptis, [illegible] [illegible] feliciter [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dummodò eandem praefatâ methodo [illegible] eandem quoq[ue] methodum in reliquis continuis acutisq[ue] adhibeo: talia enim tantaq[ue] in [illegible] praescribo remedia, qualia quantaq[ue] sufficiunt, ut sang: febricitans intra debitos fermentationis limites coerceatur; dum verò morbus ad statum [illegible], tunc [illegible] spectator nam reliqua committo. &c.

[illegible] Tarantulâ.

Nec cuilibet regioni, nec quovis anni tempore venenifera est Tarantula, sed Apuliâ duntaxat, et aestivo tempore praesertim urente caniculâ; hyeme si mordeat non offendit, imò quod mirum est, Tarantulae illae, quae montes ad Apuliam terminantes incolunt, si mordeant, nequidem offendunt, quocunq[ue] [illegible] tempore mordeant. Noxiae igitur sunt, quae Apuliae campos accolunt, et potissimum aestivo tempore, quia tunc ab urentissimis solis ra[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

252. 254. [illegible] 256. 257. 258. Cura Variolarum et febrium. p. 70. 33. 43.

Symptomata morsus.

[illegible] ipsoq; loco doloris, tumor et pars in timorem [illegible], qui post institutam musicam et remediorum usum sponte et alijs [illegible] [illegible] elapsis horis a morsu, patientes ingenti cordis angore, gravi mastitia, [illegible] respirandi difficultate primo corripiuntur, mæsta voce conqueruntur, oculis turbatis inspiciunt, et interrogati ab [illegible] ubinam doleant, nihil respondent, sed affectam cordis regionem manu pectori apposita demonstrant, quasi cor [illegible] affligeretur. Atque hujusmodi symptomata varia sunt, pro vario Tarantulæ colore, magnitudine, veneni [illegible] tempore, æris gradu caloris, et consimilibus. Tarantati varijs coloribus [illegible] præcipue rubro, viridi, cæruleo, [illegible] raro autem nigro; et si adstantes vestem vestibus eo colore distinctis, qui Tarantatis ingratus est, ut vulgo est [illegible] ab illorum aspectu recedant; nam ad intuitum [illegible] statim corripiuntur [illegible] symptomata. Tarantula [illegible] varietate [illegible] varia quoque producuntur symptomata [illegible] dolor ventris pungens [illegible] [illegible] Tarantula quoque [illegible] et [illegible] capitis, torporem totius corporis [illegible] tumor, et dolor ingens in loco demorso, spasmus, rigor [illegible] vomitus propensio, tensio virgæ, et pectinis [illegible] — Multiplicia ac pene incredibilia sunt Tarantulatorum symptomata, quæ vide hic et in seq. — Semel dementia, [illegible] morbi, impostorum non sanantur [illegible] — Inter præcipua [illegible] ia effætam ac debilem sang: massam in chronicis morbis, laudo maximopere equitationes in aere rusticano factas singulis diebus, horâ potissimum matutinâ, quibus equitantibus morbos chronicos pene incurabiles [illegible] eliminavi. Saltatio etiam laudatur. Mulierum morbi diuturni quales sunt chlorosis, affectiones hystericæ [illegible] nunquam [illegible] [illegible] curantur, quam per medicamenta roborantia, [illegible] sang: massam exaltantia; non vero per [illegible] saccharata, et sim. majorem languorem sang: inducentia. Saltatio sudores eliciendo [illegible] morbis etiam [illegible] liberat. Praxim Baglivi p. 107, 178, 209. — Sunt qui à Tarantula demorsi paucis diebus moriuntur, nihil proficientibus Musica et Antidotis; nonnulli è contra præfatis remedijs ab imminenti morte liberantur. — Tarantulæ venenum semel corpori illatum indelebile impostorum est. — Canini venenum ad 30. usque annos massæ sanguineæ inhæsit, statisque temporibus recrudescendo ad mortem usque Patientis duravit. Hildan. cent. 1. obs. 80. et aliquando octo menses à demorsu se occultat. — venereæ luis character ad 30 et plures annos sang: inhæret absque ullâ molestiâ et incommodâ Patientis valetudine; recrudescit tamen deinde tantâ symptomatum vehementiâ, ac si tunc primo suscepta. Tarantulæ venenum singulis annis, et potissimum circa illud tempus quo Patienti illatum fuit, infallibiliter recrudescit. Baglivi: praxin p. 209. 215.

Ad duo ceteri genera reducunt [illegible] venenorum effectus, ad coagulantes scilicet et dissolventes massam sanguineam, solidaque corrodentes. Ex phænomenis supra expositis, quisquis deducere potest venenum Tarantulæ disponere humores ad coagulum, sive incrassationem; ideo indicationes curativæ sunt dissolvendi attenuandique humores virulento afflatos contagio per medica alexipharm: theriacalia, bezoardica, et reliqua pariter diversa ab ijs quibus utuntur medici in demorsis à vipera. Demorsi locum nostrates statim lanceolâ scarificant, quæ [illegible] applicant ad veneni extractionem, deinde theriacâ et [illegible] contuso, [illegible] parum fovent, donec venenum fuerit aliquantisper debilitatum. Ego vero (si meo arbitratu uti unquam licebit) demorsi locum candenti ferramento statim adurerem; ignis namque est [illegible] genere stimulorum, atque stimulus vehementissimus, excitat in fibris affecti loci et successive in toto systemate fibrarum humani corporis oscillationem quandam seu motum vividum, continuatum, et vehementem, quâ ratione humores qui sunt ad contactum solidorum ita oscillantium, solvuntur, dimoventur, attenuanturque, et [illegible] veneno coagulante, vix unquam [illegible] poterunt, præsertim in affecto loco, ubi stimulus ignis est potentior, et humorum ad coagulationem major inclinatio. Ad hoc remedium hactenus non experti aut tentatum est; tamen notare non gravabor effectus ignis in alijs morbis.

Equitatio et saltatio optimæ in morbis chronicis, chlorosi et hystericis. [29]

28.

Variorum venenorum periodi.

70.

Morsus Tarantulæ et aliorum venenorum remedia externa v. ad 77.

Plurics observavi ustionem candenti ferramento factam in incipiente gangraena, et incipientibus sed sordidis ulceribus, gravissima damna intulisse; multâ enim de Eschara viarum fibrillarum valorumque oscula praeter clausa fuerunt, unde impeditâ necessariâ corrosivi et gangraenosi humoris per ea repurgatione, nil mirum quod noxius ulceris humor ad interiora recedens, pro diversitate partis in quibus deponebatur, diversa et gravia adduxerit symptomata, et tandem mortem; pars enim ambusta prorsus exsiccabatur, et nigrescebat. Si igitur talia ulcera medenda occurrunt ex suspicione malignitatis, et magnâ humoris erosione, non statim adhibenda ferramenta ignita, aut remedia caustica; sed foveri incipiant Dec. balsamicis amaricantibus, vulnerariis, et sim. quibus erosivi humoris ad exteriora evocatio promovetur, fibrae flaccidae et erosae consolidantur, et circulantibus per affectum locum humoribus balsamica quaedam conciliatur dulcificatio ac robur. Et hic candide fateor, quod si post positis unguentaceis, et aliis vulgaris medicorum remediis, praefata Decoct. vulneraria, et balsamica intus et extra adhibeantur, methodoque recentiâ patienter atque assidue maligna et gangraenosa ulcera in principio tractentur, non solum brevi curabuntur, sed nunquam fere in corruptionem, aut incurabilem statum degenerabunt. Caeterum, si remediis hisce statim praescriptis nil proficitur, sed in ulcere contagium, et depascentia supervenerint; in his duobus casibus duntaxat ad ustionem, remedia caustica, et tandem ad membri abscissionem, si gangraenosi imminent, devenienda. In ustis ulceribus curandis ut citissime decidat Eschara, ne per illam occlusa vasorum multorum oscula, maligni humoris eruptionem impediant, ut supra observavimus; licet postea bene inuncta pars brevi de se Escharam emittit, si super ambustum locum insufflatur flos farinae tritici in tenuissimum alcohol redactae, et exinde superponatur petia vino nigro madida per diem ulceri relinquendas nocte et bini foveatur, decidet quoque Eschara, ut vidi Dalaviis curante Dom. Marchetto.

Si astrales postquam demorsi à Tarantula fuerint, et scarificaverint, et alexipharmaca miscuerint, ad interna deinde remedia fecerunt. Quale hic primas tenere Sp. vini rosmarinati, sive aq. Reg. Hung. et potius destillata ipsa rorismarini quod se distillata, et simula ex aq. theriac. cort. citri. et lactucae, melissae, scabiosae. Statim itaque exhiberi poterit Sp. vini rosmarinati ad ℥j ad ℥ij ex aq. scorzon. aut brodio herbis alexiteriis, alterato, utroque in lecto cooperiatur ad sudores eliciendos, quibus facilius extorquendis panni lintei Sp. vini madidi, et nudo corpori obvolvendi, utique tamen caleant, leni et semimuniti et laudanti. Epiphanius Ferdinandus severum Electuarium, ad antiphalangium vocat tanquam summopere utile, et à se expertum in obs. suis proponit. ℞ Bacc. myrt. et tamarisc. aa ℥j. Sem. pastinacae, nigellae, agni casti, dauci, anisi, cumini, et origani aa drag. ʒß. terr. sig. et boli armen. orient. aa drag. ij. ex Syr. tot. citr. f. s. a. Electuarium, de quo sume quotidie mane drag. ijß et superbibe brodii, alterati herbis, et radicibus alexiteriis. Confectio etiam Alchermes ex vino generoso interne sumpta prodest. Sed haec et alia omnia remedia prorsus inutilia frustranea, nisi praesto sit, et adhibeatur Musica, ut constans et infallibilis Medicorum nostrorum evincit experientia. — Saltatio plerumque aut quatuordecim dies extenditur, raro ad sextum extenditur — Demonstrat aliquid considerari debeti Apoplexiis, Apnoeis, ex denigratione lacini, et vehementi, etc. — Dissonantia instrumentorum musicorum symptomata maxima affert. — et hic curiosa quaedam quae choreae tempore faciunt — In extinctis Apoplexia saepissime observamus copiosum seri fluctuationem extra ventricul. cerebri; in extinctis à pulmonum morbis seri fluctuationem observamus in cavitate pectoris; in extinctis à viscerum obstructionibus, in cavitate abdominis, et sic deinceps. Qui polypo cordis moriuntur, paulo ante mortem tumore oedematoso pedum vexari incipiunt, modo tardius, et tandem hydrope corripiuntur. Huic observationi — quae est et ... illa de Asthmaticis, aliisque pectoris morbis, in quibus impedimentum aliquod et in auric. dextra, et in dextro cordis ventriculo adesse, utpote dilatatio, aneurisma, ossificatio, polypus et reliqua hujusmodi exoneratione sang. à dextro cordis ventric. in pulmones impedientia; in his ergo, morbis ... [illegible] ... [illegible] ... tumorem in exteriori, et mox in interiori manus parte comprehendi, deinde spirandi aliqua difficultas, tum pedibus incumbentia circa dextrum cordis ventric. aut circa illius auriculam, ut cadaveris sectio clarius manifestabit.

32. Ignis candens in ulcere aut Gangraena adhibendus. Cura vero fit Dec. Vulnerar.

v. Z. l. 2. p. 83.

Escharam auferentia.

33. Morbus Tarantulae et aliorum venenosorum remedia interna. et ad 30.

Musica remedium sine quo non.

35. 36.

41. Observata in extinctis Apoplex: polypo cordis, Asthmaticis et eorum symptomata.

45. Lapis serpentinus, cobra mors, ꝗ venenatos.

Lapis repertus in capite serpentis Indici vulgò cobra de capello, valet contra morsus scorpionis præcipue, teste Joanne Dominico Pulignani Soc. Jesu, qui experimentum fecit in Calabria: venenum educit spatio quadrantis horæ, et patiens integræ sanitati restituitur, aliquando tamen iterum et sæpius applicatus; sed obs: post singulas applicationes lapidem immergendum esse in lacte, ut veneni sucti semina in eodem deponantur, donec amplius illud non tingat. Plures adulterini lapides ab Arabibus et Indis fallacibus nostris Europæis venundati sunt, ut falsus Dom. Redi, qui plura experimenta ex hoc lapide frustrà tentavit. — In ca-

52. Venenum canis, felis, muloru et ud dc.

nibus rabidis, et felibus, mulis, lupis rabidis etc. ut et in Tarantula, occultari non potest venenum antecedenter in corpore absconditum, ex tota vis veneni consistat in sp: (seu succo nerveo) et humoribus ad extremum ferè exaltationis et excandescentiæ gradum perductis, ꝗ ab ira, ꝗ ab ardentissimo aeris calore, ꝗ ab aliis. — Benignitate summi Numinis, à

57. Cura morsus canis rabidi.

rabidis canibus homines demorsi hinc sanantur, si ante 40mam à morsu diem se contulerint ad sepulchrum S. Viti, 40. milliariis circiter Alesio distans, ubi oblatis ad Deum pura mente precibus, Divi illius intercessione mox liberantur, ut cuilibet in Apulia constat.

58. Stupor dentis à lima etc.

— Multi à motu limæ aut serræ, ob ingratam aeris undulationem in stuporem dentium, aut molestam sensationem incurrunt, quia ex improportionatæ sint motu aeris partes nervorum radiculas dentium interiorum, easdem detorquent, dimovent, atque adeo ꝗ stupefaciunt, ꝗ dolore afficiunt.

ꝗ Integrum Cap: ult. Opusc. Quid agat Musica in Tarantatis, et aliis morbis.

Dissertatio ȝda. De usu et abusu Vesicantium. } Titulus alius qui ad Lamorikas (?) pertinebat.

Cap. 1mum. Experimenta circa Cantharides effecta.

65. Vesicantium inventores, et modo quo.

Galenici, seu Arabes vesicantia omnium primi invenere pro excitandis duntaxat ægris à soporosis morbis, vulta Apopl: Lethargo, etc. vis quâ mechanicâ, quosque prædictos morbos adjuvarent, nil unquam iis temporibus compertum est. — Helmontius, et recentiores medici eadem exinde eadem Galenicorum. — In Apopl: Lethargo, Vertigine, et sim. soporosis, et capitis

71. 74. ubi Cornach: est in soporosis morbis.

morbis, vix datur præstantius remedium quam vesic: Cornachini; sed in affectibus soporosis à gravi capitis vulnere, motus inducit convulsivos, et mortem etc.

Cap: 2dum. De incommodis ab usu Vesicantium.

74. et seq. Vesicantia in quibus casibus mala.

Qualibet anni tempestate ulcera vesicantium corrumpi ac gangrænari facillimè solent in cachecticis, hydropicis, atro-melancholicis, omiterisis (?) et valetudinariis corporibus, necnon in senibus corpora jam pridem suo gestu graviter laborarunt; non ita verò in robustis, et felici partis structura præditis, nec diuturnis morbis miserrimè lacessitis. — In febr: ardentibus et continuis, in quibus adest magna sang: agitatio et impetus: in constitutione anni calida et sicca, in similibus pariter temperamentis, regionibus, victus generibus, ætate juvenili etc: in affectibus nervosis ex febr: ad ardentem inclinante: in affectibus comatosis etc: quæ accedunt ad ardentes: in morbis pectoris symptomaticis, inflammatoriis; et à salino acri constitutione sang: productis, semper in pejus cessisse vesicantia pluries observavimus. Ideò in casibus supradictis curationem solis hymolicis, diluentibus, et dulcificantibus remediis feliciter absolvebam. — In febr: ardentissimis, et à nimio sang: orgasmo pendentibus, soporem quendam in principio accessionis observavi, qui crescente accessione cretescebat, et magis exacerbabatur quo conjunctis distorventia et cephalica præscribebam; nostrorò repolita: observavimus, didici soporem sponte sua imminui, accessione ad declinationem tendente, ꝗ si ita sponte sua non imminuebatur, o omulsis: seminum, aquas acido limonum temperatas, aliaque hujusmodi refrigerantia feliciter solvi. Hujus

75. Sopor in febr: accedentibus unde et cura.

organismi ratio est, quod sang: tanto impetu et velocitate pelle cerebrum, ut nec. filtari ibi, nec sp: separari possunt; imò quadam veluti strangulatione in illorum circulatione producta, descendunt ad inferiora impeditur; unde necessariò somnolentia, quæ magis excrescebat, quo major sang: impetus addetur, et è contra. — Nihil tamen ultò post adhibita superveniunt

72. 76.

vesicantia, quam sitis ex linguæ aciditate, Urinæ ardor. — A nimio Cantharidum usu foedissimæ suboriuntur satyriases, quarum duas historias lethales narrat Cabrolius et Foro-

77. Satyriases.

ut Vesicantia fiant fortia.

Anatom. 17. Cauti igitur sint medici in solaribus veris, à nimio vesicantium usu. — Quidam acetum corrigit et figit sal volatile causticum Cantharidum; ideò si fortia velis vesicantia, pars acetum, aut fermenti oleris addas, ꝗ loco illorum adde Empl. de Mucilag: aut simile. — Cantharides per os sumptæ, ꝗ contra ischuriam desperatam, ꝗ ad excitandam Venerem, ꝗ contra gonorrh: virul: solent pessima producere symptomata, prout vesica ulcerata

78. Mala à

modo urinaru exulceratio, hoppus inflammatio, intestinorum erosio, imminenti colores in hypogastrio mentis alienatio, et mors, nisi statim expellantur Cantharides, ... infringuntur ... contra Cantharides antidoti est lac nativum, et artificiale, ... Lancisio ... ... Cantharides constant partibus salino-acribus, volatilibus, causticis.

... obs. practicas pro cat: de Vesicantia, et in locis proprijs.

Cap. 3tius. De Commodis ab usu Vesicantium.

Quanam in consistendo sano: acri, et colliquativa seu dissolvente, obtinent vesicantia: ... tandem conferunt in diathesi ejusdem crassa, viscida, et ad coagulationes, stagnationesque dis= ponente, in quocunque morbo, qualibet aetate, temperamento, anni tempore, ... et ... ... agens in casibus dictis observavi remedium ... quod exilissimo ... extremitatibus frigidis, anxietate, ad morbos soporosos propensione, aliisque coagu= ... indicijs ... dictu est incredibile, quam proficuos effectus afferant vesicantia; multo magis si adveniat tempus hyemale, temperies ... ad humidum inclinans, habitus ... ... sale enim acri Cantharidum communicato humoribus ad coagulationem ... eorum partes ... solvit, et ad pristinam fluiditatem disponit. — Ulcera a vesicantibus excitata eo ardent ex colore subnigro, aut livescente, et gangraenam mi= nantur ... erit remedium, eadem oblinire bis, terque quotidie melle rosaceo: ... ... à mellis unctione ... quondam dolorosae punctionis ... ... percipiunt, quod bonum signum erit; nam uno aut altero die interjecto, humi= ditas in ulceribus apparebit, ex nigratio promovebitur, nigra crusta antecedenter ulceri obducta, decidet, et paulo post rubicunda caro superestit. Non solum in ulceribus vesicantium sed generaliter in alijs, quae ad corruptionem et ... vergunt, optimos mellis rosacei effectus obtervavimus. Romae mense Maio 1693. curabam juvenem ulcere inguinali, ex bubone ve= nereo laborantem, ... febre ... ... debilitatem. Ulcus erat ... dolorosum, inflam= matorum, et nigra crusta obductum. Statim itaque ... mane ... ... herbis alcalicis ... ... ovi vitello. Ulcus illinebam melle rosaceo duntaxat, bis, terque quotidie. Hac methodo ... ... continuata cessavit febris ... ... symptomatis, ulcus= que optime mundificabatur, donec tandem post ... ... Sarsaparil. lign: guaj: ... ... sanitati fuit restitutus. Obiter hic nota quod in curatione ... magnam vim habet ad sanationem ... ex diluentibus constans, ... sunt ... ex herbis alcalino-dulcificantibus, et balsamicis, ... et sim. copiose data. ... ... hujusmodi copiosa diluentia salacem ulcerum ... sanguinem ... dul= cificant, ... et copioso ... fluido, per commodas ... vias, ... sc: urinas, aut sudores promptissime eliminant. Et ita dulcificatus, purificatusque sang: ulceris cicatrizati= oni summopere convenit. Quae quidem omnia Medici sperare vix possunt ... hypocau= sta, dietam exsiccantem, ... sudorifera, et hujusmodi alia, quibus sal acre ulcerum magis magisque exaltando, et acrius reddendo, in desperatum salutis statum eosdem redigunt, praesertim si corpus aegrotantis non fuerit cachecticum, humidum, pallidum, laxum, nec tale pariter ul= cus, quo in casu, conducunt exsiccantia, ut ex parte conferet ... in oculorum et faciei morbis vesicantia cervici applicata sunt tanquam specifica, et caloris ... ... praesertim in suffusione, et fluxionibus oculorum dictis ad oculos ... ut saepius mirati sumus.

— ... ... in ... ... bis in die aspersi ... ut et fila carpia inde ... alum: crudi ... exsiccata, ... sunt pro ulcerum cicatrisatione. ... si corpus nimis impurum extiterit, hæc minus proficua sunt. ... ... ad ... 32. — ... Bartholinus cent: 5. obs. 82. ... modum parandi infusum Cantharidum, quod tanquam specificum depraedicat in genere: ... urinae suppressione, et pellendo calculo. Sic autem paratur. ℞ Pulv: Cantharidum ʒi. infundantur in ℥iv ... vini Rhenani ... stent in infusione per aliquot dies, deinde filtrentur per chartam bibulam, ut ex substantia Canthar: nil admisceatur. Ex colato ... cochlear unum misceatur cum septem cochlear: vini aut cerevisiae; hu= jusque mixturae sume primo die unum cochlear, sequenti duo cochlearia, et sic deinceps. An hoc remedium tentari posset ... in viscerum obstructionibus, cachexijs, suppressionibus mensium, ... morbis à sang: crasso, coagulato, et stagnante, originem ducentibus, nondum expe=

Cantharid: incommodum.

antidotum Cantharidum

partibus acri= bus constant.

79. Vesicantia ubi commoda. ✝ p. 91, 95.

83. Ulcerum Cura melle rosaceo.

Cura ulceris venerei.

84. Vesicantia ... in faciei & Oculorum mor= bis.

... cicatrizat in ulceribus.

87. Bartholini infusum Cantharidum in gener: vid. ischuria, & Calculo.

exposita sunt reliqua observata non hic excerpta inter quae practicas erunt in ...
et ad vesicantia
p. 47. Vesicantia ita evidenter demonstratur ex mechanica stimulorum

Doctrina

In morbis quos aiunt à fluxione pendere, utpote sunt catarrhi nonnulli, ... suffocativi, et à lentâ massâ producti morbi oculorum, et materiam suffusiones, dolores non nulli periodice se exacerbantes etc. In morbis pariter ab humorum stagnatione et pertinaci fixatione pendentibus, utpote sunt apopl: paralys: sopores, obstruct: et sim. etc. stimuli vesicantium, et alii hujus generis stimuli, ob rationes antedictas, omnimodam vim curationis et salutis obtinent, et notas etc. et iis in casibus vesicantia omittere, ob praeconceptam hypothesim, et speciula nom. et p. 95, 79. — Calefactiones, et exsiccationes nimium in corporis, ut et humiditatis absumptio, et spirituum debilitatio, à vesicantibus fortioribus et aliis stimulis facta, humectantibus opportunis, refrigerantibus, et corroborantibus corporis, sed dalis temperandae sunt, spiritusque ... etc. ut obviam eatur talibus incommodis, aliter optatus finis à stimulis haberi non potest, etc. Inter stimulos principem obtinent locum vesicantia — Undenam veniant potissimum humores à vesicatorio excreti? Dicendum: Eos venire partim à poris cutis, et glandulis cutaneis, partim ex arteriarum extremis, et fibrarum nervearum finibus denudatis et irritatis. et tandem peractâ stimuli actione et excita... à toto corpore et à partibus quibusque remotissimis, ut constat ex antedictis. Latex enim stroly pharmaci stimulis imbutus magnâ copiâ ac promptissime à reliquâ sang: massâ separatur ac velut divellitur, et quavis circulationis periodo nova... ior ejus quantitas eadem arte: ostiola continuo irritata excernitur, cum ... infinita aliis morbosis partibus, decernuntur ac evacuantur. — Morbi in quibus pro caloris ... venire possunt vesicantia ob rationes antedictas sunt, maligni, febr: ex coagulo et viscositate humorum aborti, soporosi, catarrhi à vitiosâ massâ pendentes, et irruptionem minantes in pulmones, et aliam nobiliorem partem, aut in nervos, oculos, fauces, pectus etc. Dolores fixi et acriter divexantes partem aliquam, morbi cutanei nonnulli, et dolores sine ... vagantes, convulsiones sine febre, Epilepsia, aliique hujusmodi nervorum morbi. Deinde in omnibus aliis in quibus necesse est solvere, divellere, derivare, excitare et similia agere pro morbi genio, et Practicantis experientia etc. et p. 79, 91.

Bibl: Univ. De Anisono: anatom: et practicis varii argumenti.

De Circulatione Sang: in Ranâ.

Notatu dignum est, Ranam in instrumento Boyliano commode vivere, etiamsi omnis aer exhaustus ab eo fuerit. Si vero Rana dorso aut capiti pice liquida inungatur, Rana statim extinguitur, ut expertus est plurimum Th. Bartholinus tract. de pulmonibus etc. Quamvis rana ablato corde per plures horas vivat et moveatur; cerebro tamen et capite avulso statim moritur nec amplius movetur. Contrarium vero contingit in calidioribus animalibus, ut pullo etc. cujus cor palpitat per plures horas capite jam dissecto.

Historia Morbi et Sectionis Cadaveris Marcelli Malpighii Archiatri Pontif.

Correptus fuit apopl: 25. Julii 1694. Apoplexiam accessit paralysis totius dextri lateris corporis, tortura oris, et oculi pariter dextri, etc. Varia remedia statim adhibuimus, sc. sang: missionem in brachio sinistro (mihi tamen esset in uno eodem in ipso brachio paralytico instituenda; siquidem impeditus fluidorum circulus in affectâ parte coloris non restituitur, quam ejusdemmet venam secando, ut clare deducitur ex mechanicis ... et impulsus; et prax: 229. Sed hic tentari non potuit ob varias opiniones Medicorum curationi vocatorum) cucurbitulas scarificatas scapulis, pulv: Cornachini, sinapismos plantis pedum, et alia quamplurima spirituosa, cephalica, et specifica in apopl: remedia. etc.

(margin notes:)

Vesicantia quibus casibus conducunt. (p. 9?)

92. 94. Cautiones in usu vesicantium.

94. Unde veniunt humores à vesicatorio excreti?

95. Vesicantia in quibus morbis proficua.

p. 113.

115. Cura apoplexiae paralys: etc.

Georgii Baglivi Specimen 4. Librorum de Fibra Motrice &c. Ed. 4ta. Ao. 1703.

Animadversiones in Practicen Novam. §.2. Cum febr. aliique morbi in longum protrahuntur, semper nulla est ratio medendi melior, quam Pharmacis abstinere, adhibito tantum convenienti victu, quo foveatur natura, nec digestionis vis attenuetur. Ita multos convaluisse comperi. In morbis acutis et inflammatoriis, paucis opus est remediis; satis enim fuerit vias observare diligenter qua natura exitum tentat, curamque eo perducere, naturam obtemperando, alioqui aegrotos perturbabitis. — §.3. In Chronicis pauca remedia requiruntur, ejusque sint generis quae parti affectae conveniant quasi specifica. Semper tamen in morborum diuturnitate contendendum est digestionibus, alioquin victu incongruo, atque remediorum copia morbus evaserit incurabilis. In febr: universalibus, i.e. quae ipso de sang: suscitantur, non admodum laborandum est circa partem affectam, ut inde curationis deducantur indicationes. Sed si primae viae sint obductae, eaeque aperiendae atque expurgandae fuerint, danda opera, ut febris fomes tollatur; si vero sang: febricitans sit exaltatus et vehemens, ejus reprimendus est impetus; si nimis crassis humoribus involutus atque coagulatus, exaltetur ac dissolvatur. In his enim tribus praeceptis omnis prope illarum febr: cura vertatur, quae vel non ducunt ab organi laesione, vel ab humorum congerie, aut in ipso sang: aut in primis viis. Et cum ad crisim natura vergit, aut eas jam exciverit, tum a remediorum copia tanquam a peste cavendum. Ex odore quem aegri spirant solere fere alterum morbus facilis vel difficilis, brevis vel diuturnus, vel alterius generis futurus sit, judicare. In aegris qui morituri sunt, nonnullis ante mortem diebus solet, de pulsus languinus, ab eorum exhalare corpore foedus quidam ac veluti cadavericus odor, qualem spirant in templis cadavera, ut saepe observavi, et velim ut serio animadvertant Medici. In morbis inappetentia signum est longi aut periculosi morbi, ut saepe vidi. Vidi quoque singultus frequenter excitatos ex nimio stibii diaphoret: abusu. Pulv: Cornachini saepius adhibetur in corporibus laxiori fibrarum compage praeditis, quam duriori, ut saepe animadverti.

Animadversiones in Chronicen Dolorem. §.1. Hippocrates in morborum curis nil magis exercebat quam: Balnea, Frica^{nes}, Exercita^{nes}, Unctiones, Ustiones, Inciciones et varia aliaque ad ossa Ablu^{nes}, Capitis purga^{nes} et Sternutatorias, ejusdem Lotiones, Applica^{nes}, Succussiones, ac hujus generis remedia, in solidis corporis humani partibus rem suam exercentes, quoniam iis proxime adhibentur, non autem in fluidis, nisi solidorum ope: — Per os etiam si Helleborum excipias, et frequentem [illegible] et lactis in morbis plurimis, pauca alia remedia adhibebat. Nostrisque temporibus, veluti exemplo suo ducti Indi et Orientales fere omnes curant morbos [illegible] et aeris [illegible], teste Dom: Chardin, et Doctiss: Alpino lib. de medic: Aegypt.

Praecepta pro febr: curandis

Odor aegrorum.

Hippocr: Curat.

Indorum curat:

Pro con... ... ...

Extendatur si opus sit, fomentis: sp: vini Camph: & aq: vitae, dein applicetur empl. ... pulv: amyli commistis alb: ovi. & ... ...

et secundum applicetur cataplasma ut Tormentillae, &c. ... contusio ... mortificata ...

... Herb: emoll: ut ... &c. et applicetur cataplasma ... pro qu... ...

pharmaceut: et dein ulantur astringentia. ... aquaeductus aut ... molaris in ...

lem ... optimum remedium in Contusione nova & inveterata, ut et etiam in deposit...

one ... ab ictu & casu.

... & Instit: ... Boerh: Instit: Burnet.

In morbis venenatis Theriaca cum allio contuso externè, post partis affectae pluries scarificationem, et Confect: alkerm: cum vino generoso internè, prosunt. Bagl: de tarant. p. 42. Medici etiam omnia theriacalia, alexipharmaca, bezoardica, et reliqua pariter diversa ab iis, quibus utuntur medici in demorsis a vipera. ... scarificata cucurbitulam applicant nostrates ad veneni tarantulae extractionem, deinde theriacâ et allio contuso, ... dato, aut confectione ... partem fovent, donec venenum aliquantisper ... debilitatur. ... (... arbitratur ...) demorsum locum candenti ferro statim adurerem, cum venenum hoc humores ad coagulum disponit. ... hujus methodi, p. 31, 32, 33. & in ... ad p. 32, 33, 45. sp: vini ... & ... opt. p. 54. Theriaca et ... vol: viperarum interne opt. & Chirurg. P. 3. c. 23. & post. ad X

& Praxin ad Hydrophob:

Il faut plus ou moins de temps pour guerir une fracture d'os, selon les parties ou differente grosseur ... Pour former le callus de la machoire cassée, il faut 20 jours. Pour celui de la Clavicule ... de l'epaule, 24. Os de l'avant-bras, 30. Bras, 40. Os du Carpe, et des Doigts de la main, ... Côtes, 20. Cuisse, 50. Jambe, 40. ... et doigts des pieds, 20. Et pour aider la formation de callus, on frotte l'endroit fracturé avec de l'huile de vers et de l'esprit de vin chauds ... meslez ensemble; on fait user de decoct: d'aigrimoine, de sabine et de saxifrage. Il y a la pierre Osteocolla qui est specifique; elle se donne dans de l'eau de grande consoude, ou dans la decoction de pervenche faite dans du vin, et se reitere plusieurs fois. ... Osteocolla non utenda nisi in senibus Hildan ... Omnia astringentia valent in hunc usum, ut Bolus verus, Sang. Drac: aloes, nuces cupressi, thus, tragac: acacia.

Profunditatem vulneris gladio, clavo, & sim. instrumento recepti inveniendi modus. Instrumentum vulnerans immittatur in ignem donec excandescat, postea frigescat in aere, et ad vulneris profunditatem caerulei apparebit coloris. Hoc etiam artificium vulneris suppurationem et ulcerationem (healing) praevenit.

X Scarificetur vulnus et applicetur L. A. M. et Empl. Vigo cum ... Ad Araneorum generis puncturas ... contusarum opt. remedium. Empl. magnetic. Angeli Salae cum add. ... calcin. ℥j & j. partes vicinas et ... cum pauco ... illinendo, ad inflam. praeveniendam ... ℞ ... Rad: alth: ... ... fermenti ... ana ℥ß M. f. Catapl. Post venenum extractum applicetur Bals. ... cum add. Egypt. Interne sp. et Sal. vol. viper. Sp. et ... Causticum actuale, Cucurb: cum scarific. Immersio in aq. marinam & saltem ... sal vol. vip. & succini ... ... vomitus salutaris ... Spec. ... ... omni bihorio ... ... lavoptier ... Miscel: Cur. vol. 3. p. 348 ad 353.

... ad operationes ... p. ...

Dentis dolor si sit 1. ab humorum influxu opt. sunt purg. ... hydrag. fortiores, Cucurb: et vesicat. 2. Si a carie & cavitate, purg. et ... opt. in ... in Praxi. & fistula tabaci circa tubi medium indatur filo ferreo aliquid gossipii aut lini carpti; caput tubi repleatur pulv: tabaci, promove, accendatur, et toto fumo exsugatur donec pulvis redigatur in cineres; frangatur tubus, et eximatur gossipium ol. tabaci madens, quod indat; denti cavo, et ilico cessat dolor. &c. 3. Dentes aliquando dolent a vermibus qui in iis gigni ... ... enecantur & aq. ... supra praescriptâ, & aloe supra ... ... admixtâ & hic. Si dolor medelis non cedat, extrahatur Dens & instrumentis, & medela Empirico ... dentes absque dolore evellendi. ℞ Ranas virides arboreas quot volueris, has in sufficienti ... maialis quantitate probe obturato vase vitreo in cinere & arenâ locato, tamdiu fac coquere donec liquantur et aqua fiant: hanc in fimo equino & ... inter ... ... et ... pinguedo: quolibet apparuerit cornea ... aut ligneo aufer; nullâ amplius adveniente ... ut inutile, abjice. Hac ... pinguedo dentes a suis radicibus ... ut si ... hac illinatur, hos ... ... in ipso ... dentes amittat. Linitur ... hoc Ung. et circa dentem ... qui statim ... postea ... Mauzin ... & plura et in Riv... Burnet.

[illegible] sunt partibus carnosioribus + sine + cum scarificationibus, non vero super tendines ubi irritationes, nec super [illegible] [illegible] aliquo faciunt. Applicantur ad venenatas quid è corpore [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] + [illegible] et Zypaei, Chirurgiam Clerici et [illegible] ad rubedinem [illegible], et cucurbitula modico ligni impositis, quod accensum una cum cucurbit. statim parti admoventur. + Zyp. [illegible] + [illegible] Willis pharm. rationalis de fonticulis, et Mugi in Chirurg.

[illegible] fiunt + Cauterio actuali ferro sc. candente, + lancevola cutem scindendo, + caustico. [illegible] frequens in artubus, rarius in nucha. [illegible] in musculi initio, medio + finem potuerit, sed semper eligatur locus inter duos musculos, in brachio v. g. inter deltoidem et bicipitem, + Bibliotheca 15. in femore interius supra genu duorum digitorum transversorum distantia Zyp. eg. Post causticum ad hibitum scarificatur pars [illegible] lancevola, et adhibetur suppurativum aut butyrum recens, donec excidat eschara. Ordinarie ponuntur in apertura capitis, nucha, inter primam et 2dam vertebram, in exteriore parte brachii in cavitate parva inter deltoidem et bicipitem, supra genu inter musc. sartorium vastum internum et [illegible] vastum intern.; [illegible] sub flexura tibiae, obs. tamen fonticulos prope magna vasa [illegible] poni, ut molis pungant. Le Clerc. + ib. l'Appareil. In femore interius supra genu ad tres vel circiter digitorum transversorum distantiam (si à genu ipso mensurare incipias) inter vastum internum et sartorium musculum. In pedis parte superiore ad digitorum trium 4or latitudinem infra genu circa marginem solei, + inter soleum et gastrocnemium. [illegible] cauterium potentiale applicando [illegible] emplastrum in medio foramine donatum parti apponatur, foramini dein causticum admoveatur; [illegible] [illegible] pulvillo + obolo aliove Empl. tegatur, tunc una, duabus, aut tribus horis [illegible] [illegible] emplastra removeantur, et Eschara Empl. Diapal. [illegible] Ung. Basilic. applicetur [illegible] [illegible] separata, + facta per incisionem fonticulo, [illegible] [illegible] et lancevola dissecta, [illegible] [illegible] formati, mediisque dolorem lenientibus inuncti, [illegible] apponendi, [illegible] [illegible] [illegible] cerea, ligneo, argentea, + pisa imponenda. Nuck Exper. [illegible] [illegible] + Zyp., Le Clerc, Nuck. [illegible] ita dicta, quia per foramina [illegible] inflicta, fila ex setis contorta olim [illegible]. Ordinario fit in nucha, à prima ad quintam vertebram, et adhibetur in nonnullis [illegible] morbis, quibusdam oculorum affectibus, dolore dentis, obstruct: Asthmate, et sim. Operatio instituitur hunc in modum. Elevatur cutis transversaliter tenaculis perforatis + manus, traiicitur acus cordâ sericâ munita (ordinario vero, aliis [illegible] rem praestat) per tenaculorum foramina. + [illegible] cutis Chirurgi et servi manibus, et lancevola pertunditur, traiicitur exploratorium cordâ sericâ munitum. Corda [illegible] quae [illegible] [illegible] et [illegible] Basilic. + alio digestivo inungenda. Praecavenda in initio Inflammatio. Applicantur setacea etiam brachiis, cruribus, etc. etiam [illegible] [illegible] gladiorum, sclopetorum, vel cum penitus partem aliquam penetrarent. Sed in his et omnibus aliis casibus, corda Ung. Balsam. et modis affectibus diversis convenientibus illiniri debet. + Zyp.

[illegible]

Vesicatoria fiunt è cantharid: [illegible] et mixta cum fermento, emplastro, + potius terebinthina. In morbis oculorum et odontalgia applicantur cervici et temporibus; In apoplex. pone aures, etc. In febr. malignis, et aliis morbis in quibus aliquid è sang: [illegible] brachio, cruribus, et aliis partibus prout necessitas postulat; Obs. tamen frictionem linteo calido fieri debere ante applicationem, ut effectus promptior sit. Applicata debet esse plus minus 7 aut 8 horas aut plures, [illegible] texturam cutis, et tunc + statim aperiuntur vesicae et applicatur liquor aliquis spirituosus, + Empl: molit: + butyrum recens cum brassicae foliis; + expectatur per duos aut 3 dies antequam aperiantur ut nova supducatur cuticula. [illegible] pulv. Canth. ʒj. Euphorb. ʒß Empl. de Melilot. q. s. incorporentur manu calida, sumendo tantum quantum Empl. [illegible] [illegible]; cuius portio super [illegible] extendatur, ita tamen ut eius margines non attingerent. [illegible] fermenti acris ℥ß canthar: pulv: [illegible] q. [illegible] q. s. f. massa + Canthar. [illegible] ung: Basil. q. s. incorporentur manu et f. massa. Zyp: Le Clerc, Nuck, Baglivi.

Hirudines seu sanguisugae ponuntur [illegible] aut cucurbit: ita nequeunt applicari, ut naso, labiis, gingivis, manus et pedum digitis, utero, ano, etc. item pueris, aliisque quibus parum sang: educi debet. [illegible] applicandae sunt + [illegible] ad rubedinem, + leviter pungatur, + guttula sang: [illegible], aut lacte, aut aq: calida illinatur. [illegible] manu tractentur sed linteo nitido. [illegible] à parte [illegible] [illegible], [illegible] enim [illegible] dentes [illegible], quod periculosum. Zyp: Le Clerc. Utuntur etiam in haemorrhoidibus valde plenis, et in varicibus. [illegible] [illegible] [illegible] capiti sal [illegible] [illegible]

[illegible] chirurgus advertit [illegible] et sang. non amplius in cucurbit. ascendere, statim frangenda est, + digito depressa ad latus carnis, vena [illegible], qua [illegible] aeri ingressus patebit, [illegible] statim [illegible]. Zyp.

Suppositoria commodissime adhibentur in febr. calidis alvum laxam tenendo; et in omnibus ani et intestini recti [illegible], quia loco adhibitionis ibidem [illegible]. Zyp.

[illegible] 59